

Tee Time®

SGN 100

14 + 28 + 10 + Fe, Mn, Zn, Cu

(14 + 12.2 + 8.3 + Fe, Mn, Zn, Cu)

50%

MUtech™

USA/INT	14 + 28 + 10 + Fe, Mn, Zn, Cu
14.0%	Total Nitrogen (N) 5.92% Ammoniacal Nitrogen 2.13% Urea Nitrogen 3.50% Other Water Soluble Nitrogen from methylene ureas 2.45% Water Insoluble Nitrogen from methylene ureas
28.0%	Available Phosphate (P ₂ O ₅) from ammonium phosphate
10.0%	Soluble Potash (K ₂ O) from potassium sulfate
3.4%	Total Sulfur (S) from sulfate
0.1%	Copper (Cu) from copper oxide
1.0%	Iron (Fe) from ferric oxide
0.1%	Manganese (Mn) from manganous oxide
1.5%	Zinc (Zn) from zinc oxide
Application rates: 15-25 g/m² (150-250 kg/ha)	
Directions for use: Apply product to actively growing turf at 15-25 g/m ² . Apply to dry foliage. Water in after application with 5 to 6 mm of irrigation. If temperatures exceed 25°C or if application to damp or wet turf is unavoidable, irrigate immediately after application. Apply at low rates if temperatures exceed 25°C. This product contains iron which may stain concrete and other surfaces. Remove particles promptly by sweeping or blowing to avoid staining. DO NOT WASH OFF WITH WATER. Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing. Use only clean, dry spreaders. Do not leave unused product in spreaders.	

Deutschland	14 + 28 + 10 + Fe, Mn, Zn, Cu
Deklaration nach Deutscher Düngemittelverordnung 2012: NPK-Dünger, 14-28-10 mit Spurennährstoffen	
14,0 %	N Gesamtstickstoff davon: 5,9 % N Ammoniumstickstoff 2,0 % N Carbamidstickstoff 6,1 % N Formaldehydharbstoff 3,9 % N kaltwasserlöslicher Formaldehydharbstoff 5,1 % N heißwasserlöslicher Formaldehydharbstoff
28,0 %	P ₂ O ₅ neutralammonitriolisches- und wasserlösliches Phosphat davon 26,3% P ₂ O ₅ wasserlösliches Phosphat
10,0 %	K ₂ O wasserlösliches Kaliumoxid
0,1 %	Cu wasserlösliches Kupfer
1,0 %	Fe wasserlösliches Eisen
0,1 %	Mn wasserlösliches Mangan
0,1 %	Zn wasserlösliches Zink
Nettomasse: 20 kg	
Inverkehrbringer: TURF Handels GmbH., Am Harbuden 48, A – 8101 Gratkorn	

Nebenbestandteil:	3,3 % S wasserlöslicher Schwefel
Hinweise zur sachgerechten Lagerung: In der Originalverpackung trocken, kühl, frostfrei lagern. Restmengen dicht und trocken verschließen. Für Kinder und Haustiere unerreicherbar aufbewahren.	
Anwendung: Bei Neuinsaat, Nachsaaten oder P-Mangelstandorten mit 15-25 g/m ² auf trockene Bestände ausbringen. Anschließend mindestens mit 5-6 mm beregnen, damit die Körner gleichmäßig in die Rasenarbe fallen. Bei Temperaturen über 30°C nur mit geringer Aufwandmenge streuen und sofort beregnen. Das Produkt enthält Eisen, das auf gepflasterten Oberflächen im Zusammenhang mit Wasser Flecken verursachen kann. Sollte Dünger auf derartige Oberflächen gelangen, nicht mit Wasser entfernen, sondern sofort abkehren.	
Hinweis: Empfehlungen der amtlichen Beratungen gehen vor. Nur bei tatsächlichem Bedarf und unter Einhaltung der Aufwandmenge anwenden.	
Für alle Zier- und Sportrasenflächen.	

Norge	NPK-gjødsel med mikronering 14 – 12 – 8 (14 – 28 – 10)
14,0%	Nitrogen (N) 5,9% ammonium-N 2,1% urea-N 6,0% metylenurea hvorav 2,5% vannløselig N (WIN)
12,2%	Fosfor (P) – vannløselig (11,4 %) 28,0% bosterpentoksyd (P ₂ O ₅)
8,3%	Kalium (K) – vannløselig 10,0% kaliumoksyd (K ₂ O)
3,4%	Svovel (S) – vannløselig
1,0%	Jern (Fe)
0,1%	Kobber (Cu)
0,1%	Mangan (Mn)
0,1%	Sink (Zn)

Basert på ammoniumfosfat, ammoniumsulfat, urea, metylenurea, kalium-, jern-, kobber-, mangan- og sinkulfat, samt jern-, kobber-, mangan- og sinkoksyd.

Skal bare benyttes ved påvist behov til golf- og fotballbaner, park- og hagearealer. De anbefalte mengder må ikke overskrides.

Distributør i Norge: Floratine Norge AS
Gullfulletn 50
1570 Dilling, NORGE
Reg. nr. (Mattilsynet): 6187
Nettovekt: 20 kg

Anbefalte gjødselmengder: 15 – 25 g/m² (150 – 250 kg/ha)

En fosforholdig gjødsel velegnet til grunnjødsling i forbindelse med såing og nyetablering. Gjødsla tilføres når graset er i vekst, og på tørt bladverk. Det vannes 5-6 minutter etter at gjødsling er utført, for å få gjødselkornene ned i plantebestandet. Bruk mindre gjødselmengder ved høye temperaturer (> 25°C), og vann øyeblikkelig for å unngå viskader. Dette produktet inneholder jern som kan misfarge betong og andre overflater. Fjern partikler omgående ved feiling eller blåsning. VASK IKKE BORT MED VANN. I forbindelse med gjødsling skal det kun benyttes tørre og reine gjødselspredere. La ikke gjødsel bli liggende igjen i spredere. Gjødsla skal lagres tørt.

Greece - Αριθμ. Κυκλοφορίας: 31	14 + 28 + 10 + Fe, Mn, Zn, Cu
14,0%	Ολικό άζωτο (N) 5,9% Αμμωνιακό άζωτο 2,1% Άζωτο ουρίας 3,5% Άλλο υδατοδιαλυτό Άζωτο από ουρίες μεθυλενίου 2,5% Αδιάλυτο στο νερό Άζωτο από ουρίες μεθυλενίου
28,0%	Διαθέσιμο φωσφορικό (P ₂ O ₅) από φωσφορικό αμμώνιο
10,0%	Διαλυτή ποτάσσα (K ₂ O) από βειτικό κάλιο
3,4%	Ολικό θείο (S) από βειτικό
0,1%	Ολικός Χαλκός (Cu) από οξείδιο του χαλκού
1,0%	Σίδηρος (Fe) από οξείδιο σιδήρου
0,1%	Μαγγάνιο (Mn) από οξείδιο μαγανίου
0,1%	Ψευδάργυρος (Zn) από οξείδιο ψευδαργύρου

Εισαγωγή στην Ελλάδα από: Γεωπονικός Οίκος
3 Makedonias St., Athens, GREECE

Ρυθμοί εφαρμογής: 15–25 g/m² (150–250 kg/ha)

Οδηγίες χρήσης: Εφαρμόστε το προϊόν σε γκαζόν που αναπτύσσεται ενεργά στα 15-25 g/m². Εφαρμόστε σε ζηρή φυλλωσία. Νερό μετά από εφαρμογή με άρδευση 5 έως 6 mm. Αν η θερμοκρασία υπερβαίνει τους 25°C ή αν είναι αδύνατον να μην κάνετε την εφαρμογή σε υγραμένο ή υγρό γκαζόν, ποτίστε αμέσως μετά την εφαρμογή. Εφαρμόστε με αργό ρυθμό, εάν οι θερμοκρασίες ζεστρύνουν τους 25°C. Το προϊόν αυτό περιέχει σίδηρο που μπορεί να προκαλέσει λεκέδες σε τσιμέντο και άλλες επιφάνειες. Καθαρίστε τα σωματίδια αμέσως με σκούπισμα ή φύσιμα για να αποφεύγετε το λεκέσισμα. ΜΗΝ ΞΕΠΛΑΝΕΤΕ ΜΕ ΝΕΡΟ. Αποθηκεύστε σε καθαρό, ξηρό χώρο. Να γίνει σφραγιστεί τις ανοιχτές σακούλες διπλώνοντας το πάνω μέρος προς τα κάτω και ασφαλισόντες το. Να χρησιμοποιηθεί μόνο καθαρά, στενά μηχανήματα σποράς. Μην αφήνετε προϊόν στα μηχανήματα απορakis μετά τη χρήση.

Australia	14 + 12.2 + 8.3 + Fe, Mn, Zn, Cu
14.0%	Total Nitrogen (N) 5.9% Ammoniacal Nitrogen 2.1% Urea Nitrogen 3.5% Other Water Soluble Nitrogen from methylene ureas 2.5% Water Insoluble Nitrogen from methylene ureas
12.2%	Phosphorus (P) from ammonium phosphate
8.3%	Potassium (K) from potassium sulfate
3.4%	Total Sulfur (S) from sulfate
0.1%	Copper (Cu) from cupric oxide
1.0%	Iron (Fe) from ferric oxide
0.1%	Manganese (Mn) from manganous oxide
0.1%	Zinc (Zn) from zinc oxide
Application rates: 1.5–2.5 kg/100 m² (150–250 kg/ha)	

Directions for use: Apply product to actively growing turf at 1.5-2.5 kg/100m². Apply to dry foliage. Water in after application with 5 to 6 mm of irrigation. If temperatures exceed 25°C or if application to damp or wet turf is unavoidable, irrigate immediately after application. Apply at low rates if temperatures exceed 25°C. This product contains iron which may stain concrete and other surfaces. Remove particles promptly by sweeping or blowing to avoid staining. DO NOT WASH OFF WITH WATER. Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing. Use only clean, dry spreaders. Do not leave unused product in spreaders.

UK/EC	EC FERTILISER NPK FERTILISER CONTAINING UREA FORMALDEHYDE WITH Fe, Mn, Zn, Cu 14 + 28 + 10 + Fe, Mn, Zn, Cu
14.0%	Total nitrogen (N) 5.9% Ammoniacal Nitrogen 2.1% Ureic nitrogen (N) 6.0% Nitrogen (N) from urea formaldehyde with 3.5% Nitrogen (N) from urea formaldehyde only soluble in cold water 1.3% Nitrogen (N) from urea formaldehyde only soluble in hot water
28.0%	Phosphorus pentoxide (P ₂ O ₅) soluble in neutral ammonium citrate and water with 26.3% water soluble P ₂ O ₅
10.0%	Potassium oxide (K ₂ O) water soluble
8.5%	Sulphur Trioxide (SO ₃) water soluble
0.1%	Copper (Cu)
1.0%	Iron (Fe)
0.1%	Manganese (Mn)
0.1%	Zinc (Zn)

Low in chloride. To be used only where there is a recognised need. Do not exceed the appropriate dose rates.

Import in U.K. by: Greentech Sportsturf Ltd,
Block 5 Unit 1 - Bandedah Industrial Estate
Throsk, Stirling, Scotland FK7 7NP

Application rates: 15-25 g/m² (150-250 kg/ha)

Directions for use: Apply product to actively growing turf at 15-25 g/m². Apply to dry foliage. Water in after application with 5 to 6 mm of irrigation. If temperatures exceed 25°C or if application to damp or wet turf is unavoidable, irrigate immediately after application. Apply at low rates if temperatures exceed 25°C. This product contains iron which may stain concrete and other surfaces. Remove particles promptly by sweeping or blowing to avoid staining. DO NOT WASH OFF WITH WATER. Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing. Use only clean, dry spreaders. Do not leave unused product in spreaders.

España/CE	FERTILIZANTE EC FERTILIZANTE NPK FORMALDEHÍDO DE UREA CON Fe, Mn, Zn, Cu 14 + 28 + 10 + Fe, Mn, Zn, Cu
14.0%	Nitrógeno total (N) 5.9% Nitrogeno amoniacal (N) 2.1% Nitrogeno ureico (N) 6.0% Nitrogeno (N) de formaldehído de urea, con 3.5% Nitrogeno (N) de formaldehído de urea, sólo soluble en agua fría 1.3% Nitrogeno (N) de formaldehído de urea, sólo soluble en agua caliente
28.0%	Pentóxido de fósforo (P ₂ O ₅) soluble en citrato de amonio neutro y agua, con 26.3% P ₂ O ₅ soluble en agua
10.0%	Óxido de potasio (K ₂ O) soluble en agua
8.5%	Tríóxido de azufre (SO ₃) soluble en agua
0.1%	Cobre (Cu)
1.0%	Hierro (Fe)
0.1%	Manganeso (Mn)
0.1%	Zinc (Zn)

Bajo en cloro. Se debe usar sólo se reconozca que es necesario. No exceda las dosis recomendadas.

Importada a España por:

Dosis de aplicación: 15-25 g/m² (150-250 kg/ha)

Instrucciones de uso: Aplique 15-25 g/m² del producto a céspedes que estén creciendo activamente. Aplique sobre el follaje seco. Riegue agua después de la aplicación, alcanzando 5 mm de irrigación. Si la temperatura supera los 25°C o si es inevitable aplicar sobre céspedes húmedos o mojados, riegue inmediatamente después de la aplicación. Aplique dosis más bajas si las temperaturas superan los 25°C. Este producto contiene hierro, el cual puede manchar el concreto y otras superficies. Para evitar manchas, elimine prontamente las partículas del producto mediante barrido o soplado. NO ELIMINAR CON AGUA. Almacene en un sitio limpio y seco. Vuelva a cerrar la bolsa abierta, doblando la parte superior hacia abajo y sujetándola. Solo use esparcizos limpios y secos. No deje otros productos ni utilicen en los esparcizos.

Denmark	NPK-gødning med 50% langsomtvirkende N 14 – 12 – 8 (14 – 28 – 10)
14,0%	Kvælstof (N) 5,9% ammonium-N 2,1% urea-N 6,0% metylenureastoff hvoraf 2,5% vandoploseligt N (WIN)
12,2%	Phosphor (P) 28,0% Phosphorpentoxid (P ₂ O ₅)
8,3%	Kalium (K) 10,0% kaliumoxid (K ₂ O)
3,4%	Svovl (S)
1,0%	Jern (Fe)
0,1%	Kobber (Cu)
0,1%	Mangan (Mn)
0,1%	Zink (Zn)

Baseret på ammoniumfosfat, urinstof, metylenurinstof, kalium-, jern-, kobber-, mangan- og zinksulfat, og jern-, kobber-, mangan- og zinkoksid.

Må kun bruges til dokumenterede behov for golf- og fodboldbaner, park- og haveområder. De anbefalede mængder må ikke overskrides.

Distributør i Danmark: Floratine Norge AS
Gullfulletn 50
1570 DILLING, NORGE

Anbefalede gødningsemængder: 15 – 25 g/m² (150 – 250 kg/ha)

Gødning tilsættes, når græsset vokser. Det vandes 4-5 minutter, efter at befrugtingen er gennemført for at bringe gødningens graden ned i plantepopulationen. Brug mindre gødning ved høje temperaturer (> 25 °C), og vand straks for at undgå visked. Dette produkt indeholder jern, der kan misfarve betong og andre overflader. Fjern partikler straks ved at fejle eller blæse. VASK IKKE MED VAND. Til gødningsbrug kun tør og ren gødningspredere. Lad ikke gødning forblive i spredere. Gødning skal opbevares tørt.

Taiwan (R.O.C.)	菁好牌花籃(14-28-10)
肥料登記證字號: 肥進(複)字第 0128013 號	
肥料品目: 複合肥料(6-01)	
國外廠牌商品名稱: TEE TIME FERTILIZER 14-28-10 WITH 50% MUtech	
保證成份: 全氮 14.0%、內含銨態氮 5.9%、檸檬酸銨溶性磷酐 28.0%、水溶性氧化鉀 10.0%	
成品性狀: 固態, 顆粒狀	
使用方法: 於作物生長季節適量施灑, 尤其是以新播種作物補充磷元素為主, 施用後澆水 10-20 分鐘。	
使用量: 每平方公尺使用 20-30 公克, 每分地 20-30 公克。	
包裝方式: 袋裝 淨重: 20 公斤	
有效期限: 5 年 批號: 請詳見包裝	
製造日期: 請詳見包裝 電話: 04-22135266	
總代理: 菁修企業有限公司	
地址: 台中市東區自由路四段210號	
製造地: 美國	
製造廠商: THE ANDERSONS, INC.	
P. O. BOX 119, MAUMEE, OH USA 43537	

New Zealand	14 + 12.2 + 8.3 + Fe, Mn, Zn, Cu
14.0%	Total Nitrogen (N) 5.9% Ammoniacal Nitrogen 2.1% Urea Nitrogen 3.5% Other Water Soluble Nitrogen from methylene ureas 2.5% Water Insoluble Nitrogen from methylene ureas
12.2%	Phosphorus (P) from ammonium phosphate
8.3%	Potassium (K) from potassium sulfate
3.4%	Total Sulfur (S) from sulfate
0.1%	Copper (Cu) from cupric oxide
1.0%	Iron (Fe) from ferric oxide
0.1%	Manganese (Mn) from manganous oxide
0.1%	Zinc (Zn) from zinc oxide
Application rates: 15–25 g/m² (150–250 kg/ha)	

Directions for use: Apply product to actively growing turf at 15-25 g/m². Apply to dry foliage. Water in after application with 5 to 6 mm of irrigation. If temperatures exceed 25°C or if application to damp or wet turf is unavoidable, irrigate immediately after application. Apply at low rates if temperatures exceed 25°C. This product contains iron which may stain concrete and other surfaces. Remove particles promptly by sweeping or blowing to avoid staining. DO NOT WASH OFF WITH WATER. Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing. Use only clean, dry spreaders. Do not leave unused product in spreaders.

Eire/EC	EC FERTILISER NPK FERTILISER CONTAINING UREA FORMALDEHYDE WITH Fe, Mn, Zn, Cu 14 + 12.2 + 8.3 + Fe, Mn, Zn, Cu
14.0%	Total nitrogen (N) 5.9% Ammoniacal Nitrogen (N) 2.1% Ureic Nitrogen (N) 6.0% Nitrogen (N) from urea formaldehyde with 3.5% Nitrogen (N) from urea formaldehyde only soluble in cold water 1.3% Nitrogen (N) from urea formaldehyde only soluble in hot water
12.2%	Phosphorus (P) soluble in neutral ammonium citrate and water with 11.5% water soluble P
8.3%	Potassium (K) water soluble
3.4%	Sulphur (S) water soluble
0.1%	Copper (Cu)
1.0%	Iron (Fe)
0.1%	Manganese (Mn)
0.1%	Zinc (Zn)

Low in chloride. To be used only where there is a recognised need. Do not exceed the appropriate dose rates.

Import in EIRE by: Greentech Sportsturf Ltd,
Block 5 Unit 1 - Bandedah Industrial Estate
Throsk, Stirling, Scotland FK7 7NP

Application rates: 15-25 g/m² (150-250 kg/ha)

Directions for use: Apply product to actively growing turf at 15-25 g/m². Apply to dry foliage. Water in after application with 5 to 6 mm of irrigation. If temperatures exceed 25°C or if application to damp or wet turf is unavoidable, irrigate immediately after application. Apply at low rates if temperatures exceed 25°C. This product contains iron which may stain concrete and other surfaces. Remove particles promptly by sweeping or blowing to avoid staining. DO NOT WASH OFF WITH WATER. Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing. Use only clean, dry spreaders. Do not leave unused product in spreaders.

Italia	CONCIME CE Concime NPK (S) 14-28-10 (8.5) contenente urea formaldeide con Cu, Fe, Mn e Zn - STARTER 14 + 28 + 10 + Fe, Mn, Zn, Cu
14,0%	Totale azoto (N) 5,9% Azoto amoniacale (N) 2,1% Azoto ureico (N) 6,0% Azoto (N) da urea formaldeide con 3,5% Azoto (N) da urea formaldeide solubile solo in acqua fredda 1,3% Azoto (N) da urea formaldeide solubile solo in acqua calda
28,0%	di pentossido di fosforo (P ₂ O ₅) solubile in citrato di ammonio neutro e acqua con 26,3% di P ₂ O ₅ solubile in acqua
10,0%	di ossido di potassio (K ₂ O) solubile in acqua
8,5%	di triossido di zolfo (SO ₃) solubile in acqua
0,1%	di rame (Cu)
1,0%	di ferro (Fe)
0,1%	di manganese (Mn)
0,1%	di zinco (Zn)

Basso contenuto di cloro. Da usare solo quando vi è un bisogno riconosciuto. Non superare i dosaggi appropriati.

Prodotto e confezionato da: The Andersons, Inc., Maumee - 43537, OH (USA)

Importato (fabbricante) da: BOTTOS s.r.l.
Via Lusevera, 1 – 33078 San Vito al Tagliamento (PN)

Distribuito da: EMERALD s.r.l.

Dose: 15-25 g/m² (150-250 kg/ha)

Istruzioni per l'uso: applicare 15-25 g/m² di prodotto su manto erboso in crescita. Applicare su manto asciutto. Irrigare dopo l'applicazione coprendo il manto erboso con 5 mm o 6 mm di acqua. Se la temperatura eccede i 25°C applicare solo dosaggi bassi ed irrigare immediatamente dopo l'applicazione. Applicare il prodotto a basse concentrazioni se la temperatura eccede i 25°C. Il presente prodotto contiene ferro, che potrebbe macchiare superfici in cemento o altri materiali. Per evitare che il prodotto macchi, rimuovere le particelle immediatamente o usando una scopa o un soffiatore. NON PULIRE USANDO ACQUA. Conservare in luogo asciutto e pulito. Risigillare il sacchetto aperto piegando ed assicurando la parte superiore. Usare solo spargitori puliti ed asciutti. Non lasciare prodotto non usato negli spargitori.

België	EC-KUNSTMEST NPK-KUNSTMEST MET UREUMFORMALDEHYDE 14 + 28 + 10
14,0%	totaal stikstof (N) 5,9% ammoniumstikstof (N) 2,1% ureumstikstof (N) 6,0% stikstof (N) uit ureumformaldehyde, waarvan: 3,5% stikstof (N) uit ureumformaldehyde alleen oplosbaar is in koud water 1,3% stikstof (N) uit ureumformaldehyde alleen oplosbaar is in heet water
28,0%	Fosforpentoxide (P ₂ O ₅), oplosbaar in neutraal ammoniumcitraat en water, met 26,3% in water oplosbaar P ₂ O ₅
10,0%	kaliumoxide (K ₂ O), in water oplosbaar
8,5%	zweveltrioxide (SO ₃), in water oplosbaar
0,1%	koper (Cu)
1,0%	ijzer (Fe)
0,1%	mangaan (Mn)
0,1%	zink (Zn)

Laag chloridegehalte. Alleen gebruiken waar dit zichtbaar nodig is. Aanbevolen hoeveelheden niet overschrijden.

Importeur voor België: Sports Management bvba
Lorkenlaan 14
2950 Kapellen - België

Aan te brengen hoeveelheden: 15–25 g/m² (150–250 kg/ha)

Gebruiksaanwijzing: product aanbrengen op groeiend gras. Hoeveelheid: 15–25 g/m². Op droog gras aanbrengen. Na aanbrengen gras bewateren (5 à 6 mm). Bij temperaturen > 25°C slechts in kleine hoeveelheden aanbrengen en onmiddellijk na aanbrengen bewateren. Dit product bevat ijzer, wat op beton en andere oppervlakken roestvlekken kan veroorzaken. Gevorsie deeljes onmiddellijk opvegen of wegblazen om vlekken te voorkomen. NIET MET WATER AFSPOELEN. Op een schone, droge plaats bewaren. Geopende verpakking sluiten door bovenkant omlaag te vouwen en te bevestigen. Uitsluitend schone, droge stroommachines gebruiken. Restanten/niet-gebruikt product volledig uit stroommachines verwijderen.

Österreich	14-28-10 Deklaration nach der Österreichischen Düngemittelverordnung 2004 (zuletzt geändert am 07.06.2022): Mineralischer NPK-Dünger mit Spurennährstoffen, Mischdünger
14,0%	N Gesamtstickstoff 5,9% N Ammoniumstickstoff 2,0% N Carbamidstickstoff 2,0% N Formaldehydharbstoff 3,9% N kaltwasserlöslicher Formaldehydharbstoff 5,1% N heißwasserlöslicher Formaldehydharbstoff
28,0%	P ₂ O ₅ neutralammonitrat- und wasserlösliches Phosphat 26,3% P ₂ O ₅ wasserlösliches Phosphat
10,0%	K ₂ O wasserlösliches Kaliumoxid
3,3%	S wasserlösliches Schwefel
0,1%	Cu wasserlösliches Kupfer
1,0%	Fe wasserlösliches Eisen
0,1%	Mn wasserlösliches Mangan
0,1%	Zn wasserlösliches Zink

Komponenten: Monoammoniumphosphat, Kaliumsulfat, Methylenharbstoff, Mikronährstoffmischung, Harnstoff

Hinweise zur sachgerechten Lagerung: In der Originalverpackung trocken, kühl, frostfrei lagern. Restmengen dicht und trocken verschließen. Für Kinder und Haustiere unerreicherbar aufbewahren.

Anwendung: Bei Neuinsaat, Nachsaaten oder P-Mangelstandorten mit 15-25 g/m² auf trockene Bestände ausbringen. Anschließend mindestens mit 5-6 mm beregnen, damit die Körner gleichmäßig in die Rasenarbe fallen. Bei Temperaturen über 30°C nur mit geringer Aufwandmenge streuen und sofort beregnen. Das Produkt enthält Eisen, das auf gepflasterten Oberflächen im Zusammenhang mit Wasser Flecken verursachen kann. Sollte Dünger auf derartige Oberflächen gelangen, nicht mit Wasser entfernen, sondern sofort abkehren.

Hinweis: Empfehlungen der amtlichen Beratungen gehen vor. Nur bei tatsächlichem Bedarf und unter Einhaltung der Aufwandmenge anwenden.

Sicherheitshinweise: Nach der Anwendung Hände und eventuell andere berührte Hautstellen gründlich waschen.

Anwendungsbereich: Hobbygärten, Gala-Bau, Golf- und Sportanlagen

Hersteller: TURF Handels GmbH, Am Harbuden 48, AT-8101 Gratkorn

Gewicht: 20 kg



The Andersons logo and Tee Time are registered trademark of The Andersons, Inc.; MUtech is a trademark of The Andersons, Inc.

France/EC	ENGRAIS EC ENGRAIS NPK CONTENANT DE L'URÉE-FORMALDÉHYDE 14 + 28 + 10 + Fe, Mn, Zn, Cu
14,0%	Azote totale (N) 5,9% Azote amoniacal (N) 2,1% Azote uréique (N) 6,0% Azote (N) de l'urée-formaldéhyde avec 3,5% Azote (N) de l'urée-formaldéhyde soluble uniquement dans l'eau froide 1,3% Azote (N) de l'urée-formaldéhyde soluble uniquement dans l'eau chaude
28,0%	Anhydride phosphorique (P ₂ O ₅) soluble dans le citrate d'ammonium neutre et dans l'eau et 26,3% P ₂ O ₅ soluble dans l'eau
10,0%	Oxyde de potassium (K ₂ O) soluble dans l'eau
8,5%	Anhydride sulfurique (SO ₃) soluble dans l'eau
0,1%	Cuivre (Cu)
1,0%	Fer (Fe)
0,1%	Manganèse (Mn