

Tee Time®

SGN 100

13 + 2 + 13 + Fe, Mn, Zn, Cu

(13 + 0.9 + 10.8 + Fe, Mn, Zn, Cu)

USA/INT	13 + 2 + 13 + Fe, Mn, Zn, Cu
13.0%	Total Nitrogen (N) 13.0% Ammoniacal Nitrogen
2.0%	Available Phosphate (P ₂ O ₅) from ammonium phosphate
13.0%	Soluble Potash (K ₂ O) from potassium sulfate
18.4%	Total Sulfur (S) from sulfate
0.1%	Copper (Cu) from copper oxide
2.0%	Iron (Fe) from iron oxide
0.1%	Manganese (Mn) from manganese oxide
0.1%	Zinc (Zn) from zinc oxide

Application rates: 15–25 g/m² (150–250 kg/ha)

Directions for use: Apply product to actively growing turf at 15–25 g/m². Apply to dry foliage. Water in after application with 5 to 6 mm of irrigation. If temperatures exceed 25°C or if application to damp or wet turf is unavoidable, irrigate immediately after application. Apply at low rates if temperatures exceed 25°C. This product contains iron which may stain concrete and other surfaces. Remove particles promptly by sweeping or blowing to avoid staining. DO NOT WASH OFF WITH WATER. Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing. Use only clean, dry spreaders. Do not leave unused product in spreaders.

Deutschland/Österreich	EC-DÜNGER NK-DÜNGER MIT EISEN, MANGAN, ZINK UND KUPFER 13 + 0 + 13 + Fe, Mn, Zn, Cu
13,0 %	N Gesamtstickstoff 13,0% N Ammoniumstickstoff
13,0 %	K ₂ O wasserlösliches Kaliumoxid
18,4 %	S Schwefel
0,1 %	Cu Kupfer
2,0 %	Fe Eisen
0,1 %	Mn Mangan
0,1 %	Zn Zink

Nettogewicht: 20kg

Hersteller:
Turf Handels GmbH, Am Hartboden 48, A-8101 Gratkorn

Aufwandmenge: 15–25 g/m² (150–250 kg/ha)

Anwendungsempfehlung: Das Produkt mit einer Streueinstellung von 15-25 g/m² auf einem aktiv wachsenden, trockenen Rasen ausstreuen. Nach dem Ausstreuen mit 5 bis 6 mm Wasser bewässern. Bei Temperaturen von über 25 °C nur in geringen Mengen auftragen und sofort nach dem Ausstreuen bewässern. Dieses Produkt enthält Eisen, das Flecken auf Zement und anderen Oberflächen hinterlassen kann. Restpartikel sofort durch Wegfegen oder -bläsen entfernen, um Fleckenbildung zu verhindern. NICHT MIT WASSER ABWASCHEN. An einem sauberen, trockenen Ort lagern. Den geöffneten Beutel durch Umklappen der Oberkante und Sicher verschließen. Nur saubere, trockene Streuer verwenden. Kein unverbrauchtes Produkt im Streuer lassen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren!

Norge	NPK-gjødsel med mikronæring 13 – 1 – 11 (13 – 2 – 13)
13,0%	Nitrogen (N) 13,0% ammonium-N
0,9%	Fosfor (P) 2,0% fosforpentoksyd (P ₂ O ₅)
10,8%	Kalium (K) - vannløselig 13,0% kaliumoksyd (K ₂ O)
18,4%	Svovel (S)- vannløselig
2,0%	Jern (Fe)
0,1%	Kobber (Cu)
0,1%	Sink (Zn)
0,1%	Mangan (Mn)

Basert på ammoniumfosfat, ammonium- og kaliumsulfat, jern-, kobber-, mangan- og sinkoksyd, samt jern-, kobber-, mangan- og zinksulfat.

Skal bare benyttes ved påvist behov til golf- og fotballbaner, park- og hagearealer. De anbefalte mengder må ikke overskrides.

Distributør i Norge:
Floratine Norge AS
Gullfunnet 50
1570 Dilling, NORGE
Reg. nr. (Måttlesjmet): 3270
Nettøvekt: 20 kg

Anbefalte gjødselmengder: 15 – 25 g/m² (150 – 250 kg/ha)

En lettloppelig og meget alsidig NPK-gjødsel som er godt egnet til både sandbaserte og jordbaserte vekstmasser. Gjødsla tilføres når graset er i vekst, og på tørt bladværk. Det varmes 5-6 minutter etter at gjødsling er utført, for å løse opp gjødselkornene. Bruk mindre gjødselmengder ved høye temperaturer (> 25°C), og varm øyeblikkelig for å unngå sviketter. Dette produktet inneholder jern som kan misfarge betong og andre overflater. Fjern partikler umiddelbart ved feiling eller blåsning. VASK IKKE BORT MED VANN. I forbindelse med gjødsling skal det kun benyttes tørre og rene gjødselredere. La ikke gjødsel bli liggende igjen i spredere. Gjødsla skal lagres tørt.

Greece - Αριθμ. Κυκλοφορίας: 31	13 + 2 + 13 + Fe, Mn, Zn, Cu
13,0%	Ολικό άζωτο (N) 13,0% Αμμωνιακό άζωτο
2,0%	Διαθέσιμα Φωσφορικά (P ₂ O ₅)
13,0%	Διαλυτό Κάλιο (K ₂ O) από θειικό κάλιο
18,4%	Ολικό θείο (S)
0,1%	Ολικός Χαλκός (Cu) από οξείδιο του χαλκού
2,0%	Σίδηρος (Fe) από οξείδιο σιδήρου
0,1%	Μαγγάνιο (Mn) από οξείδιο μαγγανίου
0,1%	Ψευδάργυρος (Zn) από οξείδιο ψευδαργύρου

Εισαγωγή στην Ελλάδα από: Georpanikos Oikos
3 Makedonias St., Athens, GREECE

Ρυθμοί εφαρμογής 15–30 g/m² (150–300 kg/ha)

Οδηγίες χρήσης: Εφαρμόστε το προϊόν σε γκαζόν που αναπτύσσεται ενεργά στα 15-30 g/m². Εφαρμόστε σε ήπια ψυλλωσιά. Μερό μετά από εφαρμογή με όρεση 5 έως 6 mm. Αν η θερμοκρασία υπερβαίνει τους 25°C ή αν είναι οδυνηρό να μην κάνει την εφαρμογή σε υπέρθετο ή υγρό γκαζόν, ποτίστε αμέσως μετά την εφαρμογή. Εφαρμόστε με αργό ρυθμό, εάν οι θερμοκρασίες ξεπερνούν τους 25°C. Το προϊόν αυτό περιέχει σίδηρο που μπορεί να προκαλέσει λεκέδες σε ταίμεντο και άλλες επιφανείες. Καθαρίστε τα σωματίδια αμέσως με σκούπισμα ή φύσημα για να αποφεύγετε το λέκισμα. ΜΗΝ ΞΕΠΛΑΝΕΤΕ ΜΕ ΝΕΡΟ. Αποθηκεύστε σε καθαρό, ξηρό χώρο. Να γάνυ στραγιζέτε τις ανοιχτές σκούλες διπλώνοντας το πάνω μέρος προς τα κάτω και ασφαλιζοντάς το. Να χρησιμοποιείτε μόνο καθαρά, στεγνά μηχανήματα σποράς. Μην αφήνετε προϊόν στα μηχανήματα σποράς μετά τη χρήση.

Australia	13 + 0.9 + 10.8 + Fe, Mn, Zn, Cu
13.0%	Total nitrogen (N) 13.0% Ammoniacal nitrogen (N)
0.9%	Phosphorus (P) from ammonium phosphate
10.8%	Potassium (K) from potassium sulfate
18.4%	Sulphur (S) from sulfate
0.1%	Copper (Cu) from copper oxide
2.0%	Iron (Fe) from iron oxide
0.1%	Manganese (Mn) from manganese oxide
0.1%	Zinc (Zn) from zinc oxide

Application rates: 1.5–2.5 kg/100 m² (150–250 kg/ha)

Directions for use: Apply product to actively growing turf at 1.5–2.5 g/m². Apply to dry foliage. Water in after application with 5 to 6 mm of irrigation. If temperatures exceed 25°C or if application to damp or wet turf is unavoidable, irrigate immediately after application. Apply at low rates if temperatures exceed 25°C. This product contains iron which may stain concrete and other surfaces. Remove particles promptly by sweeping or blowing to avoid staining. DO NOT WASH OFF WITH WATER. Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing. Use only clean, dry spreaders. Do not leave unused product in spreaders.

UK/EC	EC FERTILISER NK FERTILISER CONTAINING Fe, Mn, Zn, Cu 13 + 0 + 13 + Fe, Mn, Zn, Cu
13.0%	Total nitrogen (N) 13.0% Ammoniacal nitrogen (N)
13.0%	Potassium oxide (K ₂ O) water soluble
46.0%	Sulphur trioxide (SO ₃) water soluble
0.1%	Copper (Cu)
2.0%	Iron (Fe)
0.1%	Manganese (Mn)
0.1%	Zinc (Zn)

Low in chloride. To be used only where there is a recognised need. Do not exceed the appropriate dose rates. Import in U.K. by: Greentech Sportsturf Ltd. Block 5 Unit 1 - Bandeath Industrial Estate Throsk, Stirling - Scotland FK7 7NP

Application Rates: 15–25 g/m² (150–250 kg/ha)

Directions for use: Apply product to actively growing turf at 15–25 g/m². Apply to dry foliage. Water in after application with 5 to 6 mm of irrigation. If temperatures exceed 25°C or if application to damp or wet turf is unavoidable, irrigate immediately after application. Apply at low rates if temperatures exceed 25°C. This product contains iron which may stain concrete and other surfaces. Remove particles promptly by sweeping or blowing to avoid staining. DO NOT WASH OFF WITH WATER. Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing. Use only clean, dry spreaders. Do not leave unused product in spreaders.

España/CE	ABONO CE NK abono que contenga Fe, Mn, Zn, Cu 13 + 0 + 13 + Fe, Mn, Zn, Cu
13,0%	Nitrógeno total (N) 13,0% Nitrógeno amoniacal (N)
13,0%	de óxido de potasio (K ₂ O) soluble en agua
46,0%	de azufre (SO ₃) soluble en agua
0,1%	Cobre (Cu)
2,0%	Hierro (Fe)
0,1%	Manganeso (Mn)
0,1%	Zinc (Zn)

Bajo en cloruro. Para ser utilizado sólo cuando hay una necesidad reconocida. No sobrepasar las dosis recomendadas.

Importador para España:

Dosis de aplicación: 15–25 g/m² (150–250 Kg/ha)

Instrucciones de uso: Aplicación de productos en crecimiento activo del césped. Aplicar cuando la hoja esté seca. Regar después de la aplicación con 5 a 6 mm de agua de riego. Se aconseja aplicar sólo a dosis bajas si las temperaturas es superior a 25°C. Regar inmediatamente después de la aplicación. Este producto contiene hierro que puede manchar zonas aplicadas a otras superficies. Eliminar las partículas sobrantes barriendo o soplando (máquinas sopladoras) para evitar manchas. NO SE LAVIA CON AGUA. Conservar el envase en un lugar limpio y seco. Una vez abierto el saco evitar que entre humedad, asegúrese de cerrar la parte superior del saco. Utilice sólo abonadoras limpias y secas. No deje de producto no utilizado en las abonadoras.

Denmark	NPK-kunsgødning med mikronæringsstoffer 13–1–11 (13–2–13)
13,0%	Kvælstof (N) 13,0% ammonium-N
0,9%	Phosphor (P) 2,0% phosphorpentoxid (P ₂ O ₅)
10,8%	Kalium (K) 13,0% kaliumoxid (K ₂ O)
18,4%	Svovl (S)
2,0%	Jern (Fe)
0,1%	Kobber (Cu)
0,1%	Zink (Zn)
0,1%	Mangan (Mn)

Baseret på ammoniumfosfat, ammonium- og kaliumsulfat, jern, kobber, mangan og zinkoxid samt jern-, kobber-, mangan- og zinksulfat.

Må kun bruges til dokumenterede behov for golf- og fodboldbaner, parker og haver. De anbefalede mængder må ikke overskrides.

Distributør i Danmark: Floratine Norge AS
Gullfunnet 50
1570 DILLING, NORGE

Applikationsrater: 15–25 g/m² (150–250 kg/ha)

Brugsanvisninger: Kom produktet på aktivt voksende grønsvær ved 15–25 g/m². Kom det på tørre græsstrå. Vand efter pålæringen med 5 to 6 mm kunsvandning. Hvis temperaturen er over 25 °C eller hvis man ikke kan undgå at komme det på fugtig eller våd grønsvær, skal man kunsvandne øjeblikkeligt efter pålæringen. Kom det på langsomt hvis temperaturen er over 25 °C. Dette produkt indeholder jern, som kan plette andre overflader. Fjern partikler med det samme ved at feje eller blæse for at undgå pletter. MÅ IKKE VASKES AF MED VAND. Opbevares et rent, tørt sted. Forsegel den åbne pose igen ved at folde toppen ned og fastgøre den. Brug kun rene, tørre spredere. Der må ikke efterlades ubrugt produkt i en spredere.

Taiwan (R.O.C.)	13 + 2 + 13 + Fe, Mn, Zn, Cu
13,0%	Total Nitrogen (N) 13,0% Ammoniacal Nitrogen
2,0%	Available Phosphate (P ₂ O ₅) from ammonium phosphate
13,0%	Soluble Potash (K ₂ O) from potassium sulfate
18,4%	Total Sulfur (S) from sulfate
0,1%	Copper (Cu) from copper oxide
2,0%	Iron (Fe) from iron oxide
0,1%	Manganese (Mn) from manganese oxide
0,1%	Zinc (Zn) from zinc oxide

Application rates: 15–25 g/m² (150–250 kg/ha)

Directions for use: Apply product to actively growing turf at 15–25 g/m². Apply to dry foliage. Water in after application with 5 to 6 mm of irrigation. If temperatures exceed 25°C or if application to damp or wet turf is unavoidable, irrigate immediately after application. Apply at low rates if temperatures exceed 25°C. This product contains iron which may stain concrete and other surfaces. Remove particles promptly by sweeping or blowing to avoid staining. DO NOT WASH OFF WITH WATER. Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing. Use only clean, dry spreaders. Do not leave unused product in spreaders.

New Zealand	13 + 0.9 + 10.8 + Fe, Mn, Zn, Cu
13.0%	Total nitrogen (N) 13.0% Ammoniacal nitrogen (N)
0.9%	Phosphorus (P) from ammonium phosphate
10.8%	Potassium (K) from potassium sulfate
18.4%	Sulphur (S) from sulfate
0.1%	Copper (Cu) from copper oxide
2.0%	Iron (Fe) from iron oxide
0.1%	Manganese (Mn) from manganese oxide
0.1%	Zinc (Zn) from zinc oxide

Application rates: 15–25 g/m² (150–250 kg/ha)

Directions for use: Apply product to actively growing turf at 15–25 g/m². Apply to dry foliage. Water in after application with 5 to 6 mm of irrigation. If temperatures exceed 25°C or if application to damp or wet turf is unavoidable, irrigate immediately after application. Apply at low rates if temperatures exceed 25°C. This product contains iron which may stain concrete and other surfaces. Remove particles promptly by sweeping or blowing to avoid staining. DO NOT WASH OFF WITH WATER. Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing. Use only clean, dry spreaders. Do not leave unused product in spreaders.

Eire/EC	EC FERTILISER NK FERTILISER CONTAINING Fe, Mn, Zn, Cu 13 + 0 + 10.8 + Fe, Mn, Zn, Cu
13.0%	Total nitrogen (N) 13.0% Ammoniacal nitrogen (N)
10.8%	Potassium (K) water soluble
18.4%	Sulphur (S) water soluble
0.1%	Copper (Cu)
2.0%	Iron (Fe)
0.1%	Manganese (Mn)
0.1%	Zinc (Zn)

Low in chloride. To be used only where there is a recognised need. Do not exceed the appropriate dose rates.

Import in EIRE by: Greentech Sportsturf Ltd. Block 5 Unit 1 - Bandeath Industrial Estate Throsk, Stirling - Scotland FK7 7NP

Application rates: 15–25 g/m² (150–250 kg/ha)

Directions for use: Apply product to actively growing turf at 15–25 g/m². Apply to dry foliage. Water in after application with 5 to 6 mm of irrigation. If temperatures exceed 25°C or if application to damp or wet turf is unavoidable, irrigate immediately after application. Apply at low rates if temperatures exceed 25°C. This product contains iron which may stain concrete and other surfaces. Remove particles promptly by sweeping or blowing to avoid staining. DO NOT WASH OFF WITH WATER. Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing. Use only clean, dry spreaders. Do not leave unused product in spreaders.

Italia	CONCIME CE Concime NK (S) 13–13 (46) con Cu, Fe, Mn e Zn 13 + 0 + 13 + Fe, Mn, Zn, Cu
Azoto (N) totale di cui Azoto (N) ammoniacale	13 % 13 %
Ossido di potassio (K ₂ O) solubile in acqua	13 %
Anidride solforica (SO ₃) solubile in acqua	46 %
Rame (Cu)	0,1 %
Ferro (Fe)	2 %
Manganese (Mn)	0,1 %
Zinco (Zn)	0,1 %

Importato (fabbricante) da: BOTTOS s.r.l.
via Luverera,1 – 33078 San Vito al Tagliamento (PN)

Distribuito da: EMERALD s.r.l.

Dose: 15–25 g/m² (150–250 kg/ha)

Istruzioni per l'uso: Applicare 15–25 g/mq di prodotto su manto erboso asciutto in crescita. Irrigare dopo l'applicazione con 5-6 mm di acqua. Se la temperatura eccede i 25 °C applicare a dosaggi bassi e irrigare immediatamente. Il presente prodotto contiene ferro, che potrebbe macchiare superfici in cemento o altri materiali. Per evitare che il prodotto macchi, rimuovere le particelle immediatamente o usando una scopa o un soffiatore. NON PULIRE USANDO ACQUA. Conservare in luogo asciutto e pulito. Risigillare il sacchetto aperto piegando ed asciugando la parte superiore. Usare solo spargitori puliti e asciutti. Non lasciare prodotto inusato negli spargitori.

België	EC-KUNSTMEST NK-KUNSTMEST MET Fe, Mn, Zn, Cu 13 + 0 + 13 + Fe, Mn, Zn, Cu
13,0%	totaal stikstof (N) 13,0% ammoniakstikstof (N)
13,0%	kaliumoxide (K ₂ O), in water oplosbaar
46,0%	zwaaveltrioxide (SO ₃), in water oplosbaar
0,1%	koper (Cu)
2,0%	ijzer (Fe)
0,1%	mangaan (Mn)
0,1%	zink (Zn)

Laag chloridegehalte. Alleen gebruiken waar dit zichtbaar nodig is. Aanbevolen hoeveelheden niet overschrijden.

Importeur voor België: Sports Management bvba
Lorkenlaan 14
2950 Kapellen - België

Aan te brengen hoeveelheden: 15–25 g/m² (150–250 kg/ha)

Gebruiksaanwijzing: Product aanbrengen op groeiend gras. Hoeveelheid: 15–25 g/m². Op droog gras aanbrengen. Na aanbrengen gras bewateren (5 à 6 mm). Bij temperaturen > 25 °C of als aanbrengen op vochtig of nat gras onvermijdelijk is, onmiddellijk na aanbrengen bewateren. Bij temperaturen > 25 °C slechts in kleine hoeveelheden aanbrengen. Dit product bevat ijzer, wat op beton en andere oppervlakken roestvlekken kan veroorzaken. Gemorstte deeltjes onmiddellijk opvegen of wegfazen om vlekken te voorkomen. NIET MET WATER AFSPOELEN. Op een schone, droge plaats bewaren. Geopende verpakking sluiten door bovenkant omhoog te vouwen en te bevestigen. Uitsluitend schone, droge strooimachines gebruiken. Restanten/niet-gebruikt product volledig uit strooimachines verwijderen.

France/EC	ENGRAIS EC ENGRAIS NK AVEC Fe, Mn, Zn, Cu 13 + 0 + 13 + Fe, Mn, Zn, Cu
13.0%	Azote totale (N) 13,0% Azote ammoniacal (N)
13.0%	Oxyde de potassium (K ₂ O) soluble dans l'eau
46.0%	Anhydride sulfurique (SO ₃) soluble dans l'eau
0.1%	Cuivre (Cu)
2.0%	Fer (Fe)
0.1%	Manganèse (Mn)
0.1%	Zinc (Zn)

Faible teneur en chlorure. À utiliser uniquement en cas de besoin reconnu. Ne pas dépasser les débits de dose appropriés.

Importé en France par: LOB GREEN S.A.S.
25 Rue de la Chapelle
GOURNAY, 62560 VERCHOCQ - France

Taux d'application : 15–25 g/m² (150–250 kg/ha)

Mode d'emploi : Appliquer le produit sur le gazon en plaques en état de croissance active à un taux de 15–25 g/m². Appliquer sur le feuillage sec. Arroser après application avec 5 à 6 mm d'irrigation. Dans des températures supérieures à 25 °C ou si l'application pour humidifier ou mouiller le gazon est inévitable, irriguer immédiatement après application. Appliquer à de faibles taux si les températures sont supérieures à 25 °C. Ce produit contient du fer, susceptible de tacher le béton et d'autres surfaces. Éliminer rapidement les particules en balayant ou en soufflant pour éviter toute tache. NE PAS LAVER À L'EAU. Entreposer dans un endroit propre et sec. Refermer hermétiquement le sac ouvert en repliant le haut et en sécurisant. Utiliser uniquement des épanduses propres et sèches. Ne pas laisser de produit non utilisé dans les épanduses.

Sverige	EU GÖDSSELMEDEL NK-gödselmedel med mikronäring 13 – 0 – 11 (13 – 2 – 13)
13,0 %	Kväve (N) 13,0% ammonium-N
10,8 %	Kalium (K) 13,0% kaliumoxid (K ₂ O)
18,4 %	Svavel (S)
2,0 %	Järn (Fe)
0,1 %	Koppar (Cu)
0,1 %	Zink (Zn)
0,1 %	Mangan (Mn)

Baserat på ammoniumfosfat, ammonium- och kaliumsulfat, järn-, koppar-, mangan- och zinkoxid, samt järn-, koppar-, mangan- och zinksulfat.

Bör endast användas vid behov till golf- och fotbollsplaner, park- och trädgårdsområden. De rekommenderade mängderna får inte överskidas.

Distributör i Sverige: Floratine Scandinavia AB
c/o Floratine Norge AS
Gullfunnet 50
1570 Dilling, NORGE

Rekommenderad mängd: 15–25 g/m² (150–250 kg/ha)

Gödsla när gräset är i tillväxt. Vattna 4-5 minuter efter påföring, för att lösa upp gödselkornen. Använd mindre gödselmängder vid höga temperaturer (> 25 °C), och vattna omedelbart för att undvika brännskador. Mindra produkt innehåller järn som kan misfärga betong och andra ytor. Ta bort partiklar snabbt genom sopning eller blåsning. TVÄTTA INTE BORT MED VATTEN. I samband med gödsling bör endast snabbt och rena gödselspridare användas. Låt inte gödselmedel bli liggande kvar i spridaren. Gödslet skal lagras tørt.

Belgique	ENGRAIS EC ENGRAIS NK AVEC Fe, Mn, Zn, Cu 13 + 0 + 13 + Fe, Mn, Zn, Cu
13,0%	Azote totale (N) 13,0% Azote ammoniacal (N)
13,0%	Oxyde de potassium (K ₂ O) soluble dans l'eau
46,0%	Anhydride sulfurique (SO ₃) soluble dans l'eau
0,1%	Cuivre (Cu)
2,0%	Fer (Fe)
0,1%	Manganèse (Mn)
0,1%	Zinc (Zn)

Faible teneur en chlorure. À utiliser uniquement en cas de besoin reconnu. Ne pas dépasser les débits de dose appropriés.

Importé en Belgique par: Sports Management bvba
Lorkenlaan 14
2950 Kapellen - Belgique

Taux d'application : 15–25 g/m² (150–250 kg/ha)

Mode d'emploi : Appliquer le produit sur le gazon en plaques en état de croissance active à un taux de 15–25 g/m². Appliquer sur le feuillage sec. Arroser après application avec 5 à 6 mm d'irrigation. Dans des températures supérieures à 25 °C ou si l'application pour humidifier ou mouiller le gazon est inévitable, irriguer immédiatement après application. Appliquer à de faibles taux si les températures sont supérieures à 25