

PolySports™

SGN 240

21 + 3 + 21

(21 + 1.3 + 17.4)

75%

NS-54®

USA/INT	21 + 3 + 21
21.0% Total Nitrogen (N) 0.64% Ammoniacal Nitrogen 20.36% Urea Nitrogen*	
3.0% Available Phosphate (P ₂ O ₅) from ammonium phosphate	
21.0% Soluble Potash (K ₂ O) from potassium chloride	
1.46% Total Sulfur (S) from sulfur	
*15.75% Slowly available nitrogen from polymer coated sulfur coated urea.	
Application rates: 20-30 g/m² (200-300 kg/ha)	
Directions for use: Apply product to actively growing turf at 20-30 g/m ² . Apply to dry foliage. Water in after application with 5 to 6 mm of irrigation. If temperatures exceed 25°C or if application to damp or wet turf is unavoidable, irrigate immediately after application. Apply at low rates if temperatures exceed 25°C. Do not use on putting greens. Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing. Use only clean, dry spreaders. Do not leave unused product in spreaders.	

UK/EC	EC FERTILISER NK FERTILISER 21 + 0 + 21
21.0% Total Nitrogen (N) 0.64% Ammoniacal nitrogen (N) 20.36% Ureic nitrogen (N)	
21.0% Potassium oxide (K ₂ O) water soluble	
To be used only where there is a recognised need. Do not exceed the appropriate dose rates.	
Import in U.K. by:	Greentech Sportsturf Ltd. Block 5 Unit 1 - Bandedath Industrial Estate Throsk, Stirling Scotland FK7 7NP
Application Rates: 20-30 g/m² (200-300 kg/ha)	
Directions for use: Apply product to actively growing turf at 20-30 g/m ² . Apply to dry foliage. Water in after application with 5 to 6 mm of irrigation. If temperatures exceed 25°C or if application to damp or wet turf is unavoidable, irrigate immediately after application. Apply at low rates if temperatures exceed 25°C. Do not use on putting greens. Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing. Use only clean, dry spreaders. Do not leave unused product in spreaders.	

Eire/EC	EC FERTILISER NK FERTILISER 21 + 0 + 17.4
21.0% Total nitrogen (N) 0.64% Ammoniacal nitrogen (N) 20.36% Ureic nitrogen (N)	
17.4% Potassium (K) water soluble	
To be used only where there is a recognised need. Do not exceed the appropriate dose rates.	
Import in EIRE by:	Greentech Sportsturf Ltd. Block 5 Unit 1 - Bandedath Industrial Estate Throsk, Stirling Scotland FK7 7NP
Application rates: 20-30 g/m² (200-300 kg/ha)	
Directions for use: Apply product to actively growing turf at 20-30 g/m ² . Apply to dry foliage. Water in after application with 5 to 6 mm of irrigation. If temperatures exceed 25°C or if application to damp or wet turf is unavoidable, irrigate immediately after application. Apply at low rates if temperatures exceed 25°C. Do not use on putting greens. Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing. Use only clean, dry spreaders. Do not leave unused product in spreaders.	

France/EC	ENGRAIS EC ENGRAIS NK 21 + 0 + 21
21,0% Azote totale (N) 0,64% Azote ammoniacale (N) 20,36% Azote uréique (N)	
21,0% Oxyde de potassium (K ₂ O) soluble dans l'eau	
À utiliser uniquement en cas de besoin reconnu. Ne pas excéder les taux de dosage appropriés.	
Importé en France par:	LOB GREEN S.A.S. 25 Rue de la Chapelle GOURNAY, 62560 VERCHOCQ - France
Taux d'application : 20-30 g/m² (200-300 kg/ha)	
Mode d'emploi : Appliquer le produit sur le gazon en plaques en état de croissance active à un taux de 20-30 g/m ² . Appliquer sur le feuillage sec. Arroser après application avec 5 à 6 mm d'irrigation. Dans des températures supérieures à 25°C ou si l'application pour humidifier ou mouiller le gazon est inévitable, irriguer immédiatement après application. Appliquer à de faibles taux si les températures sont supérieures à 25°C. Ne pas utiliser sur les verts de rouler. Entreposer dans un endroit propre et sec. Réformer hermétiquement le sac ouvert en repliant le haut et en sécurisant. Utiliser uniquement des épandeuuses propres et sèches. Ne pas laisser de produit non utilisé dans les épandeuuses.	

Deutschland/Österreich	EG-DÜNGER NK DÜNGER 21 + 0 + 21
21,0 % N Gesamtstickstoff 0,64 % N Ammoniumstickstoff 20,36 % N Harnstoffstickstoff	
21,0 % K ₂ O wasserlösliches Kaliumoxid	
Nettogewicht: 20 kg	
Hersteller: Turf Handels GmbH, Am Hartboden 48, A-8101 Gratkorn	
Aufwandmenge: 20-30 g/m² (200-300 kg/ha)	
Anwendungsempfehlung: Das Produkt mit einer Streueinstellung von 20-30 g/m ² auf einem aktiv wachsenden, trockenem Rasen ausstreuen. Nach dem Ausstreuen mit 5 bis 6 mm Wasser bewässern. Bei Temperaturen von über 25 °C nur in geringen Mengen auftragen und sofort nach dem Ausstreuen bewässern. Nicht auf Übungsgrün verwenden. An einem sauberen, trockenem Ort lagern. Den geöffneten Beutel durch Umklappen der Oberkante und Sichern verschließen. Nur saubere, trockene Streuer verwenden. Kein unverbrauchtes Produkt im Streuer lassen.	

España/CE	FERTILIZANTE EC FERTILIZANTE NK 21 + 0 + 21
21,0% Nitrógeno total (N) 0,64% Nitrógeno amoniacal (N) 20,36% Nitrógeno ureico (N)	
21,0% Óxido de potasio (K ₂ O) soluble en agua	
Sólo debe utilizarse cuando hay una necesidad reconocida. No exceder las dosis adecuadas.	
Importado en España por :	CESSVER VALENCIA,S.L. Plaza Antonio Cortis, 2B, 46013 Valencia - ESPANA
Dosis de aplicación: 20-30 g/m² (200-300 kg/ha)	
Instrucciones de uso: aplique 20-30 g/m ² del producto a céspedes que estén creciendo activamente. Aplique sobre el follaje seco. Riegue agua después de la aplicación, alcanzando 5 a 6 mm de irrigación. Aplique dosis más bajas si las temperaturas superan los 25°C y riegue inmediatamente después de la aplicación. Aplique dosis más bajas si las temperaturas superan los 25°C. No use en áreas putting de golf. Almacene en un sitio limpio y seco. Vuelva a cerrar la bolsa abierta, doblando la parte superior hacia abajo y sujetándola. Sólo use esparcidores limpios y secos. No deje producto sin utilizar en los esparcidores.	

Italia	FERTILIZZANTE EC FERTILIZZANTE NK 21 + 0 + 21
21,0% Totale azoto (N) 0,64% Azoto ammoniacato (N) 20,36% Azoto ureico (N)	
21,0% di ossido di potassio (K ₂ O), solubile in acqua	
Da usare solo quando vi è un bisogno riconosciuto. Non superare i dosaggi appropriati.	
Importato (fabbricante) da:	BOTTOS s.r.l. via Lusevera,1 – 33078 San Vito al Tagliamento (PN)
Distribuito da:	EMERALD s.r.l.
Tassi di applicazione: 20-30 g/m² (200-300 kg/ha)	
Indicazioni per l'uso: Applicare 20-30 g/m ² di prodotto su manto erboso in crescita. Applicare su manto asciutto. Irrigare dopo l'applicazione coprendo il manto erboso con 5 mm o 6 mm di acqua. Se la temperatura eccede i 25°C applicare solo dosaggi bassi ed irrigare immediatamente dopo l'applicazione. Applicare il prodotto a basse concentrazioni se la temperatura eccede i 25°C. Non usare su putting greens in campi da golf. Conservare in luogo asciutto e pulito. Risigillare il sacchetto aperto piegando ed assicurando la parte superiore. Usare solo spargitori puliti ed asciutti. Non lasciare prodotto non usato negli spargitori.	

Sverige	EC KONSTGÖDSELMEDEL NK KONSTGÖDSELMEDEL 21 + 0 + 17,4
21,0 % Totalt kväve (N) 0,64 % Ammoniakkväve (N) 20,36 % Ureakväve (N)	
17,4 % Kalium (K) vattenlösligt	
Bör kunna användas när det konstaterats att det föreligger behov för dess användning. De passande dosraterna får ej överskridas.	
Importerat till Sverige av:	
Applikationsrater: 20-30 g/m² (200-300 kg/ha)	
Bruksanvisningar: Produkten ska påföras i aktivt växande gräsjord med en dos av 20-30 g/m ² . Produkten ska påföras torr lövsamling. Bevattning ska ske med 5-6 mm efter påförandet. Om temperaturen är högre än 25 °C eller om det inte går att tillföra produkten på fuktig eller våt mark, ska bevattning ske genast efter tillförandet. Tillsett i låga doser ifall temperaturen överskrider 25 °C. Får ej användas på green avsedd för putting. Förvara produkten rent och tørt. Återförslut en öppenad säse genom att vika ned och stänga säsens ovanparti. Använd endast rena och torra spridare. Oanvänd produkt får ej lämnas kvar i spridare.	

Norge	NPK-gjødsel med 75% langsomtvirkende N 21 – 1 – 17 (21 - 3 - 21)
21,0% Nitrogen (N) 0,64% ammonium-N 20,36% urea-N hvorav 15,8% fra PCSCU	
1,3% Fosfor (P) 3,0% fosforpentoksyd (P ₂ O ₅)	
17,5% Kalium (K) 21,0% kaliumoksyd (K ₂ O)	
1,5% Svovel (S)	
17,8% Klor (Cl)	
Basert på ammoniumfosfat, urea, polymer- og svoveldekket urea, samt kaliumklorid.	
Skal bare benyttes ved påvist behov til golf- og fotballbaner, park- og hagearealer. De anbefalte mengder må ikke overskrides.	
Distributør i Norge:	Floratine Norge AS Gullfunnet 50 1570 DILLING Reg. nr. (Mattilissynet): 3640
Anbefalte gjødselmengder: 20-30 g/m² (200-300 kg/ha)	
Gjødsla tilføres når grasen er i vekst. Det vannes 4-5 minutter etter at gjødsling er utført, for å få gjødselkornene ned i plantebestandet. Bruk mindre gjødselmengder ved høge temperaturer (> 25°C), og vann øyeblikkelig for å unngå sviskader. I forbindelse med gjødsling skal det kun benyttes tørre og reine gjødselspredere. La ikke gjødsel bli liggende igjen i spredere. Gjødsla skal lagres tørt.	

Denmark	EC KUNSTGØDNING NK KUNSTGØDNING 21 + 0 + 17,4
21,0% Samlet kvælstof (N) 0,64% Ammoniumkvælstof (N) 20,36% Ureakvælstof (N)	
17,4% Kalium (K) vandopløseligt	
Bør kun bruges når det er konstateret, at der er behov for det. De passende dosiserater må ikke overskrides.	
Importeret i Danmark af:	Floratine Norge AS Gullfunnet 50 1570 DILLING
Applikationsrater: 20-30 g/m² (200-300 kg/ha)	
Bruksanvisninger: Kom produktet på aktivt voksende grønsvær ved 20-30 g/m ² . Kom det på tørre græsstrå. Vand efter påføringen med 5 to 6 mm kunstvandig. Hvis temperaturen er over 25°C eller hvis man ikke kan undgå at komme det på fugtig eller våd grønsvær, skal man kunstvande øjeblikkeligt efter påføringen. Kom det på langsomt hvis temperaturen er over 25°C. Må ikke kommes på putting greens. Opbevares et rent, tørt sted. Forsegel den åbne pose igen ved at folde toppen ned og fastgør den. Brug kun rene, tørre spredere. Der må ikke efterlades ubrugt produkt i en speder.	

België	EC-KUNSTMEST NK-KUNSTMEST 21 + 0 + 21
21,0% totaal stikstof (N) 0,64% ammoniakstikstof (N) 20,36% ureumstikstof (N)	
21,0% kaliumoxide (K ₂ O), in water oplosbaar	
Alleen gebruiken waar dit zichtbaar nodig is. Aanbevolen hoeveelheden niet overschrijden.	
Importeur voor België:	Sports Management bvba Lorckenlaan 14 2950 Kapellen – België
Aan te brengen hoeveelheden: 20-30 g/m² (200-300 kg/ha)	
Gebruiksaanwijzing: Product aanbrengen op groeiend gras. Hoeveelheid: 20-30 g/m ² . Op droog gras aanbrengen. Na aanbrengen gras bewateren (5 à 6 mm). Bij temperaturen > 25°C of als aanbrengen op vochtig of nat gras onvermijdelijk is, onmiddellijk na aanbrengen bewateren. Bij temperaturen > 25°C slechts in kleine hoeveelheden aanbrengen. Niet gebruiken op putting greens. Op een schone, droge plaats bewaren. Geopende verpakking sluiten door bovenkant omlaag te vouwen en te bevestigen. Uitsluitend schone, droge strooimachines gebruiken. Restanten/niet-gebruikt product volledig uit strooimachines verwijderen.	

Belgique	ENGRAIS EC ENGRAIS NK 21 + 0 + 21
21,0% Azote totale (N) 0,64% Azote ammoniacale (N) 20,36% Azote uréique (N)	
21,0% Oxyde de potassium (K ₂ O) soluble dans l'eau	
À utiliser uniquement en cas de besoin reconnu. Ne pas excéder les taux de dosage appropriés.	
Importé en Belgique par:	Sports Management bvba Lorckenlaan 14 2950 Kapellen – Belgique
Taux d'application : 20-30 g/m² (200-300 kg/ha)	
Mode d'emploi : Appliquer le produit sur le gazon en plaques en état de croissance active à un taux de 20-30 g/m ² . Appliquer sur le feuillage sec. Arroser après application avec 5 à 6 mm d'irrigation. Dans des températures supérieures à 25°C ou si l'application pour humidifier ou mouiller le gazon est inévitable, irriguer immédiatement après application. Appliquer à de faibles taux si les températures sont supérieures à 25°C. Ne pas utiliser sur les verts de rouler. Entreposer dans un endroit propre et sec. Réformer hermétiquement le sac ouvert en repliant le haut et en sécurisant. Utiliser uniquement des épandeuuses propres et sèches. Ne pas laisser de produit non utilisé dans les épandeuuses.	

Greece	28 + 3 + 10
21,0% Ολικό άζωτο (N) 0,64% Αμμωνιακό άζωτο 20,36% Άζωτο ουρίας*	
3,0% Διαθέσιμα φωσφορούχα (P ₂ O ₅) από φωσφορικό αμμώνιο	
21,0% Διαλυτή Ποτάσα (K ₂ O) από χλωριούχο κάλιο	
1,46% Ολικό θείο (S) από θείο	
*15,75% διαθέσιμο βραδέως άζωτο από πολυμερές επικάλυψη ουρίας επιχρισμένη με θείο.	
Εισαγωγή στην Ελλάδα από: Georponikos Oikos 3 Makedonias St., Athens, GREECE	
Ρυθμοί εφαρμογής 20-30 g/m² (200-300 kg/ha)	
Οδηγίες χρήσης: Εφαρμόστε το προϊόν σε γκαζόν που αναπτύσσεται ενεργά στα 20-30 g/m ² . Εφαρμόστε σε ξηρή φύλλωση. Πότιστε μετά από την εφαρμογή με 5 έως 6 mm αρδευσης. Αν η θερμοκρασία υπερβαίνει τους 25°C ή αν είναι αδύνατον να μην κάνετε την εφαρμογή σε υγραμένο ή υγρό γκαζόν, ποτίστε αμέσως μετά την εφαρμογή. Εφαρμόστε με αργό ρυθμό, εάν οι θερμοκρασίες ξεπερνούν τους 25°C. Μην χρησιμοποιείτε σε γκαζόν «putting green». Αποθηκεύστε σε καθαρό, ξηρό χώρο. Να ζανα σφραγίζετε τις ανοιχτές σακούλες διπλώνοντας το πάνω μέρος προς τα κάτω και ασφαλιζοντάς το. Να χρησιμοποιείτε μόνο καθαρά, στεγνά μηχανήματα σποράς. Μην αφήνετε προϊόν στα μηχανήματα σποράς μετά τη χρήση.	

Taiwan (R.O.C.)	21 + 3 + 21
21.0% Total Nitrogen (N) 0.64% Ammoniacal Nitrogen 20.36% Urea Nitrogen*	
3.0% Available Phosphate (P ₂ O ₅) from ammonium phosphate	
21.0% Soluble Potash (K ₂ O) from potassium chloride	
1.46% Total Sulfur (S) from sulfur	
*15.75% Slowly available nitrogen from polymer coated sulfur coated urea.	
Application rates: 20-30 g/m² (200-300 kg/ha)	
Directions for use: Apply product to actively growing turf at 20-30 g/m ² . Apply to dry foliage. Water in after application with 5 to 6 mm of irrigation. If temperatures exceed 25°C or if application to damp or wet turf is unavoidable, irrigate immediately after application. Apply at low rates if temperatures exceed 25°C. Do not use on putting greens. Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing. Use only clean, dry spreaders. Do not leave unused product in spreaders.	

New Zealand	21 + 1.3 + 17.4
21.0% Total Nitrogen (N) 0.64% Ammoniacal Nitrogen 20.36% Urea Nitrogen*	
1.3% Phosphorus (P) from ammonium phosphate	
17.4% Potassium (K) from potassium chloride	
1.46% Sulfur (S) from sulfate	
*15.75% Slowly available nitrogen from polymer coated sulfur coated urea.	
Application rates: 2.0-3.0 kg/100 m² (200-300 kg/ha)	
Directions for use: Apply product to actively growing turf at 2.0-3.0 kg/100 m ² . Apply to dry foliage. Water in after application with 5 to 6 mm of irrigation. If temperatures exceed 25°C or if application to damp or wet turf is unavoidable, irrigate immediately after application. Apply at low rates if temperatures exceed 25°C. Do not use on putting greens. Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing. Use only clean, dry spreaders. Do not leave unused product in spreaders.	

Australia	21 + 1.3 + 17.4
21.0% Total Nitrogen (N) 0.64% Ammoniacal Nitrogen 20.36% Urea Nitrogen*	
1.3% Phosphorus (P) from ammonium phosphate	
17.4% Potassium (K) from potassium chloride	
1.46% Sulfur (S) from sulfate	
*15.75% Slowly available nitrogen from polymer coated sulfur coated urea.	
Application rates: 2.0-3.0 kg/100 m² (200-300 kg/ha)	
Directions for use: Apply product to actively growing turf at 2.0-3.0 kg/100 m ² . Apply to dry foliage. Water in after application with 5 to 6 mm of irrigation. If temperatures exceed 25°C or if application to damp or wet turf is unavoidable, irrigate immediately after application. Apply at low rates if temperatures exceed 25°C. Do not use on putting greens. Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing. Use only clean, dry spreaders. Do not leave unused product in spreaders.	

New Zealand	21 + 1.3 + 17.4
21.0% Total Nitrogen (N) 0.64% Ammoniacal Nitrogen 20.36% Urea Nitrogen*	
1.3% Phosphorus (P) from ammonium phosphate	
17.4% Potassium (K) from potassium chloride	
1.46% Sulfur (S) from sulfate	
*15.75% Slowly available nitrogen from polymer coated sulfur coated urea.	
Application rates: 20-30 g/m² (200-300 kg/ha)	
Directions for use: Apply product to actively growing turf at 20-30 g/m ² . Apply to dry foliage. Water in after application with 5 to 6 mm of irrigation. If temperatures exceed 25°C or if application to damp or wet turf is unavoidable, irrigate immediately after application. Apply at low rates if temperatures exceed 25°C. Do not use on putting greens. Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing. Use only clean, dry spreaders. Do not leave unused product in spreaders.	

	Ground Speed	Width of Coverage	Spreader Settings		
				20 g/m²	25 g/m²
Model 2000 (cone 4); 2000 SR (cone 4) Settings for single pass application = FULL RATE	5 km/hr	3.7 m	L 1/2	M 1/2	N 1/2
Lely Models WTR, WFR, HR & 1250 (pattern II-C) Settings for single pass application = FULL RATE	7 km/hr	12.2 m	6	6 1/2	7
Vicon (03 Series) Settings for single pass application = FULL RATE	7 km/hr	9.7 m	33	36	39
Suggested spreader settings are not intended to replace calibration. Please calibrate your spreader before applying product.					

Australia	21 + 1.3 + 17.4
21.0% Total Nitrogen (N) 0.64% Ammoniacal Nitrogen 20.36% Urea Nitrogen*	
1.3% Phosphorus (P) from ammonium phosphate	
17.4% Potassium (K) from potassium chloride	
1.46% Sulfur (S) from sulfate	
*15.75% Slowly available nitrogen from polymer coated sulfur coated urea.	
Application rates: 2.0-3.0 kg/100 m² (200-300 kg/ha)	
Directions for use: Apply product to actively growing turf at 2.0-3.0 kg/100 m ² . Apply to dry foliage. Water in after application with 5 to 6 mm of irrigation. If temperatures exceed 25°C or if application to damp or wet turf is unavoidable, irrigate immediately after application. Apply at low rates if temperatures exceed 25°C. Do not use on putting greens. Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing. Use only clean, dry spreaders. Do not leave unused product in spreaders.	

	Manufactured by: The Andersons, Inc. P. O. Box 119 Maumee, OH 43537 U.S.A. AndersonsPro.com	<h1>25 kg/net</h1> <h1>10005502</h1>	
	The Andersons logo and NS-54 are registered trademarks of The Andersons, Inc.; PolySports is a trademark of The Andersons, Inc.		