Tee Time®

SGN 100

10 + 5 + 25

(10 + 2.2 + 20.8)

50% MUtech™

USA/INT

10 + 5 + 25

10.0% Total Nitrogen (N)
- 1.0% Ammoniacal Nitrogen
- 4.7% Urea Nitrogen
- 2.5% Other Water Soluble Nitrogen from methylene ureas
- 1.8% Water Insoluble Nitrogen from methylene ureas

5.0% Available Phosphate (P_2O_5) from ammonium phosphate

25.0% Soluble Potash (K_2O) from potassium sulfate

8.5% Total Sulfur (S) from sulfate

0.1% Copper (Cu) from cupric oxide

1.0% Iron (Fe) from ferric oxide

0.1% Manganese (Mn) from manganous oxide

0.1% Zinc (Zn) from zinc oxide

Application rates: 15–30 g/m² (150-300 kg/ha)

Directions for use: Apply product to actively growing turf at 15–30 g/m². Apply to dry foliage. Water in after application with 5 to 6 mm of irrigation. If temperatures exceed 25°C or if application to damp or wet turf is unavoidable, irrigate immediately after application. Apply at low rates if temperatures exceed 25°C. This product contains iron which may stain concrete and other surfaces. Remove particles promptly by sweeping or blowing to avoid staining. DO NOT WASH OFF WITH WATER. Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing. Use only clean, dry spreaders. Do not leave unused product in spreaders.

UK/EC

EC FERTILISER
NPK FERTILISER CONTAINING UREA FORMALDEHYDE
10 + 5 + 25

10.0% Total nitrogen (N)
- 1.0% Ammoniacal nitrogen (N)
- 4.7% Ureic nitrogen (N)
- 4.3% Nitrogen (N) from urea formaldehyde with
  - 2.5% Nitrogen (N) from urea formaldehyde only soluble in cold water
  - 0.9% Nitrogen (N) from urea formaldehyde only soluble in hot water

5.0% Phosphorous pentoxide (P_2O_5) soluble in neutral ammonium citrate and water with 4.7% water soluble P_2O_5

25.0% Potassium oxide (K_2O) water soluble

21.25% Sulphur Trioxide (SO_3) water soluble

0.1% Copper (Cu)

1.0% Iron (Fe)

0.1% Manganese (Mn)

0.1% Zinc (Zn)

Low in chloride. To be used only where there is a recognised need. Do not exceed the appropriate dose rates.

Import in U.K. by: Greentech Sportsturf Ltd.
Block 5 Unit 1 - Bandeath Industrial Estate
Throsk, Stirling, Scotland FK7 7NP

Application rates: 15–30 g/m² (150–300 kg/ha)

Directions for use: Apply product to actively growing turf at 15–30 g/m². Apply to dry foliage. Water in after application with 5 to 6 mm of irrigation. If temperatures exceed 25°C or if application to damp or wet turf is unavoidable, irrigate immediately after application. Apply at low rates if temperatures exceed 25°C. This product contains iron which may stain concrete and other surfaces. Remove particles promptly by sweeping or blowing to avoid staining. DO NOT WASH OFF WITH WATER. Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing. Use only clean, dry spreaders. Do not leave unused product in spreaders.

Eire/EC

EC FERTILISER
NPK FERTILISER CONTAINING UREA FORMALDEHYDE
10 + 2.2 + 20.8

10.0% Total nitrogen (N)
- 1.0% Ammoniacal Nitrogen (N)
- 4.7% Ureic Nitrogen (N)
- 4.3% Nitrogen (N) from urea formaldehyde with
  - 2.5% Nitrogen (N) from urea formaldehyde only soluble in cold water
  - 0.9% Nitrogen (N) from urea formaldehyde only soluble in hot water

2.2% Phosphorus (P) soluble in neutral ammonium citrate and water with 2.0% water soluble P

20.8% Potassium (K) water soluble

8.5% Sulphur (S) water soluble

0.1% Copper (Cu)

1.0% Iron (Fe)

0.1% Manganese (Mn)

0.1% Zinc (Zn)

Low in chloride. To be used only where there is a recognised need. Do not exceed the appropriate dose rates.

Import in EIRE by: Greentech Sportsturf Ltd.
Block 5 Unit 1 - Bandeath Industrial Estate
Throsk, Stirling - Scotland FK7 7NP

Application rates: 15–30 g/m² (150–300 kg/ha)

Directions for use: Apply product to actively growing turf at 15–30 g/m². Apply to dry foliage. Water in after application with 5 to 6 mm of irrigation. If temperatures exceed 25°C or if application to damp or wet turf is unavoidable, irrigate immediately after application. Apply at low rates if temperatures exceed 25°C. This product contains iron which may stain concrete and other surfaces. Remove particles promptly by sweeping or blowing to avoid staining. DO NOT WASH OFF WITH WATER. Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing. Use only clean, dry spreaders. Do not leave unused product in spreaders.

France/EC

ENGRAIS EC
ENGRAIS NPK CONTENANT DE L'URÉE-FORMALDÉHYDE
10 + 5 + 25

10,0% Azote totale (N)
- 1,0% Azote ammoniacal (N)
- 4,7% Azote uréique (N)
- 4,3% Azote (N) de l'urée-formaldéhyde avec
  - 2,5% Azote (N) de l'urée-formaldéhyde soluble uniquement dans l'eau froide
  - 0,9% Azote (N) de l'urée-formaldéhyde soluble uniquement dans l'eau chaude

5,0% Anhydride phosphorique (P_2O_5) soluble dans le citrate d'ammonium neutre et dans l'eau et 4,7% P_2O_5 soluble dans l'eau

25,0% Oxyde de potassium (K_2O) soluble dans l'eau

21,25% Anhydride sulfurique (SO_3) soluble dans l'eau

0,1% Cuivre (Cu)

1,0% Fer (Fe)

0,1% Manganèse (Mn)

0,1% Zinc (Zn)

Faible teneur en chlorure. À utiliser uniquement en cas de besoin reconnu. Ne pas dépasser les débits de dose appropriés.

Importé en France par: LOB GREEN S.A.S.
25 Rue de la Chapelle
GOURNAY, 62560 VERCHOCQ - France

Taux d'application: 15–30 g/m² (150–300 kg/ha)

Mode d'emploi: Appliquer le produit sur le gazon en plaques en état de croissance active à un taux de 15–30 g/m². Appliquer sur le feuillage sec. Arroser après application avec 5 à 6 mm d'irrigation. Dans des températures supérieures à 25°C ou si l'application pour humidifier ou mouiller le gazon est inévitable, irriguer immédiatement après application. Appliquer à de faibles taux si les températures sont supérieures à 25°C. Ce produit contient du fer, susceptible de tacher le béton et d'autres surfaces. Éliminer rapidement les particules en balayant ou en soufflant pour éviter toute tache. NE PAS LAVER À L'EAU. Entreposer dans un endroit propre et sec. Refermer hermétiquement le sac ouvert en repliant le haut et en sécurisant. Utiliser uniquement des épandeuses propres et sèches. Ne pas laisser de produit non utilisé dans les épandeuses.

Deutschland/Österreich

EC-DÜNGER
NPK- DÜNGER MIT EISEN, MANGAN, ZINK UND KUPFER
10 + 5 + 25

10 %	N	Gesamtstickstoff davon:
		1,0 % N Ammoniumstickstoff
		4,7 % N Carbamidstickstoff
		4,3 % N Formaldehydharnstoff davon:
		2,5 % N kaltwasserlöslicher Formadehydharnstoff
		0,9 % N heißwasserlöslicher Formaldehydharnstoff
5 %	P_2O_5	neutral-ammoncitratlösliches und wasserlösliches Phosphat davon 4,7% P_2O_5 wasserlösliches Phosphat
25 %	K_2O	wasserlösliches Kaliumoxid
8,5%	S	Schwefel
0,1%	Cu	Kupfer
1,0 %	Fe	Eisen
0,1%	Mn	Mangan
0,1%	Zn	Zink

Nettogewicht: 20kg

Hersteller:
Turf Handels GmbH, Am Hartboden 48, A-8101 Gratkorn

Aufwandmenge: 15–30 g/m² (150–300 kg/ha)

Anwendungsempfehlung: Das Produkt mit einer Streueinstellung von 15–30 g/m² auf einem aktiv wachsenden, trockenen Rasen ausstreuen. Nach dem Ausstreuen mit 5 bis 6 mm Wasser bewässern. Bei Temperaturen von über 25 °C nur in geringen Mengen auftragen und sofort nach dem Ausstreuen bewässern. Dieses Produkt enthält Eisen, das Flecken auf Zement und anderen Oberflächen hinterlassen kann. Restpartikel sofort durch Wegfegen oder -blasen entfernen, um Fleckenbildung zu verhindern. NICHT MIT WASSER ABWASCHEN. An einem sauberen, trockenen Ort lagern. Den geöffneten Beutel durch Umklappen der Oberkante und Sichern verschließen. Nur saubere, trockene Streuer verwenden. Kein unverbrauchtes Produkt im Streuer lassen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren!

España/CE

FERTILIZANTE EC
FERTILIZANTE NPK FORMALDEHÍDO
10 + 5 + 25

10,0% Nitrógeno total (N)
- 1,0% Nitrógeno amoniacal (N)
- 4,7% Nitrógeno ureico (N)
- 4,3% Nitrógeno (N) de formaldehído de urea, con
  - 2,5% Nitrógeno (N) de formaldehído de urea, sólo soluble en agua fría
  - 0,9% Nitrógeno (N) de formaldehído de urea, sólo soluble en agua caliente

5,0% Pentóxido de fósforo (P_2O_5) soluble en citrato amónico neutro y agua con 4,7% soluble en agua P_2O_5

25,0% Óxido de potasio (K_2O) soluble en agua

21,25% Trióxido de azufre (SO_3) soluble en agua

0,1% Cobre (Cu)

1,0% Hierro (Fe)

0,1% Manganeso (Mn)

0,1% Zinc (Zn)

Bajo en cloro. Se debe usar sólo se reconozca que es necesario. No exceda las dosis recomendadas.

Importador para España:

Dosis de aplicación: 15–30 g/m² (150–300 kg/ha)

Instrucciones de uso: aplique 15–30 g/m² del producto a céspedes que estén creciendo activamente. Aplique sobre el follaje seco. Riegue agua después de la aplicación, alcanzando 5 a 6 mm de irrigación. Si la temperatura supera los 25°C o si es inevitable aplicar sobre céspedes húmedos o mojados, riegue inmediatamente después de la aplicación. Aplique dosis más bajas si las temperaturas superan los 25°C. Este producto contiene hierro, el cual puede manchar el concreto y otras superficies. Para evitar manchas, elimine prontamente las partículas del producto mediante barrido o soplado. NO ELIMINAR CON AGUA. Almacene en un sitio limpio y seco. Vuelva a cerrar la bolsa abierta, doblando la parte superior hacia abajo y sujetándola. Sólo use esparcidores limpios y secos. No deje producto sin utilizar en los esparcidores.

Italia

FERTILIZZANTE EC
FERTILIZZANTE NPK CONTENENTE UREA FORMALDEIDE
10 + 5 + 25

10,0% Totale azoto (N)
- 1,0% Azoto ammoniacato (N)
- 4,7% Azoto ureico (N)
- 4,3% Azoto (N) da urea formaldeide con
  - 2,5% Azoto (N) da urea formaldeide solubile solo in acqua fredda
  - 0,9% Azoto (N) da urea formaldeide solubile solo in acqua calda

5,0% Pentossido di fosforo (P_2O_5) solubile in citrato di ammonio neutro e acqua con 4,7% di P_2O_5 solubile in acqua

25,0% Ossido di potassio (K_2O) solubile in acqua

21,25% Triossido di zolfo (SO_3) solubile in acqua

0,1% Rame (Cu)

1,0% Ferro (Fe)

0,1% Manganese (Mn)

0,1% Zinco (Zn)

Basso contenuto di cloro. Da usare solo quando vi è un bisogno riconosciuto. Non superare i dosaggi appropriati.

Prodotta e confezionato da: The Andersons, Inc., Maumee - 43537, OH (USA)

Importato (fabbricante) da: BOTTOS s.r.l.
via Lusevera,1 – 33078 San Vito al Tagliamento (PN)

Distribuito da: EMERALD s.r.l.

Dose: 15–30 g/m² (150–300 kg/ha)

Istruzioni per l'uso: 15–30 g/m² di prodotto su manto erboso in crescita. Applicare su manto asciutto. Irrigare dopo l'applicazione coprendo il manto erboso con 5 mm o 6 mm di acqua. Se la temperatura eccede i 25°C applicare solo dosaggi bassi ed irrigare immediatamente dopo l'applicazione. Applicare il prodotto a basse concentrazioni se la temperatura eccede i 25°C. Il presente prodotto contiene ferro, che potrebbe macchiare superfici in cemento o altri materiali. Per evitare che il prodotto macchi, rimuovere le particelle immediatamente o usando una scopa applicare o un soffiatore. NON PULIRE USANDO ACQUA. Conservare in luogo asciutto e pulito. Risigillare il sacchetto aperto piegando ed assicurando la parte superiore. Usare solo spargitori puliti ed asciutti. Non lasciare prodotto non usato negli spargitori.

Sverige

EU GÖDSELMEDEL
NPK-gödselmedel med 50 % långtidsverkande N
10 – 2 – 21
(10 – 5 – 25)

10,0 %	Kväve (N)	1,0% ammonium-N; 4,7% urea-N; 4,3% metylenurea; varav 1,8% vattenlöslig N (WIN)
2,2%	Fosfor (P)	5,0% fosforpentoxid (P_2O_5)
20,8 %	Kalium (K)	25,0% kaliumoxid (K_2O)
8,5%	Svavel (S)	
1,0 %	Järn (Fe)	
0,1%	Mangan (Mn)	
0,1%	Zink (Zn)	
0,1%	Koppar (Cu)	

Baserat på ammoniumfosfat, urea, metylenurea, kalium-, järn-, mangan-, zink- och kopparsulfat, järn-, mangan-, zink- och kopparoxid.

Bör endast användas vid behov till golf- och fotbollsplaner, park- och trädgårdsområden. De rekommenderade mängderna får inte överskridas

Distributör i Sverige: Floratine Scandinavia AB
c/o Floratine Norge AS
Gullfunnet 50
1570 Dilling, NORGE

Rekomenderad mängd: 15–30 g/m² (150–300 kg/ha)

Gödsla när gräset är i tillväxt. Vattna 4-5 minuter efter påföring, för att lösa upp gödselkornen. Använd mindre gödselmängder vid höga temperaturer (> 25°C), och vattna omedelbart för att undvika brännskador. Denna produkt innehåller järn som kan missfärga betong och andra ytor. Ta bort partiklar snabbt genom sopning eller blåsning. TVATTA INTE BORT MED VATTEN. I samband med gödsling bör endast torra och rena gödselspridare användas. Låt inte gödselmedel bli liggande kvar i spridaren. Gödslet skal lagras tort.

Norge

NPK-gjødsel med mikronæring
10 – 2 – 21
(10 – 5 – 25)

10,0%	Nitrogen (N)	2,0% ammonium-N; 3,8% urea-N; 4,2% metylenurea; hvorav 1,7% vannuløselig N (WIN)
2,2%	Fosfor (P) – vannløselig (2,0 %)	5,0% fosforpentoksyd (P_2O_5)
20,8%	Kalium (K) – vannløselig	25,0% kaliumoksyd (K_2O)
8,5%	Svovel (S) – vannløselig	
0,1%	Kobber (Cu) – vannløselig	
1,0%	Jern (Fe) – vannløselig	
0,1%	Mangan (Mn) – vannløselig	
0,1%	Sink (Zn) – vannløselig	

Basert på ammoniumfosfat, urea, metylenurea, kalium-, jern-, mangan, sink- og kobbersulfat, jern-, mangan-, sink- og kobberoksyd.

Skal bare benyttes ved påvist behov til golf- og fotballbaner, park- og hagearealer. De anbefalte mengder må ikke overskrides.

Distributør i Norge: Floratine Norge AS
Gullfunnet 50
1570 Dilling, NORGE

Reg. nr. (Mattilsynet): 3253
Nettovekt: 20 kg

Anbefalte gjødselmengder: 15 – 30 g/m2 (150 – 300 kg/ha)

En langsomtvirkende NPK-gjødsel, hvor 50 % av nitrogenet frigjøres langsomt via mikrobiell nedbryting. Gjødsla tilføres når graset er i vekst, og på tørt bladverk. Det vannes 4-5 minutter etter at gjødsling er utført, for å få gjødselkornene ned i plantebestandet. Bruk mindre gjødselmengder ved høye temperaturer (> 25oC), og vann øyeblikkelig for å unngå sviskader. I forbindelse med gjødsling skal det kun benyttes tørre og reine gjødselspredere. La ikke gjødsel bli liggende igjen i sprederen. Gjødsla skal lagres tørt.

Denmark

NPK-gødning med 50% langsomtvirkende N
10 – 2 – 21
(10 – 5 – 25)

10,0%	Kvælstof (N)	1,0% ammonium-N; 4,7% urea-N; 4,3% methylenurinstof; hvoraf 1,8% vandopløseligt N (WIN)
2,2%	Phosphor (P)	5,0% Phosphorpentoxid (P_2O_5)
20,8%	Kalium (K)	16,0% kaliumoxid (K_2O)
8,5%	Svovl (S)	
1,0%	Jern (Fe)	
0,1%	Mangan (Mn)	
0,1%	Zink (Zn)	
0,1%	Kobber (Cu)	

Baseret på ammoniumphosphat, urinstof, methylenurinstof, kalium-, jern-, mangan-, zink- og kobbersulfat, jern-, mangan-, zink- og kobberoxid.

Må kun bruges til dokumenterede behov for golf- og fodboldbaner, park og haveområder. De anbefalede mængder må ikke overskrides.

Distributør i Danmark: Floratine Norge AS
Gullfunnet 50
1570 DILLING, NORGE

Anbefalede gødningsmængder: 15–30 g/m² (150–300 kg/ha)

Gødning tilsættes, når græsset vokser. Det vandes 4-5 minutter, efter at befrugtningen er gennemført for at bringe gødningsgraden ind i plantepopulationen. Brug mindre gødning ved høje temperaturer (> 25 ° C), og vand straks for at undgå sved. Dette produkt indeholder jern, der kan misfarve beton og andre overflader. Fjern partikler straks ved at feje eller blæse. VASK IKKE MED VAND. Til gødningsbrug kun tør og ren gødningsspredere. Lad ikke gødning forblive i sprederen. Gødning skal opbevares tørt.

België

EC-KUNSTMEST
NPK-KUNSTMEST MET UREUMFORMALDEHYDE
10 + 5 + 25

10,0% totaal stikstof (N)
- 1,0% ammoniakstikstof (N)
- 4,7% ureumstikstof (N)
- 4,3% stikstof (N) uit ureumformaldehyde, waarvan:
  - 2,5% stikstof (N) uit ureumformaldehyde alleen oplosbaar is in koud water
  - 0,9% stikstof (N) uit ureumformaldehyde alleen oplosbaar is in heet water

5,0% Fosforpentoxide (P_2O_5), oplosbaar in neutraal ammoniumcitraat en water, met 4,7% in water oplosbaar P_2O_5

25,0% kaliumoxide (K_2O), in water oplosbaar

21,25% zwaveltrioxide (SO_3), in water oplosbaar

0,1% koper (Cu)

1,0% ijzer (Fe)

0,1% mangaan (Mn)

0,1% zink (Zn)

Laag chloridegehalte. Alleen gebruiken waar dit zichtbaar nodig is. Aanbevolen hoeveelheden niet overschrijden.

Importeur voor België: Sports Management bvba
Lorkenlaan 14
2950 Kapellen - België

Aan te brengen hoeveelheden: 15–30 g/m² (150–300 kg/ha)

Gebruiksaanwijzing: product aanbrengen op groeiend gras. Hoeveelheid: 15–30 g/m². Op droog gras aanbrengen. Na aanbrengen gras bewateren (5 à 6 mm). Bij temperaturen > 25°C slechts in kleine hoeveelheden aanbrengen en onmiddellijk na aanbrengen bewateren. Dit product bevat ijzer, wat op beton en andere oppervlakken roestvlekken kan veroorzaken. Gemorste deeltjes onmiddellijk opvegen of wegblazen om vlekken te voorkomen. NIET MET WATER AFSPOELEN. Op een schone, droge plaats bewaren. Geopende verpakking sluiten door bovenkant omlaag te vouwen en te bevestigen. Uitsluitend schone, droge strooimachines gebruiken. Restanten/niet-gebruikt product volledig uit strooimachines verwijderen.

Belgique

ENGRAIS EC
ENGRAIS NPK CONTENANT DE L'URÉE-FORMALDÉHYDE
10 + 5 + 25

10,0% Azote totale (N)
- 1,0% Azote ammoniacal (N)
- 4,7% Azote uréique (N)
- 4,3% Azote (N) de l'urée-formaldéhyde avec
  - 2,5% Azote (N) de l'urée-formaldéhyde soluble uniquement dans l'eau froide
  - 0,9% Azote (N) de l'urée-formaldéhyde soluble uniquement dans l'eau chaude

5,0% Anhydride phosphorique (P_2O_5) soluble dans le citrate d'ammonium neutre et dans l'eau et 4,7% P_2O_5 soluble dans l'eau

25,0% Oxyde de potassium (K_2O) soluble dans l'eau

21,25% Anhydride sulfurique (SO_3) soluble dans l'eau

0.1% Cuivre (Cu)

1.0% Fer (Fe)

0.1% Manganèse (Mn)

0.1% Zinc (Zn)

Faible teneur en chlorure. À utiliser uniquement en cas de besoin reconnu. Ne pas dépasser les débits de dose appropriés.

Importation en Belgique par: Sports Management bvba
Lorkenlaan 14
2950 Kapellen - Belgique

Taux d'application: 15–30 g/m² (150–300 kg/ha)

Mode d'emploi: Appliquer le produit sur le gazon en plaques en état de croissance active à un taux de 15–30 g/m². Appliquer sur le feuillage sec. Arroser après application avec 5 à 6 mm d'irrigation. Dans des températures supérieures à 25°C ou si l'application pour humidifier ou mouiller le gazon est inévitable, irriguer immédiatement après application. Appliquer à de faibles taux si les températures sont supérieures à 25°C. Ce produit contient du fer, susceptible de tacher le béton et d'autres surfaces. Éliminer rapidement les particules en balayant ou en soufflant pour éviter toute tache. NE PAS LAVER À L'EAU. Entreposer dans un endroit propre et sec. Refermer hermétiquement le sac ouvert en repliant le haut et en sécurisant. Utiliser uniquement des épandeuses propres et sèches. Ne pas laisser de produit non utilisé dans les épandeuses.

Greece - Αριθμ. Κυκλοφορίας: 31

10 + 5 + 25

10,0% Ολικό άζωτο (N)
- 1,0% Αμμωνιακό άζωτο
- 4,7% Άζωτο ουρίας
- 2,5% Άλλο υδατοδιαλυτό Άζωτο από ουρίες μεθυλενίου
- 1,8% Αδιάλυτο στο νερό Άζωτο από ουρίες μεθυλενίου

5,0% Διαθέσιμο φωσφορικό (P_2O_5) από φωσφορικό αμμώνιο

25,0% Διαλυτή ποτάσσα (K_2O) από θειικό κάλιο

8,5% Ολικό θείο (S) από θειικό

0,1% Ολικός Χαλκός (Cu) από οξείδιο του χαλκού

1,0% Σίδηρος (Fe) από οξείδιο σιδήρου

0,1% Μαγγάνιο (Mn) από οξείδιο μαγγανίου

0,1% Ψευδάργυρος (Zn) από οξείδιο ψευδαργύρου

Εισαγωγή στην Ελλάδα από: Geoponikos Oikos
3 Makedonias St., Athens, GREECE

Ρυθμοί εφαρμογής 15–30 g/m² (150–300 kg/ha)

Οδηγίες χρήσης: Εφαρμόστε το προϊόν σε γκαζόν που αναπτύσσεται ενεργά στα 15–30 g/m². Εφαρμόστε σε ξηρή φυλλωσιά. Νερό μετά από εφαρμογή με άρδευση 5 έως 6 mm. Αν η θερμοκρασία υπερβαίνει τους 25°C ή αν είναι αδύνατον να μην κάνετε την εφαρμογή σε υγραμένο ή υγρό γκαζόν, ποτίστε αμέσως μετά την εφαρμογή. Εφαρμόστε με αργό ρυθμό, εάν οι θερμοκρασίες ξεπερνούν τους 25°C. Το προϊόν αυτό περιέχει σίδηρο που μπορεί να προκαλέσει λεκέδες σε τσιμέντο και άλλες επιφάνειες. Καθαρίστε τα σωματίδια αμέσως με σκούπισμα ή φύσημα για να αποφύγετε το λέκιασμα. ΜΗΝ ΞΕΠΛΕΝΕΤΕ ΜΕ ΝΕΡΟ. Αποθηκεύστε σε καθαρό, ξηρό χώρο. Να ξανα σφραγίζετε τις ανοιχτές σακούλες διπλώνοντας το πάνω μέρος προς τα κάτω και ασφαλίζοντάς το. Να χρησιμοποιείτε μόνο καθαρά, στεγνά μηχανήματα σποράς. Μην αφήνετε προϊόν στα μηχανήματα σποράς μετά τη χρήση.

Taiwan (R.O.C.)

甲菁旺 (10-5-25)

肥料登記證字號：肥進 (微) 字第 0128001 號
肥料品目：雜項次量微量要素肥料 (4-41)
國外廠牌商品名稱：TEE TIME 10-5-25 WITH 50% MUTECH
保證成份：全氮 10.0%、 內含銨態氮 1.0%、 水溶性磷酐5.0%、 水溶性氧化鉀 25.0 %、 全鋅0.1%、 全銅0.1%
成品性狀：固態，顆粒狀
使用方法：於作物生長季節春至秋末適量施灑。
使 用 量：春至秋季施用20公克/平方公尺，秋末追肥施用25公克/平方公尺。
包裝方式：袋裝　　淨重：20 kg
有效期限：5年　　批號：請詳見包裝
製造日期：請詳見包裝　　電話：04-22135266
總代理：菁修企業有限公司
地址：台中市東區自由路四段210號
製造地：美國
製造廠商： THE ANDERSONS, INC.
P. O. BOX 119, MAUMEE, OH USA 43537

Australia

10 + 2.2 + 20.8

10.0% Total Nitrogen (N)
- 1.0% Ammoniacal Nitrogen
- 4.7% Urea Nitrogen
- 2.5% Other Water Soluble Nitrogen from methylene ureas
- 1.8% Water Insoluble Nitrogen from methylene ureas

2.2% Phosphorus (P) from ammonium phosphate

20.8% Potassium (K) from potassium sulfate

8.5% Total Sulfur (S) from sulfate

0.1% Copper (Cu) from cupric oxide

1.0% Iron (Fe) from ferric oxide

0.1% Manganese (Mn) from manganous oxide

0.1% Zinc (Zn) from zinc oxide

Application rates: 1.5–3.0 g/m² (150–300 kg/ha)

Directions for use: Apply product to actively growing turf at 1.5–3.0 g/m². Apply to dry foliage. Water in after application with 5 to 6 mm of irrigation. If temperatures exceed 25°C or if application to damp or wet turf is unavoidable, irrigate immediately after application. Apply at low rates if temperatures exceed 25°C. This product contains iron which may stain concrete and other surfaces. Remove particles promptly by sweeping or blowing to avoid staining. DO NOT WASH OFF WITH WATER. Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing. Use only clean, dry spreaders. Do not leave unused product in spreaders.

New Zealand

10 + 2.2 + 20.8

10.0% Total Nitrogen (N)
- 1.0% Ammoniacal Nitrogen
- 4.7% Urea Nitrogen
- 2.5% Other Water Soluble Nitrogen from methylene ureas
- 1.8% Water Insoluble Nitrogen from methylene ureas

2.2% Phosphorus (P) from ammonium phosphate

20.8% Potassium (K) from potassium sulfate

8.5% Total Sulfur (S) from sulfate

0.1% Copper (Cu) from cupric oxide

1.0% Iron (Fe) from ferric oxide

0.1% Manganese (Mn) from manganous oxide

0.1% Zinc (Zn) from zinc oxide

Application rates: 15–30 g/m² (150–300 kg/ha)

Directions for use: Apply product to actively growing turf at 15–30 g/m². Apply to dry foliage. Water in after application with 5 to 6 mm of irrigation. If temperatures exceed 25°C or if application to damp or wet turf is unavoidable, irrigate immediately after application. Apply at low rates if temperatures exceed 25°C. This product contains iron which may stain concrete and other surfaces. Remove particles promptly by sweeping or blowing to avoid staining. DO NOT WASH OFF WITH WATER. Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing. Use only clean, dry spreaders. Do not leave unused product in spreaders.

Spreaders	Ground Speed	Width of Coverage	Spreader Settings			
			15 g/m²	20 g/m²	25 g/m²	30 g/m²
Model 2000 (cone 9); 2000 SR (cone 9) Settings for single pass application = **FULL RATE**	5 km/hr	3.4 m	J 1/4	K	K 3/4	L 1/2
SSD Drop Spreader Settings for single pass application = **FULL RATE**	5 km/hr	0.9 m	3 3/4	4 1/4	4 3/4	5 1/4

Suggested spreader settings are not intended to replace calibration. Please calibrate your spreader before applying product.

The Andersons®

Manufactured by:
The Andersons, Inc.
P. O. Box 119
Maumee, OH 43537
U.S.A.
AndersonsPro.com

The Andersons logo and Tee Time are registered trademark of The Andersons, Inc.; MUtech is a trademark of The Andersons, Inc.

20 kg/net

10005442

J24

CE