

USA/INT	28 + 0 + 6
28.0% Total Nitrogen (N)	7.6% Ammoniacal Nitrogen 6.0% Urea Nitrogen 7.5% Other Water Soluble Nitrogen from methylene ureas 6.9% Water Insoluble Nitrogen from methylene ureas
6.0%	Soluble Potash (K ₂ O) from potassium sulfate
10.7%	Total Sulfur (S) from sulfate

Application rates: 15–25 g/m² (150–250 kg/ha)

Directions for use: Apply product to actively growing turf at 15–25 g/m². Apply to dry foliage. Immediately after application, apply a minimum of 5 mm of water to disperse particles into the root zone. Due to variations in temperature and water pH, best results are achieved by splitting the irrigation into 2 applications at 10-15 minutes apart. This will allow for more thorough particle dispersion into the root zone. Particle color may vary from lot to lot. Apply only at low rates if temperatures exceed 25°C and irrigate immediately after application. Do not use on putting greens. Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing. Use only clean, dry spreaders. Do not leave unused product in spreaders.

Deutschland	Deklaration nach Deutscher Düngemittelverordnung 2102: NK-Dünger, 28-6
28,0 % N	Gesamtstickstoff 7,6 % N Ammoniumstickstoff 6,0 % N Carbamidstickstoff 14,4 % N Formaldehydharstoff 7,5 % N kaltwasserlöslicher Formaldehydharstoff 3,6 % N heißwasserlöslicher Formaldehydharstoff
6,0 %	K ₂ O wasserlösliches Kaliumoxid

Nettomasse: 20 kg
Inverkehrbringer: TURF Handels GmbH., Am Hartboden 48, A – 8101 Gratkorn

Hinweise zur sachgerechten Lagerung: In der Originalverpackung trocken, kühl, frostfrei lagern. Restmengen dicht und trocken verschließen. Für Kinder und Haustiere unerreikbaar aufbewahren.

Anwendung: Während der Vegetationszeit mit 15-20 g/m² auf Fairways oder Sportrasenflächen (nicht auf Puttinggrüns) ausbringen. Anschließend kurz mit 4-5 mm abregnen. Bei Temperaturen über 25°C nur mit geringer Aufwandmenge streuen und sofort beregnen. - Hinweis: Empfehlungen der amtlichen Beratungen gehen vor.

Für alle Zier- und Sportrasenflächen.

Norge	NK-gjødsel 28–0–5 (28–0–6)
28,0%	Nitrogen (N) 7,6% ammonium-N 6,0% urea-N 14,4% metylenurea hvorav 6,9% vannløselig N (WIN)
5,0%	Kalium (K) 6,0% kaliumoksyd (K ₂ O)
10,7%	Svovel (S)

Basert på ammoniumsulfat, urea, metylenurea, kaliumsulfat, ureaformaldehyd.

Distributør i Norge: Floratine Norge AS
Gullfunnet 50, 1570 Dilling, NORWAY

Påføringsrate: 15–25 g/m² (150–250 kg/ha)

Bruksanvisning: Påfør produktet på voksende torv med 15–25 g/m². Påfør på tørt løvverk. Umiddelbart etter påføringen, påføre et minimum av 5 mm vann for å dispergere partikler i rotsonen. På grunn av variasjoner i temperatur og pH-verdi i vann, er de beste resultatene oppnådd ved å splitte vanning i 2 applikasjoner ved 10-15 minutters mellomrom. Dette vil gi rom for mer grundig partikkel spredning i rotsonen. Partikkel fargen kan variere fra parti til parti. Påfør kun med lave rater hvis temperaturen overskrider 25°C og vann øyeblikkelig etter påføring. Må ikke brukes på putting green. Oppbevar på et rent, tørt sted. Tett igjen den åpnede posen ved å brette ned toppen og forvar den på et sikkert sted. Bruk bare tørre, rene spredere. Ikke la rester av produktet bli liggende i spredere.

España/CE	FERTILIZANTE EC FERTILIZANTE NK FORMALDEHIDO DE UREA 28 + 0 + 6
28,0%	Nitrógeno total (N) 7,6% Nitrógeno amoniacal (N) 6,0% Nitrógeno ureico (N) 14,4% Nitrógeno (N) de formaldehido de urea, con 7,5% Nitrógeno (N) de formaldehido de urea, sólo soluble en agua fría 3,6% Nitrógeno (N) de formaldehido de urea, sólo soluble en agua caliente
6,0%	Óxido de potasio (K ₂ O) soluble en agua
26,75%	Trióxido de azufre (SO ₃) soluble en agua

Bajo en cloruro. Para ser utilizado sólo cuando haya una necesidad reconocida. No sobrepasar las dosis recomendadas.

Importada a España por:

Dosis de aplicación: 15–25 g/m² (150–250 kg/ha)

Instrucciones de uso: Aplique 15–25 g/m² del producto a céspedes que estén creciendo activamente. Aplique sobre el follaje seco. Inmediatamente después de la aplicación, aplique un mínimo de 5 mm de agua para dispersar las partículas en la zona de raíces. Debido a las variaciones en la temperatura y el pH del agua, los mejores resultados se consiguen dividiendo el riego en 2 aplicaciones de 10-15 minutos aparte. Esto permitirá una dispersión más completa de las partículas en la zona de las raíces. El color de las partículas puede variar de un lote a otro. Aplique dosis más bajas si las temperaturas superan los 25°C y riegue inmediatamente después de la aplicación. No use en áreas putting de golf. Almacene en un sitio limpio y seco. Vuelva a cerrar la bolsa abierta, doblando la parte superior hacia abajo y sujetándola. Sólo use esparcidores limpios y secos. No deje producto sin utilizar en los esparcidores.

Australia	28 + 0 + 5
28.0%	Total Nitrogen (N) 7.6% Ammoniacal Nitrogen 6.0% Urea Nitrogen 7.5% Other Water Soluble Nitrogen from methylene ureas 6.9% Water Insoluble Nitrogen from methylene ureas
5.0%	Potassium (K) from potassium sulfate
10.7%	Sulfur (S) from sulfate

Application rates: 1.5–2.5 kg/100 m² (150–250 kg/ha)

Directions for use: Apply product to actively growing turf at 1.5–2.5 kg/100 m². Apply to dry foliage. Immediately after application, apply a minimum of 5 mm of water to disperse particles into the root zone. Due to variations in temperature and water pH, best results are achieved by splitting the irrigation into 2 applications at 10-15 minutes apart. This will allow for more thorough particle dispersion into the root zone. Particle color may vary from lot to lot. Apply only at low rates if temperatures exceed 25°C and irrigate immediately after application. Do not use on putting greens. Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing. Use only clean, dry spreaders. Do not leave unused product in spreaders.

UK/EC	EC FERTILISER NK FERTILISER CONTAINING UREA FORMALDEHYDE 28 + 0 + 6
28.0%	Total nitrogen (N) 7.6% Ammoniacal nitrogen (N) 6.0% Ureic nitrogen (N) 14.4% Nitrogen (N) from urea formaldehyde with 7.5% Nitrogen (N) from urea formaldehyde only soluble in cold water 3.6% Nitrogen (N) from urea formaldehyde only soluble in hot water
6.0%	Potassium oxide (K ₂ O) water soluble
26.75%	Sulphur Trioxide (SO ₃) water soluble

Low in chloride. To be used only where there is a recognised need. Do not exceed the appropriate dose rates.

Import in U.K. by: Greentech Sportsturf Ltd.
Block 5 Unit 1 - Banded Industrial Estate
Throsk, Stirling - Scotland FK7 7NP

Application rates: 15–25 g/m² (150–250 kg/ha)

Directions for use: Apply product to actively growing turf at 15–25 g/m². Apply to dry foliage. Immediately after application, apply a minimum of 5 mm of water to disperse particles into the root zone. Due to variations in temperature and water pH, best results are achieved by splitting the irrigation into 2 applications at 10-15 minutes apart. This will allow for more thorough particle dispersion into the root zone. Particle color may vary from lot to lot. Apply only at low rates if temperatures exceed 25°C and irrigate immediately after application. Do not use on putting greens. Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing. Use only clean, dry spreaders. Do not leave unused product in spreaders.

Österreich	28-0-6 NutriDG
Deklaration nach der Österreichischen Düngemittelverordnung 2004 (zuletzt geändert am 07.06.2022): Mineralischer NK-Dünger	
28,0 %	N Gesamtstickstoff 7,6 % N Ammoniumstickstoff 6,0 % N Carbamidstickstoff 14,4 % N Formaldehydharstoff 7,5 % N kaltwasserlöslicher Formaldehydharstoff 3,6 % N nur heißwasserlöslicher Formaldehydharstoff
6,0 %	K ₂ O wasserlösliches Kaliumoxid

Enthält 51 % Langzeitstickstoff.
Hinweise zur sachgerechten Lagerung: In der Originalverpackung trocken, kühl, frostfrei lagern. Restmengen dicht und trocken verschließen. Für Kinder und Haustiere unerreikbaar aufbewahren.
Anwendung: Während der Vegetationszeit mit 15-20 g/m² auf Fairways oder Sportrasenflächen (nicht auf Puttinggrüns) ausbringen. Anschließend kurz mit 4-5 mm abregnen. Bei Temperaturen über 25°C nur mit geringer Aufwandmenge streuen und sofort beregnen. - Hinweis: Empfehlungen der amtlichen Beratungen gehen vor.

Sicherheitshinweis: Nach der Anwendung Hände und eventuell anders berührte Hautstellen gründlich waschen.

Anwendungsbereich: Hobbygarten, GaLa-Bau, Golf- und Sportanlagen

Hersteller: TURF Handels GmbH, Am Hartboden 48, AT-8101 Gratkorn

Gewicht: 20 kg

Denmark	EC KUNSTGØDNING NK KUNSTGØDNING INDEHOLDENDE FRA UREA FORMALDEHYD 28 + 0 + 5
28,0%	Kvælstof (N) 7,6% Ammoniumkvælstof (N) 6,0% Ureakvælstof (N) 14,4% Kvælstof (N) fra ureaformaldehyd med 7,5% kvælstof (N) fra ureaformaldehyd kun opløseligt i koldt vand 3,6% kvælstof (N) fra ureaformaldehyd kun opløseligt i varmt vand
5,0%	Kalium (K) vandopløseligt
10,7%	Svovl (S) vandopløseligt

Lavt kloridindhold. Bør kun bruges når det er konstateret, at der er behov for det. De passende doserater må ikke overskrides.

Importeres i Danmark af: Floratine Norge AS
Gullfunnet 50, 1570 Dilling, NORWAY

Applikationsrater: 15–25 g/m² (150–250 kg/ha)

Bruksanvisninger: Kom produktet på aktivt voksende grønsvær ved 15–25 g/m². Påføres på tørre blade. Umiddelbart efter påføringen, påføres mindst 5 mm vand at dispergere partikler i rotzonen. På grund af variationer i temperatur og vand pH, er de bedste resultater opnået ved at opdele kunstvanding i 2 anvendelser på 10-15 minutter fra hinanden. Dette vil give mulighed for mere grundig dispersion i rotzonen. Partikel farven kan variere fra parti til parti. Nedsæt påføringsmængden, hvis temperaturen overstiger 25°C og overrís umiddelbart efter påføring. Må ikke kommes på putting greens. Opbevares et rent, tørt sted. Føsej den åbne pose igen ved at folde toppen ned og fastgøre den. Brug kun rene, tørre spredere. Der må ikke efterlades ubrugt produkt i en spredere.

Greece - Αριθμ. Κυκλοφορίας: 31	28 + 0 + 6
28%	Ολικό άζωτο (N) 7,6% Αμμωνιακό άζωτο 6,0% Άζωτο ουρίας 7,5% Άλλο υδατοδιαλυτό Άζωτο από ουρίες μεθυλενίου 6,9% Αδιάλυτο στο νερό Άζωτο από ουρίες μεθυλενίου
6%	Διαλυτή πότασα (K ₂ O) από θειικό κάλιο
10,7%	Ολικό θείο (S) από θειικό κάλις

Εισαγωγική στην Ελλάδα από: Georponikos Oikos
3 Makedonias St., Athens, GREECE

Ρυθμίο εφαρμογής: 15–25 g/m² (150–250 kg/ha)

Οδηγίες χρήσης: Εφαρμόστε το προϊόν σε κλαόν που αναπτύσσεται ενεργά στα 15–25 g/m². Εφαρμόστε σε ζήη φυλλωσιά. Αμέσως μετά την εφαρμογή, ποτίστε με τουλάχιστον 5 mm νερού για να διαλύσετε τα σωματίδια στη ζώνη ρίζας. Λόγω των διακυμάνσεων της θερμοκρασίας και του pH του νερού, τα καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται όταν μοιράζετε την άρδευση σε 2 εφαρμογές 10-15 λεπτών. Αυτό θα επιτρέψει την πιο καλή διασπορά σωματιδίων στη ζώνη ρίζας. Το χρώμα των σωματιδίων μπορεί να ποικίλλει από παρτίδα σε παρτίδα. Εφαρμόστε μόνο σε χαμηλούς ρυθμούς αν η θερμοκρασία υπερβαίνει τους 25°C και ποτίστε αμέσως μετά από την εφαρμογή. Μη χρησιμοποιείτε σε κλαόν «putting green». Αποθηκεύστε σε καθαρό, ξηρό χώρο. Να ζανα σφραγίζετε τις ανοιχτές σακούλες διπλώνοντας το πάνω μέρος προς τα κάτω και ασφαλιζόντάς το. Να χρησιμοποιείτε μόνο καθαρά, στεγνά μηχανήματα σποράς. Μην αφήσετε προϊόν στα μηχανήματα σποράς μετά τη χρήση.

New Zealand	28 + 0 + 5
28.0%	Total Nitrogen (N) 7.6% Ammoniacal Nitrogen 6.0% Urea Nitrogen 7.5% Other Water Soluble Nitrogen from methylene ureas 6.9% Water Insoluble Nitrogen from methylene ureas
5.0%	Potassium (K) from potassium sulfate
10.7%	Sulfur (S) from sulfate

Application rates: 15–25 g/m² (150–250 kg/ha)

Directions for use: Apply product to actively growing turf at 15–25 g/m². Apply to dry foliage. Immediately after application, apply a minimum of 5 mm of water to disperse particles into the root zone. Due to variations in temperature and water pH, best results are achieved by splitting the irrigation into 2 applications at 10-15 minutes apart. This will allow for more thorough particle dispersion into the root zone. Particle color may vary from lot to lot. Apply only at low rates if temperatures exceed 25°C and irrigate immediately after application. Do not use on putting greens. Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing. Use only clean, dry spreaders. Do not leave unused product in spreaders.

Eire/EC	EC FERTILISER NK FERTILISER CONTAINING UREA FORMALDEHYDE 28 + 0 + 5
28.0%	Total nitrogen (N) 7.6% Ammoniacal nitrogen (N) 6.0% Ureic nitrogen (N) 14.4% Nitrogen (N) from urea formaldehyde with 7.5% Nitrogen (N) from urea formaldehyde only soluble in cold water 3.6% Nitrogen (N) from urea formaldehyde only soluble in hot water
5.0%	Potassium (K) water soluble
10.7%	Sulphur (S) water soluble

Low in chloride. To be used only where there is a recognised need. Do not exceed the appropriate dose rates.

Import in EIRE by: Greentech Sportsturf Ltd.
Block 5 Unit 1 - Banded Industrial Estate
Throsk, Stirling - Scotland FK7 7NP

Application rates: 15–25 g/m² (150–250 kg/ha)

Directions for use: Apply product to actively growing turf at 15–25 g/m². Apply to dry foliage. Immediately after application, apply a minimum of 5 mm of water to disperse particles into the root zone. Due to variations in temperature and water pH, best results are achieved by splitting the irrigation into 2 applications at 10-15 minutes apart. This will allow for more thorough particle dispersion into the root zone. Particle color may vary from lot to lot. Apply only at low rates if temperatures exceed 25°C and irrigate immediately after application. Do not use on putting greens. Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing. Use only clean, dry spreaders. Do not leave unused product in spreaders.

Italia	FERTILIZZANTE EC FERTILIZZANTE NK CONTENENTE UREA FORMALDEIDE 28 + 0 + 6
28,0%	Totale azoto (N) 7,6% Azoto ammoniacale (N) 6,0% Azoto ureico (N) 14,4% Azoto (N) da urea formaldeide con 7,5% Nitrogen (N) da urea formaldeide solubile solo in acqua fredda 3,6% Nitrogen (N) da urea formaldeide solubile solo in acqua calda
6,0%	di ossido di potassio (K ₂ O) solubile in acqua
26,75%	di triossido di zolfo (SO ₃) solubile in acqua

Basso contenuto di cloro. Da usare solo quando vi è un bisogno riconosciuto. Non superare i dosaggi appropriati.

Importato (fabbricante) da: BOTTOS s.r.l.
via Lusevera,1 – 33078 San Vito al Tagliamento (PN)

Distribuito da: EMERALD s.r.l.

Tassi di applicazione: 15–25 g/m² (150–250 kg/ha)

Istruzioni per l'uso: Applicare 15–25 g/m² di prodotto su manto erboso in crescita. Applicare su manto asciutto. Immediatamente dopo l'applicazione, irrigare con almeno 5 mm di acqua per consentire uno spargimento delle particelle nell'area della radice. A causa delle variazioni della temperatura e del pH dell'acqua, si ottengono i migliori risultati dividendo il processo d'irrigazione in due applicazioni da 10-15 minuti ciascuna. Questo consente un migliore spargimento delle particelle nell'area della radice. Il colore delle particelle può variare da lotto a lotto. Se la temperatura eccede 25°C applicare solo dosaggi bassi ed irrigare immediatamente dopo l'applicazione. Non usare su putting greens in campi da golf. Conservare in luogo asciutto e pulito. Risigillare il sacchetto aperto piegando ed assicurando la parte superiore. Usare solo spargitori puliti ed asciutti. Non lasciare prodotto non usato negli spargitori.

België	EC-KUNSTMEST NK-KUNSTMEST MET UREUM FORMALDEHYDE 28 + 0 + 6
28,0%	totaal stikstof (N) 7,6% ammoniakstikstof (N) 6,0% ureumstikstof (N) 14,4% stikstof (N) uit ureumformaldehyde, waarvan: 7,5% stikstof (N) uit ureumformaldehyde alleen oplosbaar is in koud water 3,6% stikstof (N) uit ureumformaldehyde alleen oplosbaar is in heet water
6,0%	kaliumoxide (K ₂ O), in water oplosbaar
26,75%	zwaveltrioxide (SO ₃), in water oplosbaar

Laag chloridegehalte. Alleen gebruiken waar dit zichtbaar nodig is. Aanbevolen hoeveelheden niet overschrijden.

Importeur voor België: Sports Management bvba
Lorkenlaan 14
2950 Kapellen - België

Aan te brengen hoeveelheden: 15–25 g/m² (150–250 kg/ha)

Gebruiksaanwijzing: Product aanbrengen op groeiend gras. Hoeveelheid: 15–25 g/m². Op droog gras aanbrengen. Onmiddellijk na aanbrengen ten minste 5 mm inwateren om deeltjes in de wortelzone te verspreiden. In verband met variaties in de temperatuur en de pH-waarde van het water kan men de beste resultaten bereiken door de besproeiing in 2 beurten te verrichten, met een tussenpoos van 10 à 15 minuten. Dit maakt betere verspreiding van deeltjes in de wortelzone mogelijk. De kleur van de deeltjes kan van partij tot partij variëren. Bij temperaturen > 25°C slechts in kleine hoeveelheden aanbrengen om onmiddellijk na aanbrengen bewateren. Niet gebruiken op putting greens. Op een schone, droge plaats bewaren. Geopende verpakking sluiten door bovenkant omlaag te vouwen en te bevestigen. Uitsluitend schone, droge stroomachines gebruiken. Restanten/niet-gebruikt product volledig uit stroomachines verwijderen.

Taiwan (R.O.C.)	28 + 0 + 6
28.0%	Total Nitrogen (N) 7.6% Ammoniacal Nitrogen 6.0% Urea Nitrogen 7.5% Other Water Soluble Nitrogen from methylene ureas 6.9% Water Insoluble Nitrogen from methylene ureas
6.0%	Soluble Potash (K ₂ O) from potassium sulfate
10.7%	Total Sulfur (S) from sulfate

Application rates: 15–25 g/m² (150–250 kg/ha)

Directions for use: Apply product to actively growing turf at 15–25 g/m². Apply to dry foliage. Immediately after application, apply a minimum of 5 mm of water to disperse particles into the root zone. Due to variations in temperature and water pH, best results are achieved by splitting the irrigation into 2 applications at 10-15 minutes apart. This will allow for more thorough particle dispersion into the root zone. Particle color may vary from lot to lot. Apply only at low rates if temperatures exceed 25°C and irrigate immediately after application. Do not use on putting greens. Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing. Use only clean, dry spreaders. Do not leave unused product in spreaders.

France/EC	ENGRAIS CE ENGRAIS NK CONTENANT DE L'UREE FORMALDEHYDE 28 + 0 + 6
28,0%	Azote (N) 7,6% Azote (N) ammoniacal 6,0% Azote (N) uréique 14,4% Azote (N) de l'urée formaldehyde dont 7,5% Azote (N) de l'urée formaldehyde uniquement soluble dans l'eau froide 3,6% Azote (N) de l'urée formaldehyde uniquement soluble dans l'eau chaude
6,0%	Oxyde de Potassium (K ₂ O) soluble dans l'eau
26,75%	Anhydride sulfurique (SO ₃) soluble dans l'eau

Pauvre en chlore. A n'utiliser qu'en cas de besoin reconnu. Ne pas dépasser les doses adéquates.

Importé en France par: LOB GREEN S.A.S.
25 Rue de la Chapelle
GOURNAY
62560 VERCHOCO - France

Dose d'emploi: 15 à 25 g/m² (150 à 250 kg/ha)

Conseils d'utilisation: Appliquer le produit à la dose de 15 à 25 grammes par m² pour obtenir une croissance optimale du gazon. Appliquer par temps sec et sur un feuillage sec. Immédiatement après l'application, appliquer un minimum de 5 mm d'eau pour disperser les particules dans la zone de racines. En raison des variations de température et du pH de l'eau, les meilleurs résultats sont obtenus en divisant l'irrigation en 2 applications à 10-15 minutes d'écart. Ceci permettra une plus grande dispersion des particules dans la zone des racines. La couleur des particules peut varier d'un lot à un autre. En cas de chaleur supérieure à 25°C, minorer la dose et arroser immédiatement après application. Ne pas utiliser sur les verts de rouler. Conserver le produit dans un endroit propre et sec. Réfermer soigneusement le sac en repliant la partie supérieure et l'attachant. Appliquer avec un épandeur propre et sec. Ne pas laisser de produit inutilisé dans les épandeurs.

Sverige	EU-GÖDSELMEDEL NK-gödselmedel 28–0–5 (28–0–6)
28,0%	Kväve (N) 7,6% ammonium-N 6,0% urea-N 14,4% metylenurea varav 6,9% vattenlöslig N (WIN)
5,0%	Kalium (K) 6% kaliumoxid (K ₂ O)
10,7%	Svavel (S)

Baserat på ammoniumsulfat, urea, metylenurea, urea formaldehyd, kaliumsulfat.

Distributör i Sverige: Floratine Scandinavia AB
c/o Floratine Norge AS
Gullfunnet 50, 1570 Dilling NORGE

Doering: 15–25 g/m² (150–250 kg/ha)

Bruksanvisning: Tillsätt 15–25 g/m² av produkten till aktivt växande torv. Tillsätt produkten till torra löv. Ommedelbart efter appliceringen, applicera ett minimum av 5 mm vatten för att dispergera partiklar i i rotzonen. På grund av variationer i temperatur og vattnets pH, uppnås de bästa resultaten genom att dela upp bevattning i 2 applikationer vid 10-15 minuters mellanrum. Detta kommer att möjliggöra mer noggrann partikel dispersionen i rotzonen. Partikel färg kan variera från parti till parti. Tillsätt endast en liten mängd om temperatur överstiger 25°C og vattna ommedelbart efter vökning. Fär ej användas på putting green. Förvara på en ren, torr plats. Förslut öppnad förpackning genom att vik ned och fästa den övre kanten. Använd endast rena, torra gödselspridare. Lämna inte kvar oanvänd produkt i gödselspridarna.

Belgique	ENGRAIS NK CONTENANT DE L'UREE FORMALDEHYDE 28 + 0 + 6
28,0%	Azote (N) 7,6% Azote (N) ammoniacal 6,0% Azote (N) uréique 14,4% Azote (N) de l'urée formaldehyde dont 7,5% Azote (N) de l'urée formaldehyde uniquement soluble dans l'eau froide 3,6% Azote (N) de l'urée formaldehyde uniquement soluble dans l'eau chaude
6,0%	Oxyde de Potassium (K ₂ O) soluble dans l'eau
26,75%	Anhydride sulfurique (SO ₃) soluble dans l'eau

Pauvre en chlore. A n'utiliser qu'en cas de besoin reconnu. Ne pas dépasser les doses adéquates.

Importé en Belgique par: Sports Management bvba
Lorkenlaan 14
2950 Kapellen - Belgique

Dose d'emploi: 15 à 25 g/m² (150 à 250 kg/ha)

Conseils d'utilisation: Appliquer le produit à la dose de 15 à 25 grammes par m² pour obtenir une croissance optimale du gazon. Appliquer par temps sec et sur un feuillage sec. Immédiatement après l'application, appliquer un minimum de 5 mm d'eau pour disperser les particules dans la zone de racines. En raison des variations de température et du pH de l'eau, les meilleurs résultats sont obtenus en divisant l'irrigation en 2 applications à 10-15 minutes d'écart. Ceci permettra une plus grande dispersion des particules dans la zone des racines. La couleur des particules peut varier d'un lot à un autre. En cas de chaleur supérieure à 25°C, minorer la dose et arroser immédiatement après application. Ne pas utiliser sur les verts de rouler. Conserver le produit dans un endroit propre et sec. Réfermer soigneusement le sac en repliant la partie supérieure et l'attachant. Appliquer avec un épandeur propre et sec. Ne pas laisser de produit inutilisé dans les épandeurs.



Warning
MAY CAUSE SKIN AND EYE IRRITATION

Precautionary Statements
Wear protective gloves and clothing. Remove contaminated clothing and wash before reuse. Do not breathe vapors/mists. Seek medical attention if you feel unwell. Wash thoroughly after handling. If swallowed and unwell: seek medical attention. If in eyes or on skin: rinse area with plenty of water, remove contact lenses. If eye or skin irritation continues: seek medical attention.

First Aid	
If swallowed:	Rinse mouth. DO NOT INDUCE VOMITTING unless directed by a medical professional. Seek medical attention if unwell.
If on skin:	Wash affected areas with soap and water. Seek medical attention if irritation persists. Wash contaminated clothing before reuse.
If in eyes:	Immediately flush with water for 1