Nutri DG®
Greens - SGN 75

18 + 9 + 18 + Fe, Mn
(18 + 4 + 14.9 + Fe, Mn)

60% MUtech™

USA/INT
18 + 9 + 18 + Fe, Mn

18.0% Total Nitrogen (N)
- 4.2% Ammoniacal Nitrogen
- 4.7% Urea Nitrogen
- 3.7% Water Insoluble Nitrogen from methylene ureas
- 5.4% Other Water Soluble Nitrogen from methylene ureas

9.0% Available Phosphate (P_2O_5) from ammonium phosphate

18.0% Soluble Potash (K_2O) from potassium sulfate

8.6% Total Sulfur (S) from sulfate

0.3% Iron (Fe) water soluble from iron sulfate

0.14% Manganese (Mn) water soluble from manganese sulfate

Application rates: 15-30 g/m² (150-300 kg/ha)

Directions for use: Apply product to actively growing turf at 15-30 g/m². Apply to dry foliage. Immediately after application, apply a minimum of 5 mm of water to disperse particles into the root zone. Due to variations in temperature and water pH, best results are achieved by splitting the irrigation into 2 applications at 10-15 minutes apart. This will allow for more thorough particle dispersion into the root zone. Particle color may vary from lot to lot. Apply only at low rates if temperatures exceed 25°C and irrigate immediately after application. This product contains iron which may stain concrete and other surfaces. Remove particles promptly by sweeping or blowing to avoid staining. DO NOT WASH OFF WITH WATER. Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing. Use only clean, dry spreaders. Do not leave unused product in spreaders.

UK/EC
EC FERTILISER
NPK FERTILISER CONTAINING UREA FORMALDEHYDE WITH Mn
18 + 9 + 18 + Mn

18.0% Total nitrogen (N)
- 4.2% Ammoniacal nitrogen (N)
- 4.7% Ureic nitrogen (N)
- 9.1% Nitrogen (N) from urea formaldehyde with
  - 5.4% Nitrogen (N) from urea formaldehyde only soluble in cold water
  - 2.0% Nitrogen (N) from urea formaldehyde only soluble in hot water

9.0% Phosphorous pentoxide (P_2O_5) soluble in neutral ammonium citrate and water with 8.5% water soluble P_2O_5

18.0% Potassium oxide (K_2O) water soluble

21.5% Sulphur trioxide (SO_3) water soluble

0.14% Manganese (Mn) water soluble

Low in chloride. To be used only where there is a recognised need. Do not exceed the appropriate dose rates.

Import in U.K. by: Greentech Sportsturf Ltd.
Block 5 Unit 1 - Bandeath Industrial Estate
Throsk, Stirling - Scotland FK7 7NP

Application rates: 15-30 g/m² (150-300 kg/ha)
Directions for use: Apply product to actively growing turf at 15-30 g/m². Apply to dry foliage. Immediately after application, apply a minimum of 5 mm of water to disperse particles into the root zone. Due to variations in temperature and water pH, best results are achieved by splitting the irrigation into 2 applications at 10-15 minutes apart. This will allow for more thorough particle dispersion into the root zone. Particle color may vary from lot to lot. Apply only at low rates if temperatures exceed 25°C and irrigate immediately after application. This product contains iron which may stain concrete and other surfaces. Remove particles promptly by sweeping or blowing to avoid staining. DO NOT WASH OFF WITH WATER. Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing. Use only clean, dry spreaders. Do not leave unused product in spreaders.

France/EC
Engrais CE
Engrais NPK contenant de l'urée formaldéhyde action lente
18-9-18

18.0% Azote (N) total
- 4.2% Azote (N) ammoniacal
- 4.7% Azote (N) uréique
- 9.1% Azote (N) organique de synthèse de l'urée formaldéhyde
  - dont 5.4% soluble à 20°C
  - dont 2.0% soluble à 100°C mais insoluble à 20°C
  - dont 1.7% insoluble à 100°C

9,0% Anhydride phosphorique (P_2O_5) total
- 9.0% dont Anhydride phosphorique (P2O5) soluble dans le citrate d'ammonium neutre
- 8.5% dont Anhydride phosphorique (P2O5) soluble dans l'eau

18.0% Oxyde de potassium (K_2O) soluble dans l'eau

21.5% Anhydride sulfurique (SO_3) soluble dans l'eau

Importé en France par: LOB GREEN S.A.S.
21 Rue du Saint Sépulcre
62560 Saint Omer France

Dose d'emploi
Cet engrais est destiné à la fertilisation des gazons et permet de fournir Les éléments majeurs nécessaire à un bon développement, d'une manière équilibrée. L'azote organique de synthèse permet une mise à disposition de l'azote étalée dans le temps. Apporter de 150 à 200 kg/ha plusieurs fois pendant la saison de croissance du gazon.
L'engrais sera appliqué uniformément sur toute la surface. L'humidité présente sur le feuillage ou un léger arrosage permettrons un délitement très rapide des granulés grâce à la technologie NUTRI DG (granulé dispersible).

Attention
H302 Nocif en cas d'ingestion
H315 Provoque une irritation cutanée
H319 Provoque une sévère irritation des yeux
H335 Peut irriter les voies respiratoires
P261 Eviter de respirer les poussières
P264 Se laver soigneusement après manipulation
P270 Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit
P271 Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé
P280 Porter un équipement de protection des yeux et du visage.
P302 + P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l'eau et au savon.
P332 + P313 En cas d'irritation cutanée, consulter un médecin.
P362 + P364 Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
P337 + P313 Si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin.
P304 + P340 EN CAS D'INHALATION : transporter la victime à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
P312 Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.
P330 Rincer la bouche
P501 Eliminer le contenu selon les lois et règlements en vigueur.

Deutschland
Deklaration nach Deutscher Düngemittelverordnung 2012:
NPK-Dünger, 18-9-18 mit Spurennährstoffen

18,0 % N Gesamtstickstoff
- 1,9 % N Ammoniumstickstoff
- 6,9 % N Carbamidstickstoff
- 9,2 % N Formaldehydharnstoff
  - 5,4 % N kaltwasserlöslicher Formadehydharnstoff
  - 3,8 % N nur heißwasserlöslicher Formaldehydharnstoff

9,0 % P_2O_5 neutralammoncitrat- und wasserlösliches Phosphat
- 8,4 % P_2O_5 wasserlösliches Phosphat

18,0 % K_2O wasserlösliches Kaliumoxid
2,0 % Fe Eisen
1,0 % Mn Mangan

Nettomasse: 20 kg
Inverkehrbringer: TURF Handels GmbH., Am Hartboden 48, A – 8101 Gratkorn

Hinweise zur sachgerechten Lagerung: In der Originalverpackung trocken, kühl, frostfrei lagern. Restmengen dicht und trocken verschließen. Für Kinder und Haustiere unerreichbar aufbewahren.

Anwendung: Während der Vegetationszeit mit 15-30 g/m² auf möglichst trockene Bestände von Golfgreens oder anderen Rasenflächen ausbringen. Anschließend kurz mit 3-4 mm abregnen. Bei Temperaturen über 30°C nur mit geringer Aufwandmenge streuen und sofort beregnen. - Hinweis: Empfehlungen der amtlichen Beratungen gehen vor. Nur bei tatsächlichem Bedarf und unter Einhaltung der Aufwandmenge anwenden.

Für alle Zier- und Sportrasenflächen.

Österreich
18-9-18 NutriDG
Deklaration nach der Österreichischen Düngemittelverordnung 2004 (zuletzt geändert am 07.06.2022):
Mineralischer NPK-Dünger mit Spurennährstoffen

18,0 % N Gesamtstickstoff
- 1,9 % N Ammoniumstickstoff
- 6,9 % N Carbamidstickstoff
- 9,2 % N Formaldehydharnstoff
  - 5,4 % N kaltwasserlöslicher Formaldehydharnstoff
  - 3,8 % N nur heißwasserlöslicher Formaldehydharnstoff

9,0 % P_2O_5 neutralammoncitrat- und wasserlösliches Phosphat
- 8,4 % P_2O_5 wasserlösliches Phosphat

18,0 % K_2O wasserlösliches Kaliumoxid
2,0 % Fe Eisen
1,0 % Mn Mangan

Enthält 51 % Langzeitstickstoff.

Hinweise zur sachgerechten Lagerung: In der Originalverpackung trocken, kühl, frostfrei lagern. Restmengen dicht und trocken verschließen. Für Kinder und Haustiere unerreichbar aufbewahren.
Anwendung: Während der Vegetationszeit mit 15-30 g/m² auf möglichst trockene Bestände von Golfgreens oder anderen Rasenflächen ausbringen. Anschließend kurz mit 3-4 mm abregnen. Bei Temperaturen über 30°C nur mit geringer Aufwandmenge streuen und sofort beregnen. - Hinweis: Empfehlungen der amtlichen Beratungen gehen vor. Nur bei tatsächlichem Bedarf und unter Einhaltung der Aufwandmenge anwenden.

Sicherheitshinweis: Nach der Anwendung Hände und eventuell anders berührte Hautstellen gründlich waschen.

Anwendungsbereich: Hobbygarten, GaLa-Bau, Golf- und Sportanlagen

Hersteller: TURF Handels GmbH, Am Hartboden 48, AT-8101 Gratkorn

Gewicht: 20 kg

Italia
FERTILIZZANTE EC
FERTILIZZANTE NPK CONTENENTE UREA FORMALDEIDE CON Mn
18 + 9 + 18 + Mn

18,0% Totale azoto (N)
- 4,2% Azoto ammoniacato (N)
- 4,7% Azoto ureico (N)
- 9,1% Azoto (N) da urea formaldeide con
  - 5,4% Azoto (N) da urea formaldeide solubile solo in acqua fredda
  - 2,0% Azoto (N) da urea formaldeide solubile solo in acqua calda

9,0% di pentossido di fosforo (P_2O_5) solubile in citrato di ammonio neutro e acqua con 8,5% di P_2O_5 solubile in acqua

18,0% di ossido di potassio (K_2O) solubile in acqua

21,5% di triossido di zolfo (SO_3) solubile in acqua

0,14% di manganese (Mn) solubile in acqua

Basso contenuto di cloro. Da usare solo quando vi è un bisogno riconosciuto. Non superare i dosaggi appropriati.

Importato (fabbricante) da: BOTTOS s.r.l.
via Lusevera,1 – 33078 San Vito al Tagliamento (PN)

Distribuito da: EMERALD s.r.l.

Tassi di applicazione: 15-30 g/m² (150-300 kg/ha)

Istruzioni per l'uso: applicare 15-30 g/m² di prodotto su manto erboso in crescita. Applicare su manto asciutto. Immediatamente dopo l'applicazione, irrigare con almeno 5 mm di acqua per consentire uno spargimento delle particelle nell'area della radice. A causa delle variazioni della temperatura e del pH dell'acqua, si ottengono i migliori risultati dividendo il processo d'irrigazione in due applicazioni da 10-15 minuti ciascuna. Questo consente un migliore spargimento delle particelle nell'area della radice. Il colore delle particelle può variare da lotto a lotto. Se la temperatura eccede i 25°C applicare solo dosaggi bassi ed irrigare immediatamente dopo l'applicazione. Il presente prodotto contiene ferro, che potrebbe macchiare superfici in cemento o altri materiali. Per evitare che il prodotto macchi, rimuovere le particelle immediatamente o usando una scopa applicare o un soffiatore. NON PULIRE USANDO ACQUA. Conservare in luogo asciutto e pulito. Risigillare il sacchetto aperto piegando ed assicurando la parte superiore. Usare solo spargitori puliti ed asciutti. Non lasciare prodotto non usato negli spargitori.

Sverige
EG-GÖDSELMEDEL
NPK-GÖDSELMEDEL SOM INNEHÅLLER UREA FORMALDEHYD MED Mn
18 + 4 + 14,9 + Mn

18,0% Total andel kväve (N)
- 4,2% Ammoniakkväve (N)
- 4,7% Kväve (N) som urea
- 9,1% Urea formaldehyd
  - 5,4% från urea-formaldehyd endast lösligt i kallt vatten
  - 2,0% från urea-formaldehyd endast lösligt i varm vatten

4,0% Fosfor (P) löslig i neutralt ammoniumcitrat och vatten med 3.7% P vattenlöslig

14,9% Kalium (K) vattenlöslig

8,6% Svavel (S) vattenlöslig

0,14% Mangan (Mn) vattenlöslig

Låg kloridhalt. Bör kunna användas när det konstateras att det föreligger behov för dess användning. De passande dosraterna får ej överskridas.

Distributör i Sverige: Floratine Scandinavia AB
c/o Floratine Norge AS
Gullfunnet 50
1570 Dilling, NORGE

Dosering: 15-30 g/m² (150-300 kg/ha)

Bruksanvisning: Tillsätt 15-30 g/m² av produkten till aktivt växande torv. Tillsätt produkten till torra löv. Omedelbart efter appliceringen, applicera ett minimum av 5 mm vatten för att dispergera partiklar in i rotzonen. På grund av variationer i temperatur och vattnets pH, uppnås de bästa resultaten genom att dela upp bevattning i 2 applikationer vid 10-15 minuters mellanrum. Detta kommer att möjliggöra mer noggrann partikel dispersionen i rotzonen. Partikel färg kan variera från parti till parti. Tillsätt endast en liten mängd om temperatur överstiger 25°C och vattna omedelbart efter gödsling. Den här produkten innehåller järn vilket kan orsaka fläckar på betong och andra ytor. Ta bort partiklar omgående genom att borsta eller blåsa för att undvika fläckar. TVÄTTA INTE BORT MED VATTEN. Förvara på en ren, torr plats. Förslut öppnad förpackning genom att vika ned och fästa den övre kanten. Använd endast rena, torra gödselspridare. Lämna inte kvar oanvänd produkt i gödselspridarna.

Norge
EC GJØDNING
NK GJØDNING INNEHOLDER UREAFORMALDEHYD MED Mn
18 + 4 + 14,9 + Mn

18,0% Total Nitrogen (N)
- 4,2% Ammoniakknitrogen (N)
- 4,7% Ureanitrogen (N)
- 9,1% Ureaformaldehyd
  - 5,4% Nitrogen (N) fra ureaformaldehyd er bare oppløselig i kaldt vann
  - 2,0% Nitrogen (N) fra ureaformaldehyd er bare oppløselig i varmt vann

4,0% Fosfor (P) oppløselig i nøytralt ammoniumcitrat og vann med 3,7% oppløselig i vann

14,9% Kalium (K) oppløselig i vann

8,6% Svovel (S) oppløselig i vann

0,14% Mangan (Mn) oppløselig i vann

Lav i klorid. Skal bare brukes når det er fastslått at der er behov for det. Riktige doser må ikke overskrides.

Distributør i Norge: Floratine Norge AS
Gullfunnet 50
1570 Dilling, NORGE

Påføringsrate: 15-30 g/m² (150-300 kg/ha)

Bruksanvisning: Påfør produktet på voksende torv med 15-30 g/m². Påfør på tørt løvverk. Umiddelbart etter påføringen, påføre et minimum av 5 mm vann for å dispergere partikler i rotzonen. På grunn av variasjoner i temperatur og pH-verdi i vann, er de beste resultater oppnådd ved å splitte vanning i 2 applikasjoner ved 10-15 minutters mellomrom. Dette vil gi rom for mer grundig partikkel spredning i rotzonen. Partikkel fargen kan variere fra parti til parti. Påfør kun med lave rater hvis temperaturen overskrider 25°C og vann øyeblikkelig etter påføring. Dette produktet inneholder jern som kan misfarge betong og andre overflater. Fjern partikler omgående ved å feie eller blåse for å unngå misfarging. VASK IKKE BORT MED VANN. Lagre produktet på et tørt, rent sted. Tett igjen den åpnede posen etter bruk ved å brette ned toppen og forvar den på et sikkert sted. Bruk bare rene, tørre spredere. Ikke la rester av produktet bli liggende i sprederen.

Denmark
EC KUNSTGØDNING
NPK KUNSTGØDNING INDEHOLDENDE FRA UREAFORMALDEHYD MED Mn
18 + 4 + 14,9 + Mn

18,0% Samlet kvælstof (N)
- 4,2% Ammoniumkvælstof
- 4,7% Ureakvælstof
- 9,1% Kvælstof (N) fra ureaformaldehyd med
  - 5,4% kvælstof (N) fra ureaformaldehyd kun opløseligt i koldt vand
  - 2,0% kvælstof (N) fra ureaformaldehyd kun opløseligt i varmt vand

4,0% Fosfor (P) opløseligt i neutral ammoniumcitrat og vand med 3,7% vandopløseligt P

14,9% Kalium (K) vandopløseligt

8,6% Svovl (S) vandopløseligt

0,14% Mangan (Mn) vandopløseligt

Lavt kloridindhold. Bør kun bruges når det er konstateret, at der er behov for det. De passende dosisrater må ikke overskrides.

Importeres i Danmark af: Floratine Norge AS
Gullfunnet 50, 1570
1570 Dilling, NORGE

Applikationsrater: 15-30 g/m² (150-300 kg/ha)

Brugsanvisninger: Kom produktet på aktivt voksende grønsvær ved 15-30 g/m². Påføres på tørre blade. Umiddelbart efter påføringen, påføres mindst 5 mm vand at dispergere partikler i rodzonen. På grund af variationer i temperatur og vand pH, er de bedste resultater opnået ved at opdele kunstvanding i 2 ansøgninger på 10-15 minutter fra hinanden. Dette vil give mulighed for mere grundig dispersion i rodzonen. Partikel farve kan variere fra parti til parti. Nedsæt påføringsmængden, hvis temperaturen overstiger 25 °C og overrisle umiddelbart efter påføring. Dette produkt indeholder jern, som kan plette beton og andre overflader. Fjern partikler med det samme ved at feje eller blæser for at undgå pletter. MÅ IKKE VASKES AF MED VAND. Opbevares et rent, tørt sted. Forsegl den åbne pose igen ved at folde toppen ned og fastgøre den. Brug kun rene, tørre spredere. Der må ikke efterlades ubrugt produkt i en spreder.

Canada
18 + 9 + 18 + Fe, Mn

Registration Number 2026014M Fertilizers Act
Lot# xxxxxxx
60% of Nitrogen from MUtech™

Guaranteed Minimum Analysis

18.0% Total Nitrogen (N)
- 4.2% Ammoniacal Nitrogen
- 4.7% Urea Nitrogen
- 3.7% Water Insoluble Nitrogen
- 5.4% Other Water Soluble Nitrogen*

9.0% Available Phosphate (P_2O_5)
18.0% Soluble Potash (K_2O)
8.6% Sulfur (S)
0.33% Iron (Fe) (actual)
- 0.33% Water Soluble Iron (Fe)

0.17% Manganese (Mn) (actual)
- 0.17% Water Soluble Manganese (Mn)

*5.35% Slowly available nitrogen from methylene ureas

Application rates: 1.36 - 2.71 kg/100 m2 (2.78 - 5.56 lbs/1,000 sq. ft.)

Directions for use: This product must be used on the basis of a soil or tissue analysis. Seek advice from the county agricultural representative or a professional agricultural consultant. Use Andersons Nutri DG® Dispersing Granule Technology 18-9-18 for greens and tees where a high nitrogen and potassium application is desired or when iron and manganese are needed to help correct or prevent deficiencies during the growing season.Watering in this product will disperse each granule into thousands of particles. This will facilitate themovement of the nutrients into the soil. This particle dispersion will greatly reduce ball, shoe and mower pickup - minimizing nutrient loss. Application to wet, close-cut golf turf may result in foliar staining, which will discolor the turf to a brown/black appearance. This will occur even if immediate irrigation or rainfall occurs. Be sure to apply this product to dry turf only.
CAUTION: this fertilizer contains iron and manganese and should be used only as recommended. It may prove harmful when misused.
Storage and use: Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing. Use only clean, dry spreaders or applicators. Do not leave unused product in spreaders.
PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT / PROTECTION MEASURES / CONTROLS:
RESPIRATORY PROTECTION: NIOSH approved respirator, if required. EYE PROTECTION: Safety glasses with side shields, goggles, or face shield. SKIN PROTECTION: Appropriate for the task. Impervious and compatible with material. VENTILATION: Use with adequate ventilation.

Nutri DG® Verts 18-9-18 + Fe, Mn

Numéro d'enregistrement 2026014M Loi sur les engrais
No de lot: xxxxxx
60% de l'azote de MUtech™

Analyse Minimum Guarantie

18,0% Azote (N) Total
- 4,2% Azote Ammoniacal
- 4,7% Azote Uréique
- 3,7% Azote insoluble dans l'eau
- 5,4% Autre azote soluble dans l'eau*

9,0% Phosphate assimilable (P_2O_5)
18,0% Potasse soluble (K_2O)
8,6% Soufre (S)
0,33% Fer (Fe) (réel)
- 0,33% Fer soluble dans l'ea (Fe)

0,17% Manganèse (Mn) (réel)
- 0,17% manganèse soluble dans l'eau (Mn)

*5,35 % azote lentement assimilable des urées de méthylène
Taux d'application: 1,36 – 2,71 kg/100 m² (2,78 – 5,56 lbs/1 000 pi²)
MODE D'EMPLOI: Ce produit doit être utilisé sur la base d'une analyse du sol ou des tissus. Demandez conseil au représentant agricole du comté ou à un consultant agricole professionnel. Utiliser la Technologie de dispersion de granules Andersons Nutri DG® 18-9-18 pour les greens et teesoù une forte application en azote et en potassium est désirée ou lorsque du fer et du manganèse sontnécessaires pour permettre de rectifier ou de prévenir des déficiences durant la saison de croissance.L'application de ce produit par arrosage dispersera chaque granule dans des milliers de particules. Ceci facilitera le mouvement des substances nutritives dans le sol. Cette dispersion de particules diminuera considérablement l'adhésion aux balles, chaussures et tondeuse – minimisant ainsi la perte de substances nutritives.Une application sur un gazon de golf mouillé et coupé de près risque d'entraîner une coloration foliaire, qui va décolorer le gazon en lui donnant un aspect marron/noir. Ceci se produira même si une irrigation ou une chute de pluie immédiate se produit. S'assurer d'appliquer ce produit sur du gazon sec uniquement.
ATTENTION : cet engrais contient du fer et du manganèse et ne doit être utilisé que selon les recommandations. Il peut s'avérer nocif lorsqu'il est mal utilisé.
Entreposage et utilisation: Entreposer dans un endroit propre et sec. Refermer hermétiquement le sac ouvert en repliant le haut et en sécurisant. Utiliser uniquement des épandeuses propres et sèches. Ne pas laisser de produit non utilisé dans les épandeuses.
ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE / MESURES DE PROTECTION / CONTRÔLES: PROTECTION RESPIRATOIRE: Respirateur approuvé par le NIOSH, au besoin. PROTECTION DES YEUX: Lunettes de sécurité avec écrans latéraux, lunettes ou écran facial. PROTECTION DE LA PEAU: Approprié pour la tâche. Imperméable et compatible avec le matériau VENTILATION: Utiliser avec une ventilation adequate.

España/CE
ABONO CE
ABONO COMPLEJO
ABONO NPK contenido urea formaldehído con Mn
18 + 9 + 18 + Mn

18,0% Nitrógeno total (N)
- 4,2% Nitrógeno amoniacal (N)
- 4,7% de nitrógeno ureico (N)
- 9,1% Nitrógeno (N) de la urea con el formaldehído
  - 5,4% Nitrógeno (N) sólo de la urea formaldehído soluble en agua fría
  - 2,0% Nitrógeno (N) de la urea formaldehído soluble únicamente en agua caliente

9,0% Pentóxido de fósforo (P_2O_5) soluble en citrato amónico neutro y agua con 8,5% soluble en agua P_2O_5

18,0% de óxido de potasio (K_2O) soluble en agua

21,5% de azufre (SO_3) soluble en agua

0,14% Manganeso (Mn) soluble en agua

Bajo en cloruro. Para ser utilizado sólo cuando haya una necesidad reconocida. No sobrepasar las dosis recomendadas.

Importador para España:

Dosis de aplicación: 15-30 g/m² (150-300 Kg/ha)

Instrucciones de uso: Aplicación de productos en crecimiento activo del césped. Aplicar cuando la hoja esté seca. Inmediatamente después de la aplicación, aplique un mínimo de 5 mm de agua para dispersar las partículas en la zona de raíces. Debido a las variaciones en la temperatura y el pH del agua, los mejores resultados se consiguen dividiendo el riego en 2 aplicaciones de 10-15 minutos aparte. Esto permitirá una dispersión más completa de las partículas en la zona de las raíces. El color de las partículas puede variar de un lote a otro. Se aconseja aplicar sólo a dosis bajas si las temperatura es superior a 25°C. Regar inmediatamente después de la aplicación. Conservar el envase en un lugar limpio y seco. Una vez abierto el saco evitar que entre humedad, asegúrese de cerrar la parte superior del saco. Utilice sólo abonadoras limpias y secas. No deje el producto no utilizado en las abonadoras.

Eire/EC
EC FERTILISER
NPK FERTILISER CONTAINING UREA FORMALDEHYDE WITH Mn
18 + 4 + 14.9 + Mn

18.0% Total nitrogen (N)
- 4.2% Ammoniacal nitrogen (N)
- 4.7% Ureic nitrogen (N)
- 9.1% Nitrogen (N) from urea formaldehyde with
  - 5.4% Nitrogen (N) from urea formaldehyde only soluble in cold water
  - 2.0% Nitrogen (N) from urea formaldehyde only soluble in hot water

4.0% Phosphorus (P) soluble in neutral ammonium citrate and water with 3.7% water soluble P
14.9% Potassium (K) water soluble
8.6% Sulphur (S) water soluble
0.14% Manganese (Mn) water soluble

Low in chloride. To be used only where there is a recognised need. Do not exceed the appropriate dose rates.

Import in EIRE by: Greentech Sportsturf Ltd.
Block 5 Unit 1 - Bandeath Industrial Estate
Throsk, Stirling - Scotland FK7 7NP

Application rates: 15-30 g/m² (150-300 kg/ha)

Directions for use: Apply product to actively growing turf at 15-30 g/m². Apply to dry foliage. Immediately after application, apply a minimum of 5 mm of water to disperse particles into the root zone. Due to variations in temperature and water pH, best results are achieved by splitting the irrigation into 2 applications at 10-15 minutes apart. This will allow for more thorough particle dispersion into the root zone. Particle color may vary from lot to lot. Apply only at low rates if temperatures exceed 25°C and irrigate immediately after application. This product contains iron which may stain concrete and other surfaces. Remove particles promptly by sweeping or blowing to avoid staining. DO NOT WASH OFF WITH WATER. Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing. Use only clean, dry spreaders. Do not leave unused product in spreaders.

Taiwan (R.O.C.)
菁好牌菁美肥 (DG 18-9-18)

肥料登記證字號：肥進 (複) 字第 0128073 號
肥料品目：複合肥料 (6-01)
國外廠牌商品名稱：THE ANDERSONS NUTRI DG DISPERSING GRANULE TECHNOLOGY 18-9-18
保證成份：全氮18.0%，檸檬酸溶性磷酐9.0%，水溶性氧化鉀18.0%
成品性狀：固態，顆粒狀
使用方法：以15-30g/m² 施用本產品於成長草皮。 施用於乾的草皮葉面，施用後澆水3-4mm。 當溫度超過25℃時，需以低比率施用之，且施用後需立即澆水10-20分鐘。
使 用 量：15-30 g/m² (每分地15-30 kg)。
包裝方式：袋裝　　淨重：20 kg
有效期限：4年　　批號：請詳見包裝
製造日期：請詳見包裝　　電話：04-22135266
總代理：菁修企業有限公司
地址：台中市東區自由路四段210號
製造地：美國
製造廠商： THE ANDERSONS, INC.
P. O. BOX 119, MAUMEE, OH USA 43537

Warning
MAY CAUSE EYE IRRITATION
MAY CAUSE RESPIRATORY IRRITATION

Precautionary Statements
Call a poison center/physician if unwell. If on skin, wash with plenty of soap and water. If skin irritation occurs, get medical advice. Wash contaminated clothing before reuse. If in eyes, rinse cautiously with water for several minutes, remove contact lenses. If eye irritation persists, get medical advice. Wash hands after handling. Use only outdoors or in well ventilated areas. Avoid breathing dust. If inhaled, remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing. Store container tightly closed. Dispose of contents/container in accordance with national/regional/local regulations. Keep out of reach of children.
First Aid
If swallowed: If victim is alert and not convulsing, give one glass of water to dilute material, but DO NOT induce vomiting. Seek immediate medical attention. If on skin: Wash affected areas with soap and water. Seek medical attention if irritation persists. Wash contaminated clothing before reuse. If in eyes: Immediately flush with water for at least 20 minutes. Seek medical attention if irritation persists. If inhaled: Move victim to fresh air. Seek medical attention if irritation persists.

Avertissement
PEUT CAUSER UNE IRRITATION DES YEUX
PEUT CAUSER UNE IRRITATION RESPIRATOIREN

Mises en garde
Appelez un centre antipoison / médecin si malade. Si vous êtes sur la peau, lavez-vous avec beaucoup de savon et d'eau. Si la peau une irritation se produit, obtenez un avis médical. Lavez les vêtements contaminés avant de les réutiliser. Si dans les yeux, rincer prudemment à l'eau pendant plusieurs minutes, enlever les lentilles de contact. Si l'irritation des yeux persiste, consultez un médecin. Lavez-vous les mains après la manipulation. Utiliser uniquement à l'extérieur ou dans des endroits bien ventilés. Evitez de respirer de la poussière. En cas d'inhalation, retirer à l'air frais et garder au repos dans une position confortable pour respirer. Entreposer le contenant hermétiquement fermé. Eliminer le contenu ou le contenant conformément aux réglementations nationales, régionales et locales. Tenir hors de la portée des enfants
Premiers soins
En cas d'ingestion: Si la victime est alerte et ne convulse pas, donnez un verre d'eau pour diluer le matériel, mais NE PAS provoquer de vomissements. Consulter immédiatement un médecin. Si sur la peau: Lavez les zones touchées avec de l'eau et du savon. Consulter un médecin en cas d'irritation persiste. Lavez les vêtements contaminés avant de les réutiliser. Si dans les yeux: Rincer immédiatement à l'eau pendant au moins 20 minutes. Consulter un médecin si l'irritation persiste. En cas d'inhalation: Déplacez la victime à l'air frais. Consulter un médecin si l'irritation persiste.

Australia
18 + 4 + 14.9 + Fe, Mn

18.0% Total Nitrogen (N)
- 4.2% Ammoniacal Nitrogen
- 4.7% Urea Nitrogen
- 3.7% Water Insoluble Nitrogen from methylene ureas
- 5.4% Other Water Soluble Nitrogen from methylene ureas

4.0% Available Phosphate (P_2O_5) from ammonium phosphate

14.9% Soluble Potash (K_2O) from potassium sulfate

8.6% Total Sulfur (S) from sulfate

0.3% Iron (Fe) water soluble from iron sulfate

0.14% Manganese (Mn) water soluble from manganese sulfate

Application rates: 1.5 - 3.0 kg/100 m² (150-300 kg/ha)

Directions for use: Apply product to actively growing turf at 1.5 - 3.0 kg/100 m². Apply to dry foliage. Immediately after application, apply a minimum of 5 mm of water to disperse particles into the root zone. Due to variations in temperature and water pH, best results are achieved by splitting the irrigation into 2 applications at 10-15 minutes apart. This will allow for more thorough particle dispersion into the root zone. Particle color may vary from lot to lot. Apply only at low rates if temperatures exceed 25°C and irrigate immediately after application. This product contains iron which may stain concrete and other surfaces. Remove particles promptly by sweeping or blowing to avoid staining. DO NOT WASH OFF WITH WATER. Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing. Use only clean, dry spreaders. Do not leave unused product in spreaders.

New Zealand
18 + 4 + 14.9 + Fe, Mn

18.0% Total Nitrogen (N)
- 4.2% Ammoniacal Nitrogen
- 4.7% Urea Nitrogen
- 3.7% Water Insoluble Nitrogen from methylene ureas
- 5.4% Other Water Soluble Nitrogen from methylene ureas

4.0% Available Phosphate (P_2O_5) from ammonium phosphate

14.9% Soluble Potash (K_2O) from potassium sulfate

8.6% Total Sulfur (S) from sulfate

0.3% Iron (Fe) water soluble from iron sulfate

0.14% Manganese (Mn) water soluble from manganese sulfate

Application rates: 15-30 g/m² (150-300 kg/ha)

Directions for use: Apply product to actively growing turf at 15 - 30 g/m². Apply to dry foliage. Immediately after application, apply a minimum of 5 mm of water to disperse particles into the root zone. Due to variations in temperature and water pH, best results are achieved by splitting the irrigation into 2 applications at 10-15 minutes apart. This will allow for more thorough particle dispersion into the root zone. Particle color may vary from lot to lot. Apply only at low rates if temperatures exceed 25°C and irrigate immediately after application. This product contains iron which may stain concrete and other surfaces. Remove particles promptly by sweeping or blowing to avoid staining. DO NOT WASH OFF WITH WATER. Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing. Use only clean, dry spreaders. Do not leave unused product in spreaders.

Spreaders	Ground Speed	Width of Coverage	Spreader Settings			
			15 g/m²	20 g/m²	25 g/m²	30 g/m²
Model 2000 (cone 9); 2000 SR (cone 9) Settings for single pass application = **FULL RATE**	5 km/hr	3.0 m	I 3/4	J 3/4	K 3/4	L 1/2
SSD Drop Spreader - Settings for single pass application = **FULL RATE**	5 km/hr	0.9 m	3 1/2	4	4 1/2	5 1/4

Suggested spreader settings are not intended to replace calibration. Please calibrate your spreader before applying product.

The Andersons®

Manufactured by (Fabriqué par):
The Andersons, Inc.
P. O. Box 119
Maumee, OH 43537
U.S.A.
AndersonsPro.com

20 kg/net
10005484

B26

CE

The Andersons logo and Nutri DG are registered trademarks of The Andersons, Inc.; MUtech is a trademark of The Andersons, Inc.