

Nutri DG®

Greens - SGN 75

14 + 7 + 14 + Fe, Mn

(14 + 3.1 + 11.6 + Fe, Mn)

60%

MUtech™

USA/INT	14 + 7 + 14 + Fe, Mn
14.0%	Total Nitrogen (N) 5.60% Ammoniacal Nitrogen 1.26% Urea Nitrogen 4.20% Other Water Soluble Nitrogen from methylene ureas 2.94% Water Insoluble Nitrogen from methylene ureas
7.0%	Available Phosphate (P ₂ O ₅) from monoammonium phosphate
14.0%	Soluble Potash (K ₂ O) from potassium sulfate
9.56%	Total Sulfur (S) from sulfate
0.29%	Iron (Fe) water soluble from iron sulfate
0.14%	Manganese (Mn) water soluble from manganese sulfate

Application rates: 15-30 g/m² (150-300 kg/ha)

Directions for use: Apply product to actively growing turf at 15-30 g/m². Apply to dry foliage. Immediately after application, apply a minimum of 5 mm of water to disperse particles into the root zone. Due to variations in temperature and water pH, best results are achieved by splitting the irrigation into 2 applications at 10-15 minutes apart. This will allow for more thorough particle dispersion into the root zone. Particle color may vary from lot to lot. Apply only at low rates if temperatures exceed 25°C and irrigate immediately after application. This product contains iron which may stain concrete and other surfaces. Remove particles promptly by sweeping or blowing to avoid staining. DO NOT WASH OFF WITH WATER. Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing. Use only clean, dry spreaders. Do not leave unused product in spreaders.

Deutschland/Österreich	EC-DÜNGER NPK-DÜNGER MIT HARNSTOFF-FORMALDEHYD Mit Mn 14 + 7 + 14 + Mn
14,0%	Gesamtstickstoff (N) 5,6% Ammoniumstickstoff (N) 1,3% Harnstoffstickstoff (N) 7,1% Stickstoff (N) aus Harnstoff-Formaldehyd mit 4,2% Stickstoff (N) aus Harnstoff-Formaldehyd, löslich nur in kaltem Wasser 1,5% Stickstoff (N) aus Harnstoff-Formaldehyd, löslich nur in heißem Wasser
7,0%	Phosphorpentoxid (P ₂ O ₅), löslich in neutralem Ammoniumcitrat und Wasser mit 6,6 % wasserlöslichem P ₂ O ₅
14,0%	Kaliumoxid (K ₂ O), wasserlöslich
23,9%	Schwefeltrioxid (SO ₃), wasserlöslich
0,14%	Mangan (Mn), wasserlöslich
Inverkehrbringer:	TURF Handels GmbH Am Harlboden 48, A-8101 Gratkorn

Aufwandmenge: 15-30 g/m² (150-300 kg/ha)

Anwendungsempfehlung: Das Produkt mit einer Streueinstellung von 15-30 g/m² auf einem aktiv wachsenden, trockenen Rasen ausstreuen. Sofort nach der Ausbringung mindestens 5 mm Wasser versprühen, damit sich die Partikel in der Wurzelzone verteilen und auflösen. Aufgrund von Schwankungen bzgl. Temperatur und pH-Gehalt des Wassers sollte die Bewässerung zweimal in einem Abstand von 10-15 Minuten stattfinden. Auf diese Weise können sich die Partikel in der Wurzelzone gründlicher verteilen. Die Partikelfarbe kann je nach Produktcharge anders ausfallen. Bei Temperaturen von über 25° C nur in geringen Mengen auftragen und sofort nach dem Ausstreuen bewässern. Dieses Produkt enthält Eisen, das auf Beton und anderen Oberflächen Flecken hinterlassen kann. Zurückgebliebene Partikel sofort wegbürsten oder -blasen, um eine Fleckenbildung zu verhindern. NICHT MIT WASSER ABWASCHEN. Ein einem sauberen, trockenen Ort lagern. Dem geöffneten Beutel durch Umklappen der Oberkante und Schließen. Nur saubere, trockene Streuer verwenden. Kein unverbrauchtes Produkt im Streuer lassen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren!

Norge	EC GJØDNING NPK GJØDNING INNEHOLDER UREA-FORMALDEHYD MED Mn 14 + 3,1 + 11,6 + Mn
14,0%	Samlet Nitrogen (N) 5,6% Ammoniaknitrogen (N) 1,3% Urea-nitrogen (N) 7,1% Ureaformaldehyd 4,2% Nitrogen (N) fra ureaformaldehyd er bare oppløselig i kaldt vann 1,5% Nitrogen (N) fra ureaformaldehyd er bare oppløselig i varmt vann
3,1%	Fosfor (P) oppløselig i nøytralt ammoniumcitrat og vann med 2,9% P oppløselig i vann
11,6%	Kalium (K) oppløselig i vann
9,6%	Svovel (S) oppløselig i vann
0,14%	Mangan (Mn) oppløselig i vann

Lav i klorid. Skal bare brukes når det er fastslått at der er behov for det. Riktige doser må ikke overskrides.

Distributør i Norge: Floratine Norge AS
Gullfunnest 50, 1570 Dilling, NORWAY

Anbefalte gjødselmengder: 15-30 g/m² (150-300 kg/ha)

Gjødsla tilføres når grasen er i vekst, og på tørt bladverk. Umiddelbart etter påføringen, påføre et minimum av 5 mm vann for å dispergere partikler i rotzonen. På grunn av variasjoner i temperatur og pH-verdi i vann, er de beste resultater oppnådd ved å splitte vannet i 2 applikasjoner ved 10-15 minutters mellomrom. Dette vil gi rom for mer grundig partikkelspredning i rotzonen. Partikkel fargen kan variere fra parti til parti. Bruk mindre gjødselmengder ved høge temperaturer (> 25°C), og vann øyeblikkelig for å unngå sving. Dette produktet inneholder jern som kan misfarge betong og andre overflater. Fjern partikler omgivende ved feiling eller blissing. VASK IKKE BORT MED VANN. I forbindelse med gjødsling skal det kun benyttes tørre og rene gjødselspredere. La ikke gjødsl bil liggende igjen i sprederen. Gjødsla skal lagres tørt.

España/CE	ABONO CE ABONO COMPLEJO ABONO NPK contenido urea formaldehido con Mn 14 + 7 + 14 + Mn
14,0%	Nitrógeno total (N) 5,6% Nitrógeno amoniacal (N) 1,3% de nitrógeno ureico (N) 7,1% Nitrógeno (N) de la urea con el formaldehido 4,2% Nitrógeno (N) sólo de la urea formaldehido soluble en agua fría 1,5% Nitrógeno (N) de la urea formaldehido soluble únicamente en agua caliente
7,0%	Pentóxido de fósforo (P ₂ O ₅) soluble en citrato amónico neutro y agua con 6,6% soluble en agua P ₂ O ₅
14,0%	de óxido de potasio (K ₂ O) soluble en agua
23,9%	de azufre (SO ₃) soluble en agua
0,14%	Manganeso (Mn) soluble en agua
Bajo en cloruro.	Para ser utilizado sólo cuando haya una necesidad reconocida. No sobrepasar las dosis recomendadas.
Importador para España:	

Dosis de aplicación: 15-30 grs/m² (150-300 Kg/ha)

Instrucciones de uso: Aplique 15-30 g/m² del producto a céspedes que estén creciendo activamente. Aplique sobre el follaje seco. Inmediatamente después de la aplicación, aplique un mínimo de 5 mm de agua para dispersar las partículas en la zona de raíces. Debido a las variaciones en la temperatura y el pH del agua, los mejores resultados se consiguen dividiendo el riego en 2 aplicaciones de 10-15 minutos aparte. Esto permitirá una dispersión más completa de las partículas en la zona de las raíces. El color de las partículas puede variar de un lote a otro. Aplique dosis más bajas si las temperaturas superan los 25°C y riegue inmediatamente después de la aplicación. Este producto contiene hierro, el cual puede manchar el concreto y otras superficies. Para evitar manchas, elimine prontamente las partículas del producto mediante barrido o lavado. NO ELIMINAR CON AGUA. Almacene en un sitio limpio y seco. Vuelva a cerrar la bolsa abierta, doblando la parte superior hacia abajo y sujetándola. Sólo use esparcadores limpios y secos. No deje producto sin utilizar en los esparcadores.

Australia	14 + 3.1 + 11.6 + Fe, Mn
14.0%	Total Nitrogen (N) 5.6% Ammoniacal Nitrogen 1.3% Urea Nitrogen 4.2% Other Water Soluble Nitrogen from methylene ureas 2.9% Water Insoluble Nitrogen from methylene ureas
3.1%	Phosphorus (P) from ammonium phosphate
11.6%	Potassium (K) from potassium sulfate
9.6%	Sulfur (S) from sulfate
0.3%	Iron (Fe) water soluble from ferrous sulfate
0.14%	Manganese (Mn) water soluble from manganese sulfate

Application rates: 1.5 - 3.0 kg/100 m² (150-300 kg/ha)

Directions for use: Apply product to actively growing turf at 1.5 - 3.0 kg/100 m². Apply to dry foliage. Immediately after application, apply a minimum of 5 mm of water to disperse particles into the root zone. Due to variations in temperature and water pH, best results are achieved by splitting the irrigation into 2 applications at 10-15 minutes apart. This will allow for more thorough particle dispersion into the root zone. Particle color may vary from lot to lot. Apply only at low rates if temperatures exceed 25°C and irrigate immediately after application. This product contains iron which may stain concrete and other surfaces. Remove particles promptly by sweeping or blowing to avoid staining. DO NOT WASH OFF WITH WATER. Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing. Use only clean, dry spreaders. Do not leave unused product in spreaders.

UK/EC	EC FERTILISER NPK FERTILISER CONTAINING UREA FORMALDEHYDE WITH Mn 14 + 7 + 14 + Mn
14.0%	Total nitrogen (N) 5.6% Ammoniacal nitrogen (N) 1.3% Ureic nitrogen (N) 7.1% Nitrogen (N) from urea formaldehyde with 4.2% Nitrogen (N) from urea formaldehyde only soluble in cold water 1.5% Nitrogen (N) from urea formaldehyde only soluble in hot water
7.0%	Phosphorous pentoxide (P ₂ O ₅) soluble in neutral ammonium citrate and water with 6.6% water soluble P ₂ O ₅
14.0%	Potassium oxide (K ₂ O) water soluble
23.9%	Sulphur trioxide (SO ₃) water soluble
0.14%	Manganese (Mn) water soluble
Low in chloride.	To be used only where there is a recognised need. Do not exceed the appropriate dose rates.
Import in U.K. by:	Greentech Sportsurf Ltd. Block 5 Unit 1 - Bandeath Industrial Estate Throsk, Stirling - Scotland FK7 7NP

Application rates: 15-30 g/m² (150-300 kg/ha)

Directions for use: Apply product to actively growing turf at 15-30 g/m². Apply to dry foliage. Immediately after application, apply a minimum of 5 mm of water to disperse particles into the root zone. Due to variations in temperature and water pH, best results are achieved by splitting the irrigation into 2 applications at 10-15 minutes apart. This will allow for more thorough particle dispersion into the root zone. Particle color may vary from lot to lot. Apply only at low rates if temperatures exceed 25°C and irrigate immediately after application. This product contains iron which may stain concrete and other surfaces. Remove particles promptly by sweeping or blowing to avoid staining. DO NOT WASH OFF WITH WATER. Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing. Use only clean, dry spreaders. Do not leave unused product in spreaders.

Eire/EC	EC FERTILISER NPK FERTILISER CONTAINING UREA FORMALDEHYDE WITH Mn 14 + 3.1 + 11.6 + Mn
14.0%	Total nitrogen (N) 5.6% Ammoniacal nitrogen (N) 1.3% Ureic nitrogen (N) 7.1% Nitrogen (N) from urea formaldehyde with 4.2% Nitrogen (N) from urea formaldehyde only soluble in cold water 1.5% Nitrogen (N) from urea formaldehyde only soluble in hot water
3.1.0%	Phosphorus (P) soluble in neutral ammonium citrate and water with 2.9% water soluble P
11.6%	Potassium (K) water soluble
9.6%	Sulphur (S) water soluble
0.14%	Manganese (Mn) water soluble
Low in chloride.	To be used only where there is a recognised need. Do not exceed the appropriate dose rates.
Import in EIRE by:	Greentech Sportsurf Ltd. Block 5 Unit 1 - Bandeath Industrial Estate Throsk, Stirling - Scotland FK7 7NP

Application rates: 15-30 g/m² (150-300 kg/ha)

Directions for use: Apply product to actively growing turf at 15-30 g/m². Apply to dry foliage. Immediately after application, apply a minimum of 5 mm of water to disperse particles into the root zone. Due to variations in temperature and water pH, best results are achieved by splitting the irrigation into 2 applications at 10-15 minutes apart. This will allow for more thorough particle dispersion into the root zone. Particle color may vary from lot to lot. Apply only at low rates if temperatures exceed 25°C and irrigate immediately after application. This product contains iron which may stain concrete and other surfaces. Remove particles promptly by sweeping or blowing to avoid staining. DO NOT WASH OFF WITH WATER. Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing. Use only clean, dry spreaders. Do not leave unused product in spreaders.

Denmark	EC KUNSTGØDNING NPK KUNSTGØDNING INDEHOLDENDE FRA UREA-FORMALDEHYD MED Mn 14 + 3,1 + 11,6 + Mn
14,0%	Samlet kvælstof (N) 5,6% Ammoniumkvælstof (N) 1,3% Ureakvælstof (N) 7,1% Kvælstof (N) fra ureaformaldehyd med 4,2% kvælstof (N) fra ureaformaldehyd kun opløseligt i koldt vand 1,5% kvælstof (N) fra ureaformaldehyd kun opløseligt i varmt vand
3,1%	Fosfor (P) opløseligt i neutral ammoniumcitrat og vand med 2,9% vandopløseligt P
11,6%	Kalium (K) vandopløseligt
9,6%	Svovl (S) vandopløseligt
0,14%	Mangan (Mn) vandopløseligt

Lavt kloridindhold. Bør kun bruges når det er konstateret, at der er behov for det. De passende dosisrater må ikke overskrides.

Importører i Danmark af: Floratine Norge AS
Gullfunnest 50, 1570 DILLING

Applikationsrater: 15-30 g/m² (150-300 kg/ha)

Brugsanvisninger: Kom produktet på aktivt voksende græsbevæd ved 15-30 g/m². Påføres på tørre blade. Umiddelbart efter påføringen, påføres mindst 5 mm vand at dispergere partikler i rotzonen. På grund af variationer i temperatur og vand pH, er de bedste resultater opnået ved at opdele kunvanding i 2 ansøgninger på 10-15 minutter fra hinanden. Dette vil give mulighed for mere grundig dispergation i rotzonen. Partikel farve kan variere fra parti til parti. Nedsæt påføringsmængden, hvis temperaturen overstiger 25°C og oversi umiddelbart efter påføring. Dette produkt indeholder jern, som kan plette beton og andre overflader. Fjern partikler med et tørt klud eller blæser for at undgå pletter. VASK IKKE VASKES AF MED VAND. Overvåges et tørt, rent stæd. Forsøg den åbne pose igen ved at folde toppen ned og fastgør den. Brug kun rene, tørre spredere. Der må ikke efterlades ubrugt produkt i en spredere.

Greece - Αριθμ. Κυκλοφορίας: 31	14 + 7 + 14 + Fe, Mn
14,0%	Ολικό άζωτο (N) 5,6% Αμμωνιακό άζωτο 1,26% Άζωτο ουρίας 4,20% Άλλο υδατοδιαλυτό Άζωτο από ουρίες μεθυλενίου 2,94% Αδιάλυτο στο νερό Άζωτο από ουρίες μεθυλενίου
7,0%	Διασέσιμο φωσφορικό (P ₂ O ₅) από το όξινο φωσφορικό αμμώνιο
14,0%	Διαλυτή Πότσα (K ₂ O) από το θειικό κάλιο και θειικό κάλιο μαγνησίτης
9,56%	Ολικό θείο (S) από θειικό άλας
0,3%	Σίδηρος (Fe) υδατοδιαλυτός από θειικό σίδηρο
0,14%	Μαγγάνιο (Mn) υδατοδιαλυτό από θειικό μαγγάνιο
Εισαγωγή στην Ελλάδα από:	Georponikos Oikos 3 Makedonias St., Athens, GREECE

Ρυθμίσι εφαρμογής: 15-30 g/m² (150-300 kg/ha)

Οδηγίες χρήσης: Εφαρμόστε το προϊόν σε γκαζόν που αναπτύσσεται ενεργά στα 15-30 g/m². Εφαρμόστε σε ξηρή φυλλοπλάτη. Αμέσως μετά την εφαρμογή, ποτίστε με τουλάχιστον 5 mm νερό για να διαλυθεί το σωματίδιο στη ζώνη ρίζας. Λόγω των διακυμάνσεων της θερμοκρασίας και του pH του νερού, τα καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται όταν μοιράζεται την άρδευση σε 2 εφαρμογές 10-15 λεπτών. Αυτό θα επιτρέψει την πιο καλή διασπορά σωματιδίων στη ζώνη ρίζας. Το χρώμα των σωματιδίων μπορεί να ποικίλει από παρτίδα σε παρτίδα. Εφαρμόστε μόνο σε χαμηλούς ρυθμούς σε θερμοκρασία υπερβαίνει τους 25°C και ποτίστε αμέσως μετά από την εφαρμογή. Το προϊόν αυτό περιέχει σίδηρο που μπορεί να προκαλέσει λεκέδες σε τοιχό και άλλες επιφάνειες. Καθαρίστε το σωματίδιο αμέσως με σκούπισμα ή ψύξη για να αποφευχθεί το λεκέσμα. ΜΗΝ ΣΕΛΛΑΓΕΤΕ ΜΕ ΝΕΡΟ. Αποθηκεύστε σε καθαρό, ξηρό χώρο. Να είναι σφραγιστεί τις ανοιχτές σακούλες διατηλώνοντας το πάνω μέρος προς τα κάτω και ασφαλιζόντάς το. Να χρησιμοποιείτε μόνο καθαρά, στεγνά μηχανήματα σποράς. Πάνω σφίγγετε προϊόν στα μηχανήματα σποράς μετά τη χρήση.

New Zealand	14 + 3.1 + 11.6 + Fe, Mn
14.0%	Total Nitrogen (N) 5.6% Ammoniacal Nitrogen 1.3% Urea Nitrogen 4.2% Other Water Soluble Nitrogen from methylene ureas 2.9% Water Insoluble Nitrogen from methylene ureas
3.1%	Phosphorus (P) from ammonium phosphate
11.6%	Potassium (K) from potassium sulfate
9.6%	Sulfur (S) from sulfate
0.3%	Iron (Fe) water soluble from ferrous sulfate
0.14%	Manganese (Mn) water soluble from manganese sulfate

Application rates: 15-30 g/m² (150-300 kg/ha)

Directions for use: Apply product to actively growing turf at 15-30 g/m². Apply to dry foliage. Immediately after application, apply a minimum of 5 mm of water to disperse particles into the root zone. Due to variations in temperature and water pH, best results are achieved by splitting the irrigation into 2 applications at 10-15 minutes apart. This will allow for more thorough particle dispersion into the root zone. Particle color may vary from lot to lot. Apply only at low rates if temperatures exceed 25°C and irrigate immediately after application. This product contains iron which may stain concrete and other surfaces. Remove particles promptly by sweeping or blowing to avoid staining. DO NOT WASH OFF WITH WATER. Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing. Use only clean, dry spreaders. Do not leave unused product in spreaders.

France/EC	Engrais NPK contenant de l'urée formaldéhyde action lente 14-7-14
14.0%	Azote (N) total 5.6% Azote (N) ammoniacal 1.3% Azote (N) uréique 7.1% azote (N) organique de synthèse de l'urée formaldéhyde dont 4.2% soluble à 20°C dont 1.5% soluble à 100°C mais insoluble à 20°C dont 1.4% insoluble à 100°C
7.0%	Anhydride phosphorique (P ₂ O ₅) total 7.0% dont Anhydride phosphorique (P ₂ O ₅) soluble dans le citrate d'ammonium neutre 6.6% dont Anhydride phosphorique (P ₂ O ₅) soluble dans l'eau
14.0%	Oxyde de potassium (K ₂ O) soluble dans l'eau
24.0%	Anhydride sulfurique (SO ₃) soluble dans l'eau
Importé en France par:	LOB GREEN S.A.S. 21 Rue du Saint Sépulcre 62560 Saint Omer France

Dose d'emploi

Cet engrais est destiné à la fertilisation des gazons et permet de fournir les éléments majeurs nécessaires à un bon développement, d'une manière équilibrée. L'azote organique de synthèse permet une mise à disposition de l'azote étalée dans le temps. Apporter de 150 à 200 kg/ha plusieurs fois pendant la saison de croissance du gazon. L'engrais sera appliqué uniformément sur toute la surface. L'humidité présente sur le feuillage ou un léger arrosage permettront un défillement très rapide des granulés grâce à la technologie NUTRI DG (granulé dispersible).

Italia	FERTILIZZANTE EC FERTILIZZANTE NPK CONTENENTE UREA FORMALDEIDE CON Mn 14 + 7 + 14 + Mn
14,0%	Totale azoto (N) 5,6% Azoto ammoniacato (N) 1,3% Azoto ureico (N) 7,1% Azoto (N) da urea formaldeide con 4,2% Azoto (N) da urea formaldeide solubile solo in acqua fredda 1,5% Azoto (N) da urea formaldeide solubile solo in acqua calda
7,0%	di pentossido di fosforo (P ₂ O ₅) solubile in citrato di ammonio neutro e acqua con 6,6% di P ₂ O ₅ solubile in acqua
14,0%	di ossido di potassio (K ₂ O) solubile in acqua
23,9%	di triossido di zolfo (SO ₃) solubile in acqua
0,14%	di manganese (Mn) solubile in acqua
Basso contenuto di cloro.	Da usare solo quando vi è un bisogno riconosciuto. Non superare i dosaggi appropriati.
Importato (fabbricante) da:	BOTTOS s.r.l. via Lusevera,1 – 33078 San Vito al Tagliamento (PN)
Distribuito da:	EMERALD s.r.l.

Tassi di applicazione: 15-30 g/m² (150-300 kg/ha)

Istruzioni per l'uso: applicare 15-30 g/m² di prodotto su manto erboso in crescita. Applicare su manto asciutto. Immediatamente dopo l'applicazione, irrigare con almeno 5 mm di acqua per consentire uno spargimento delle particelle nell'area della radice. A causa delle variazioni della temperatura e del pH dell'acqua, si ottengono i migliori risultati dividendo il processo d'irrigazione in due applicazioni da 10-15 minuti ciascuna. Questo consente un migliore spargimento delle particelle nell'area della radice. Il colore delle particelle può variare da lotto a lotto. Se la temperatura scende i 25°C applicare solo dosaggi bassi ed irrigare immediatamente dopo l'applicazione. Il presente prodotto contiene ferro, che potrebbe macchiare superfici in cemento o altri materiali. Per evitare che il prodotto macchi, rimuove le particelle immediatamente o usando una scopa appiattita o un soffiatore. NON PULIRE USANDO ACQUA. Conservare in luogo asciutto e pulito. Risigillare il sacchetto aperto piegando ed assicurando la parte superiore. Usare solo spargitori puliti ed asciutti. Non lasciare prodotto non usato negli spargitori.

Canada	14 + 7 + 14 + Fe, Mn
Registration Number 2026015M Fertilizers Act Loft xxxxxxx 60% of nitrogen from MUtech™	
Guaranteed Minimum Analysis	
14.0%	Total Nitrogen (N) 5.60% Ammoniacal Nitrogen 1.26% Urea Nitrogen 2.94% Other Water Soluble Nitrogen 4.20% Other Water Soluble Nitrogen*
7.0%	Available Phosphate (P ₂ O ₅)
14.0%	Soluble Potash (K ₂ O)
9.56%	Sulfur (S)
0.33%	Iron (Fe) (actual)
0.14%	Manganese (Mn) (actual)
0.14%	Water Soluble Iron (Fe)
0.14%	Water Soluble Manganese (Mn)

*4.20% Slowly available Nitrogen from methylene ureas

Application rates: 1.74 - 3.48 kg/100 m² (3.57 - 7.15 lbs/1,000 sq. ft.)

Directions for use: This product must be used on the basis of a soil or tissue analysis. Seek advice from the county agricultural representative or a professional agricultural consultant. Use Andersons Nutri DG® Dispersing Granule Technology 14-7-14 for greens and tees where a high nitrogen and potassium application is desired or when iron and manganese are needed to help correct or prevent deficiencies during the growing season. Watering in this product will disperse each granule into thousands of particles. This will facilitate themovement of the nutrients into the soil. This particle dispersion will greatly reduce ball, shoe and mower pickup - minimizing nutrient loss. Application to wet, close-cut golf turf may result in foaming staining, which will discolor the turf to a brown/black appearance. This will occur even if immediate irrigation or rainfall occurs. Be sure to apply this product to dry turf only.

CAUTION: this fertilizer contains iron and manganese and should be used only as recommended. It may prove harmful when misused.

Storage and use: Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing. Use only clean, dry spreaders or applicators. Do not leave unused product in spreaders.

PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT / PROTECTION MEASURES / CONTROLS: RESPIRATORY PROTECTION: NIOSH approved respirator, if required. EYE PROTECTION: Safety glasses with side shields, goggles, or face shield. SKIN PROTECTION: Appropriate for the task. IMPERVIOUS and compatible with material. VENTILATION: Use with adequate ventilation.

Taiwan (R.O.C.)	14 + 7 + 14 + Fe, Mn
14.0%	Total Nitrogen (N) 5.60% Ammoniacal Nitrogen 1.26% Urea Nitrogen 4.20% Other Water Soluble Nitrogen from methylene ureas 2.94% Water Insoluble Nitrogen from methylene ureas
7.0%	Available Phosphate (P ₂ O ₅) from ammonium phosphate
14.0%	Soluble Potash (K ₂ O) from potassium sulfate
9.56%	Total Sulfur (S) from sulfate
0.29%	Iron (Fe) water soluble from iron sulfate
0.14%	Manganese (Mn) water soluble from manganese sulfate

Application rates: 15-30 g/m² (150-300 kg/ha)

Directions for use: Apply product to actively growing turf at 15-30 g/m². Apply to dry foliage. Immediately after application, apply a minimum of 5 mm of water to disperse particles into the root zone. Due to variations in temperature and water pH, best results are achieved by splitting the irrigation into 2 applications at 10-15 minutes apart. This will allow for more thorough particle dispersion into the root zone. Particle color may vary from lot to lot. Apply only at low rates if temperatures exceed 25°C and irrigate immediately after application. This product contains iron which may stain concrete and other surfaces. Remove particles promptly by sweeping or blowing to avoid staining. DO NOT WASH OFF WITH WATER. Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing. Use only clean, dry spreaders. Do not leave unused product in spreaders.

Attention
H302 Nocif en cas d'ingestion H315 Provoque une irritation cutanée H319 Provoque une sévère irritation des yeux H335 Peut irriter les voies respiratoires P261 Éviter de respirer les poussières P264 Se laver soigneusement après manipulation P270 Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit P271 Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé P280 Porter un équipement de protection des yeux et du visage. P302 + P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l'eau et au savon. P332 + P313 En cas d'irritation cutanée, consulter un médecin. P362 + P364 Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P337 + P313 Si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin. P304 + P340 EN CAS D'INHALATION : transporter la victime à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. P312 Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. P330 Rincer la bouche P501 Eliminer le contenu selon les lois et règlements en vigueur.

Sverige	EU-GÖDSELMEDEL NPK-gödselmedel som innehåller urea formaldehyd med Mn 14 + 3,1 + 11,6 + Mn
14,0%	Total andel kväve (N) 5,6% Ammoniakkväve (N) 1,3% Kväve (N) som urea 7,1% Urea formaldehyd 4,2% kväve (N) från urea-formaldehyd endast lösligt i kallt vatten 1,5% kväve (N) från urea-formaldehyd endast lösligt i varmt vatten
3,1%	Fosfor (P) lösigt i neutralt ammoniumcitrat och vatten med 2,9% P vattenlösigt
11,6%	Kalium (K) vattenlösigt
9,6%	Svavel (S) vattenlösigt
0,14%	Mangan (Mn) vattenlösigt
Låg kloridhalt.	Bör kunna användas när det konstateras att det föreligger behov för dess användning. De passande dosraterna får ej överskridas.
Distributör i Sverige:	Floratine Scandinavia AB c/o Floratine Norge AS Gullfunnet 50, 1570 Dilling NORGE

Dosering: 15-30 g/m² (150-300 kg/ha)

Gödsla när gräset är i tillväxt. Omedelbart efter appliceringen, applicera ett minimum av 5 mm vatten för att dispergera partiklar in i rotzonen. På grund av variationer i temperatur och vattnets pH, uppnås de bästa resultaten genom att dela upp bevattning i 2 applikationer vid 10-15 minuters mellanrum. Detta kommer att möjliggöra mer noggrann partikel dispersion i rotzonen. Partikel färg kan variera från parti till parti. Använd mindre gödselmängder vid höga temperaturer (> 25°C), och vatten omedelbart för att undvika brännskador. Detta produkt innehåller järn som kan misfärga betong och andra ytor. Ta bort partiklar snabbt genom sugning eller blåsning. TVÄTTA INTE BORT MED VATTEN. I samband med gödsling bör endast torra och rena gödselspridare användas. Låt inte gödselmedel bli liggande kvar i spridaren. Gödslet skal lagras tørt.

Nutri DG® Verts 14-7-14 + Fe, Mn	Numéro d'enregistrement 2026015M Loi sur les engrais
Analyse: Minimum Garantie 14,0%Azote Totale (N)	No de lot: xxxxxx 60% de l'azote de MUtech™
5,60% Azote ammoniacal 1,26% Azote uréique 2,94% Azote insoluble dans l'eau 4,20% Autre azote soluble dans l'eau*	
7,0% Phosphate Assimilable (P ₂ O ₅) 14,0% Potasse Soluble (K ₂ O) 9,56% Soufre (S) 0,33% Fer (Fe) (réel) 0,14% Manganèse (Mn) (réel)	
0,14% Manganèse soluble dans l'eau (Mn)	