

PolySports™

SGN 240

20 + 4 + 20 + Fe

(20 + 1.7 + 16.6 + Fe)

60%

NS-54®

USA/INT	20 + 4 + 20 + Fe
20.0%	Total Nitrogen (N) 0.84 Ammoniacal Nitrogen 19.16 Urea Nitrogen*
4.0%	Available Phosphate (P ₂ O ₅) from ammonium phosphate
20.0%	Soluble Potash (K ₂ O) from potassium chloride
1.11%	Total Sulfur (S) from sulfur
5.0%	Iron (Fe) from ferric oxide

*12.00% Slowly available nitrogen from polymer coated sulfur coated urea

Application rates: 20-30 g/m² (200-300 kg/ha)

Directions for use: Apply product to actively growing turf at 20-30 g/m². Apply to dry foliage. Water in after application with 5 to 6 mm of irrigation. If temperatures exceed 25°C or if application to damp or wet turf is unavoidable, irrigate immediately after application. Apply at low rates if temperatures exceed 25°C. Do not use on putting greens. This product contains iron which may stain concrete and other surfaces. Remove particles promptly by sweeping or blowing to avoid staining. **DO NOT WASH OFF WITH WATER.** Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing. Use only clean, dry spreaders. Do not leave unused product in spreaders.

UK/EC	EC FERTILISER NK FERTILISER WITH Fe 20 + 0 + 20 + Fe
20.0%	Total Nitrogen (N) 0.8% Ammoniacal nitrogen (N) 19.2% Ureic nitrogen (N)
20.0%	Potassium oxide (K ₂ O) water soluble Iron (Fe)
Import in U.K. by:	Greentech Sportsturf Scotland Block 5 Unit 1 - Bandeath Industrial Estate Throsk, Stirling Scotland FK7 7NP
	Prograss Bio UK Ltd 4 hatchery Close Appleton Thorn, Warrington WA44TF, United Kingdom

Application Rates: 20-30 g/m² (200-300 kg/ha)

Directions for use: Apply product to actively growing turf at 20-30 g/m². Apply to dry foliage. Water in after application with 5 to 6 mm of irrigation. If temperatures exceed 25°C or if application to damp or wet turf is unavoidable, irrigate immediately after application. Apply at low rates if temperatures exceed 25°C. Do not use on putting greens. This product contains iron which may stain concrete and other surfaces. Remove particles promptly by sweeping or blowing to avoid staining. **DO NOT WASH OFF WITH WATER.** Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing. Use only clean, dry spreaders. Do not leave unused product in spreaders.

Eire/EC	EC FERTILISER NK FERTILISER WITH Fe 20 + 0 + 16.6 + Fe
20.0%	Total nitrogen (N) 0.8% Ammoniacal nitrogen (N) 19.2% Ureic nitrogen (N)
16.6%	Potassium (K) water soluble
5.0%	Iron (Fe)
Import in EIRE by:	Greentech Sportsturf Ireland 2 Greenbanks Woodlawn Road Killarney, V93 N2D2 Ireland

Application rates: 20-30 g/m² (200-300 kg/ha)

Directions for use: Apply product to actively growing turf at 20-30 g/m². Apply to dry foliage. Water in after application with 5 to 6 mm of irrigation. If temperatures exceed 25°C or if application to damp or wet turf is unavoidable, irrigate immediately after application. Apply at low rates if temperatures exceed 25°C. Do not use on putting greens. This product contains iron which may stain concrete and other surfaces. Remove particles promptly by sweeping or blowing to avoid staining. **DO NOT WASH OFF WITH WATER.** Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing. Use only clean, dry spreaders. Do not leave unused product in spreaders.

France/EC	ENGRAIS EC ENGRAIS NK AVEC Fe 20 + 0 + 20 + Fe
20,0%	Azote totale (N) 0,8% Azote ammoniacal (N) 19,2% Azote uréique (N)
20,0%	Oxyde de potassium (K ₂ O) soluble dans l'eau
5,0%	Fer (Fe)
Importé en France par:	LOB Green by Cobalys 21 rue du Saint Sépulcre 62500 SAINT OMER France

Taux d'application : 20-30 g/m² (200-300 kg/ha)

Mode d'emploi : Appliquer le produit sur le gazon en plaques en état de croissance active à un taux de 20-30 g/m². Appliquer sur le feuillage sec. Arroser après application avec 5 à 6 mm d'irrigation. Dans des températures supérieures à 25°C ou si l'application pour humidifier ou mouiller le gazon est inévitable, irriguer immédiatement après application. Appliquer à de faibles taux si les températures sont supérieures à 25°C. Ne pas utiliser sur les verts de rouler. Ce produit contient du fer, susceptible de tacher le béton et d'autres surfaces. Éliminer rapidement les particules en balayant ou en soufflant pour éviter toute tache. NE PAS LAVER À L'EAU. Entreposer dans un endroit propre et sec. Refermer hermétiquement le sac ouvert en repliant le haut et en sécurisant. Utiliser uniquement des épandouses propres et sèches. Ne pas laisser de produit non utilisé dans les épandouses.

Deutschland/Österreich	Deklaration nach Deutscher Düngemittelverordnung 2012: NK-Dünger mit teilweise umhülltem Stickstoff und Eisen, 20 - 20
20,0 %	N Gesamtstickstoff 0,8% N Ammoniumstickstoff 19,2% N Carbamidstickstoff
20,0 %	K ₂ O wasserlösliches Kaliumoxid 5,0 % Fe Eisen
Nettomasse: 25 kg	Inverkehrbringer: TURF Handels GmbH, Am Harbodon 48, A – 8101 Gratkorn
Nebenbestandteile:	4,8 % S wasserlöslicher Schwefel
Anwendungshilfsmittel:	60 % des Gesamtstickstoffes sind unter Verwendung einer Polymerhülle umhüllt

Hinweise zur sachgerechten Lagerung: In der Originalverpackung trocken, kühl, frostfrei lagern. Restmengen dicht und trocken verschließen. Für Kinder und Haustiere unerreichbar aufbewahren. **Anwendung:** Während der Hauptvegetationszeit mit 20-30 g/m² auf Tees oder anderen Rasenflächen ausbringen. Um die Verteilung in der Rasennarbe zu optimieren anschließend mit mindesten 5-6 mm beregnen. Bei Temperaturen über 30°C nur mit geringer Aufwandmenge streuen und sofort beregnen. - Hinweis: Empfehlungen der amtlichen Beratungen gelten vor. Das Produkt enthält Eisen, das auf gepflasterten Oberflächen im Zusammenhang mit Wasser Flecken verursachen kann. Die Umhüllung hat einen Wirkzeitraum von 12-14 Wochen. Für alle Zier- und Sportrasenflächen. Enthält auch: 4,0 % P2O5 neutralammoncitrat- und wasserlösliches Phosphat

España/CE	ABONO CE NK ABO NO CON FE 20 + 0 + 20 + Fe
20,0%	Nitrógeno total (N) 0,8% Nitrógeno amoniacal (N) 19,2% de nitrógeno ureico (N)
20,0%	de óxido de potasio (K ₂ O) soluble en agua
5,0%	Hierro (Fe)
Importador para España:	

Dosis de aplicación: 20-30 grs/m² (200-300 kg/ha)

Instrucciones de uso: Aplicación de productos en crecimiento activo del césped. Aplicar cuando la hoja esté seca. Regar después de la aplicación con 5 a 6 mm de agua de riego. Se aconseja aplicar sólo a dosis bajas si las temperatura es superior a 25°C. Regar inmediatamente después de la aplicación. Este producto contiene hierro que puede manchar zonas aplicadas u otras superficies. Eliminar las partículas sobrantes barriendo o soplando (máquinas sopladoras) para evitar manchas. NO SE LAVAR CON AGUA. Conservar el envase en un lugar limpio y seco. Una vez abierto el saco evitar que entre humedad, asegúrese de cerrar la parte superior del saco. Utilice sólo abonadoras limpias y secas. No deje de producto no utilizado en las abonadoras.

Italia	CONCIME MINERALE COMPOSTO Concime NK 20-20 con ferro (Fe) parzialmente ricoperto ottenuto per miscelazione MANTENIMENTO 20 + 0 + 20 + Fe
20,0%	Totale azoto (N) 0,8% Azoto ammoniacale (N) 19,2% Azoto ureico (N)
20,0%	di ossido di potassio (K ₂ O), solubile in acqua
5,0%	di ferro (Fe)
Importato (fabbricante) da:	BOTTOS s.r.l. via Lusevera,1 – 33078 San Vito al Tagliamento (PN)
Distribuito da:	EMERALD s.r.l.

Tassi di applicazione: 20-30 g/m² (200-300 kg/ha)

Indicazioni per l'uso: Applicare 20-30 g/m² di prodotto su manto erboso in crescita. Applicare su manto asciutto. Irrigare dopo l'applicazione coprendo il manto erboso con 5 mm o 6 mm di acqua. Se la temperatura eccede i 25°C applicare solo dosaggi bassi ed irrigare immediatamente dopo l'applicazione. Applicare il prodotto a basse concentrazioni se la temperatura eccede i 25°C. Non usare su putting greens in campi da golf. Il presente prodotto contiene ferro, che potrebbe macchiare superfici in cemento o altri materiali. Per evitare che il prodotto macchi, rimuovere le particelle immediatamente o usando una scopa o un soffiatore. NON PULIRE USANDO ACQUA. Conservare in luogo asciutto e pulito. Risigillare il sacchetto aperto piegando ed assicurando la parte superiore. Usare solo spargitori puliti ed asciutti. Non lasciare prodotto non usato negli spargitori.

België	EC-KUNSTMEST NK-KUNSTMEST MET Fe 20 + 0 + 20 + Fe
20,0%	totaal stikstof (N) 0,8% ammoniakstikstof (N) 19,2% ureumstikstof (N)
20,0%	kaliuioxide (K ₂ O), in water oplosbaar
5,0%	ijzer (Fe)

Importeur voor België:

Aan te brengen hoeveelheden: 20-30 g/m² (200-300 kg/ha)

Gebruiksaanwijzing: Product aanbrengen op groeiend gras. Hoeveelheid: 20-30 g/m². Op droog gras aanbrengen. Na aanbrengen gras bewateren (5 à 6 mm). Bij temperaturen > 25 °C of als aanbrengen op vochtig of nat gras onvermijdelijk is, onmiddellijk na aanbrengen bewateren. Bij temperaturen > 25 °C slechts in kleine hoeveelheden aanbrengen. Niet gebruiken op putting greens. Dit product bevat ijzer, wat op beton en andere oppervlakken roestvlekken kan veroorzaken. Gemorste deeltjes onmiddellijk opvegen of wegblazen om vlekken te voorkomen. NIET MET WATER AFSPOELEN. Op een schone, droge plaats bewaren. Geopende verpakking sluiten door bovenkant omhoog te vouwen en te bevestigen. Uitsluitend schone, droge strooimachines gebruiken. Restanten/niet-gebruikt product volledig uit strooimachines verwijderen.

Norge	EC KUNSTGJØDSEL NK KUNSTGJØDSEL MED Fe 20 + 0 + 16,6 + Fe
20,0%	Samlet nitrogen (N) 0,8% ammoniakalsk nitrogen (N) 19,2% urea-nitrogen (N)
16,6%	Kalium (K) vannoppløselig
5,0%	Jern (Fe)

Distributør i Norge: Floratine Norge AS
Gullfunnet 50
1570 DILLING

Applikasjonsrater: 20-30 g/m² (200-300 kg/ha)

Bruksanvisning: Anvend produktet på aktivt voksende gress i forholdet 20 til 30 g/m². Brukes på tørre gresstrå. Gresset vannes etter påføring - 5 til 6 mm med kunstig vanning. Hvis temperaturen er over 25 °C, eller hvis man ikke kan unngå å anvende produktet på fuktig eller vått gress, skal man vanne like etter påføring. Anvend produktet langsomt hvis temperaturen er over 25°C. Må ikke brukes på putting greens. Dette produktet inneholder jern som kan sette flekker på betong og andre overflater. Fjern partikler omgående ved å feie eller blåse for å unngå flekker. MÅ IKKE VASKES AV MED VANN. Oppbevares på et rent, tørt sted. Den åpne posen forsegles igjen ved å folde toppen ned og sikre den. Bruk kun rene, tørre spredere. Det må ikke la ubrukt produkt bli liggende igjen i en spredere.

Denmark	EC KUNSTGØDNING NK KUNSTGØDNING MED Fe 20 + 0 + 16,6 + Fe
20,0%	Samlet kvælstof (N) 0,8% ammoniakkvælstof (N) 19,2% Ureakvælstof (N)
16,6%	Kalium (K) vandopløseligt
5,0%	Jern (Fe)

Importeres i Danmark af: Floratine Norge AS
Gullfunnet 50
1570 DILLING

Applikationsrater: 20-30 g/m² (200-300 kg/ha)

Brugsanvisninger: Kom produktet på aktivt voksende grønsvæ ved 20-30 g/m². Kom det på tørre græsstrå. Vand efter påføringen med 5 to 6 mm kunstvandig. Hvis temperaturen er over 25°C eller hvis man ikke kan undgå at komme det på fuktig eller våd grønsvæ, skal man kunstvande øjeblikkeligt efter påføringen. Kom det på langsomt hvis temperaturen er over 25°C. Må ikke kommes på putting greens. Dette produkt indeholder jern, som kan plette beton og andre overflader. Fjern partikler med et samme ved at feje eller blæser for at undgå pletter. MÅ IKKE VASKES AF MED VAND. Opbevares et rent, tørt sted. Forsegl den åbne pose igen ved at folde toppen ned og fastgøre den. Brug kun rene, tørre spredere. Der må ikke efterlades ubrukt produkt i en spredere.

Greece	20 + 4 + 20 + Fe
20,0%	Ολικό άζωτο (N) 0,84% Αμμωνιακό άζωτο 19,16% Άζωτο ουρίας*
4,0%	Διαθέσιμα φωσφορούχα (P ₂ O ₅) από φυσικοροκό αμμώνιο
20,0%	Διαλυτή Ποτάσα (K ₂ O) από χλωριούχο κάλιο
1,1%	Ολικό θείο (S) από θείο
5,0%	Σίδηρος (Fe) από οξείδιο σιδήρου

*12,0% διαθέσιμο βροθεϊως άζωτο από πολυμερές επικάλυψη ουρίας επιχρισμένη με θείο.

Εισαγωγή στην Ελλάδα από: Georponikos Oikos
3 Makedonias St., Athens, GREECE

Ρυθμοί εφαρμογής 20-30 g/m² (200-300 kg/ha)

Οδηγίες χρήσης: Εφαρμόστε το προϊόν σε γκαζόν που αναπτύσσεται ενεργά στα 20-30 g/m². Εφαρμόστε σε ζηρή φυλλωσιά. Ποτίστε μετά από την εφαρμογή με 5 έως 6 mm άρδευσης. Αν η θερμοκρασία υπερβάνει τους 25°C ή αν είναι αδύνατον να μην κάνετε την εφαρμογή σε υγραμένο ή υγρό γκαζόν, ποτίστε αμέσως μετά την εφαρμογή. Εφαρμόστε με αργό ρυθμό, εάν οι θερμοκρασίες ξεπερνούν τους 25°C. Μη χρησιμοποιείτε σε γκαζόν «fruiting green». Το προϊόν αυτό περιέχει σίδηρο που μπορεί να προκαλέσει λεκέδες σε τοιμητό και άλλες επιφάνειες. Καθαρίστε τα συμαπτικά αμέσως με σκούπισμα ή φύσιμα για να αποτρέψετε το λεκέσμα. ΜΗΝ ΣΕΠΛΗΝΕΤΕ ΜΕ ΝΕΡΟ. Αποθηκεύστε σε καθαρό, ξηρό χώρο. Να είναι σφραγιστές τις ανοιχτές σακούλες δηλώνοντας το πάνω μέρος προς τα κάτω και ασφαλιζόντας το. Να χρησιμοποιείτε μόνο καθαρά, στεγνά μηχανήματα σποράς. Μην αφήνετε προϊόν στα μηχανήματα σποράς μετά τη χρήση.

Taiwan (R.O.C.)	美壯肥 (20-4-20)
肥料登記證字號: 肥進(複)字第 0128058 號	
肥料品目: 複合肥料 (6-01)	
國外廠牌商品名稱: THE ANDERSONS 20+4+20 TURF FERTILIZER WITH NS-54 NITROGEN	
保證成份: 全氮20.0%· 檸檬酸溶性磷5.0%· 水溶性氧化鉀20.0%	
成品性狀: 固態· 顆粒狀	
使用方法: 施用時葉面需為乾燥狀態· 施後需澆水5-6 mm· 若溫度超過25°C· 則以低比率施用· 若溫度超過25°C· 環境為高濕度狀態或草皮潮濕時· 施後務必立即澆水·	
使用量: 以20-30 g/m ² (200-300公斤/公頃)比率施用於成長中的草皮·	
包裝方式: 袋裝	淨重: 25 kg
有效期限: 4年	批號: 請詳見包裝
製造日期: 請詳見包裝	電話: 04-22135266
總代理: 菁修企業有限公司	
地址: 台中市東區自由路四段210號	
製造地: 美國	
製造廠商: THE ANDERSONS, INC.	
P. O. BOX 119, MAUMEE, OH USA 43537	

Switzerland	PFC 1(C)(I)(a)(ii) Fester anorganischer Mehrnährstoff-Makronährstoff-Dünger NPK-Dünger mit teilweise umhülltem Stickstoff und Eisen
20,0%	N Gesamtstickstoff 0,8% Ammoniumstickstoff 19,2% Carbamidstickstoff
4,0%	P ₂ O ₅ neutralammoncitrat-und wasserlösliches Phosphat
20,0%	K ₂ O wasserlösliches Kaliumoxid
5,0%	Fe Eisen

Dosierung: 20-30 g/m²

Lagerbedingungen: In der Originalverpackung trocken, kühl, frostfrei lagern. Restmengen dicht und trocken verschließen. Für Kinder und Haustiere unerreichbar aufbewahren.

Australia	20 + 1.7 + 16.6 + Fe
20.0%	Total Nitrogen (N) 0.8% Ammoniacal Nitrogen 19.2% Urea Nitrogen
1.7%	Phosphorus (P) from ammonium phosphate
16.6%	Potassium (K) from potassium chloride
1.1%	Sulfur (S) from sulfate
5.0%	Iron (Fe) from ferric oxide

*12.0% Slowly available nitrogen from polymer coated sulfur coated urea.

Application rates: 2.0-3.0 kg/100 m² (200-300 kg/ha)

Directions for use: Apply product to actively growing turf at 2.0-3.0 kg/100 m². Apply to dry foliage. Water in after application with 5 to 6 mm of irrigation. If temperatures exceed 25°C or if application to damp or wet turf is unavoidable, irrigate immediately after application. Apply at low rates if temperatures exceed 25°C. Do not use on putting greens. This product contains iron which may stain concrete and other surfaces. Remove particles promptly by sweeping or blowing to avoid staining. **DO NOT WASH OFF WITH WATER.** Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing. Use only clean, dry spreaders. Do not leave unused product in spreaders.

Warning
CAUSES EYE IRRITATION
CAUSES RESPIRATORY IRRITATION

Precautionary Statements

Call a poison center/physician if unwell. If skin irritation occurs, get medical advice. If in eyes, rinse cautiously with water for several minutes-remove contact lenses. If eye irritation persists, get medical advice. Wash hands after handling. Use only outdoors or in well ventilated areas. Avoid breathing dust. If inhaled, remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing. Store container tightly closed. Dispose of contents/container in accordance with national/regional/local regulations. Keep out of reach of children.

First Aid

If inhaled: Move victim to fresh air. Seek medical attention if irritation persists.
If on skin: Wash affected areas with soap and water. Seek medical attention if irritation persists. Wash contaminated clothing before reuse.
If in the eyes: Immediately flush with water for at least 20 minutes. Seek medical attention if irritation persists.
If swallowed: If victim is alert and not convulsing, give one glass of water to dilute material, but DO NOT induce vomiting. Seek immediate medical attention.

Spreaders (All settings for full rate single pass application)	Ground Speed	Width of Coverage	Spreader Settings			
			15 g/m ²	20 g/m ²	25 g/m ²	30 g/m ²
Andersons SR2000 Pro (cone 6)	5 km/hr	4.8 m	L	M	N	P
Andersons Model 2000 and Model 2000SR (cone 4)	5 km/hr	3.6 m	L	M	N 1/2	O 1/2
Vicon (03 Series)	7 km/hr	12.1 m	27	32	36	39
Lely Models WTR, WFR, HR & 1250 (pattern II-C)	7 km/hr	13.4 m	5 3/4	6 1/4	7	7 1/2
Suggested spreader settings are not intended to replace calibration. Please calibrate your spreader before applying product.						

	Manufactured by: The Andersons, Inc. P. O. Box 119 Maumee, OH 43537 U.S.A. AndersonsPro.com	<h1>25 kg/net</h1> <h1>10005496</h1>	
	The Andersons logo and NS-54 are registered trademarks of The Andersons, Inc.; PolySports is a trademark of The Andersons, Inc.		

F25