Nutri DG®
Greens - SGN 75

0 + 0 + 12 + Mg
(0 + 0 + 10 + Mg)

Mag-tec™

USA/INT — 0 + 0 + 12 + Mg

12.0% Soluble Potash (K_2O) from sulfate of potash magnesia

24.0% Magnesium (Mg)
- 18.0% from magnesium oxide
- 6.0% water soluble from sulfate of potash magnesia

12.0% Total Sulfur (S) from sulfate

Application rates: 10-20 g/m² (100-200 kg/ha)

Directions for use: Apply product to actively growing turf at 10-20 g/m². Apply to dry foliage. Immediately after application, apply a minimum of 5 mm of water to disperse particles into the root zone. Due to variations in temperature and water pH, best results are achieved by splitting the irrigation into 2 applications at 10-15 minutes apart. This will allow for more thorough particle dispersion into the root zone. Particle color may vary from lot to lot. Apply only at low rates if temperatures exceed 25°C and irrigate immediately after application. Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing. Use only clean, dry spreaders. Do not leave unused product in spreaders.

UK/EC — EC FERTILISER POTASSIC FERTILISER CONTAINING Mg 0 + 0 + 12 + Mg

12,0% Potassium oxide (K_2O) water soluble

39,8% Magnesium oxide (MgO)
9,9% Magnesium oxide (MgO) water soluble

30,0% Sulphur trioxide (SO_3) water soluble

To be used only where there is a recognised need. Do not exceed the appropriate dose rates.

Import in U.K. by: Greentech Sportsturf Ltd.
Block 5 Unit 1 - Bandeath Industrial Estate
Throsk, Stirling
Scotland FK7 7NP

Application rates: 10-20 g/m² (100-200 kg/ha)

Directions for use: Apply product to actively growing turf at 10-20 g/m². Apply to dry foliage. Immediately after application, apply a minimum of 5 mm of water to disperse particles into the root zone. Due to variations in temperature and water pH, best results are achieved by splitting the irrigation into 2 applications at 10-15 minutes apart. This will allow for more thorough particle dispersion into the root zone. Particle color may vary from lot to lot. Apply only at low rates if temperatures exceed 25°C and irrigate immediately after application. Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing. Use only clean, dry spreaders. Do not leave unused product in spreaders.

France/EC — Engrais CE Engrais potassique contenant de la magnésie 0-0-12+39.8

Composition

21.0% Oxyde de potassium (K_2O) soluble dans l'eau
39.8% Oxyde de magnesium (MgO) total
9.9% Dont oxyde de magnésium (MgO) soluble dans l'eau..
30.0% Anhydride sulfurique (SO_3) soluble dans l'eau

Contient : sulfate de magnésie et de potasse (14977-37-8), oxyde de magnésium (1309-48-4)

Importé en France par: LOB GREEN S.A.S.
21 Rue du Saint Sépulcre
62560 Saint Omer
France

Dose d'emploi
Cet engrais est destiné à la fertilisation des gazons et permet de fournir la magnésie nécessaire à un bon développement. Apporter de 100 à 200 kg/ha plusieurs fois pendant la saison de croissance du gazon. Cet engrais permet également de rééquilibrer les sols déficients en magnésie.
L'engrais sera appliqué uniformément sur toute la surface. L'humidité présente sur le feuillage ou un léger arrosage permettrons un délitement très rapide des granulés grâce à la technologie NUTRI DG (granulé dispersible).

Attention
H319 Provoque une sévère irritation des yeux
H335 Peut irriter les voies respiratoires
P261 Eviter de respirer les poussières
P264 Se laver soigneusement après manipulation
P270 Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit
P271 Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé
P280 Porter un équipement de protection des yeux et du visage.
P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
P337 + P313 Si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin.
P304 + P340 EN CAS D'INHALATION : transporter la victime à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
P501 Eliminer le contenu selon les lois et règlements en vigueur.

Deutschland

Dünger 0-0-12 (-24) High-Mg

K-Dünger 12, mit Magnesium und Schwefel, zur Düngung von Rasen

12,0% K_2O wasserlösliches Kaliumoxid

Nettogewicht: 25 kg

Inverkehrbringer:
Turf Handels GmbH, Am Hartboden 48, A-8101 Gratkorn

Nebenbestandteile:
12,0% S wasserlöslicher Schwefel
39,8% MgO Gesamt-Magnesiumoxid
10,0% MgO wasserlösliches Magnesiumoxid

Aufwandmenge: 10-20 g/m² (100-200 kg/ha)

Anwendungsempfehlung: während der Vegetationszeit und im Herbst mit 10-20g/m² auf möglichst trockene Bestände von Golfgreens oder anderen Rasenflächen ausbringen. Sofort nach der Ausbringung mindestens 5 mm Wasser versprühen, damit sich die Partikel in der Wurzelzone verteilen und auflösen. Aufgrund von Schwankungen bzgl. Temperatur und pH-Gehalt des Wassers sollte die Bewässerung zweimal in einem Abstand von 10-15 Minuten stattfinden. Auf diese Weise können sich die Partikel in der Wurzelzone gründlicher verteilen. Die Partikelfarbe kann je nach Produktcharge anders ausfallen. Bei Temperaturen über 25°C nur mit geringer Aufwandmenge streuen und sofort beregnen. Trocken und sauber lagern, Restmengen dicht und trocken verschließen. Nur saubere Streuer benutzen, keine Restmengen im Streuwagen zurücklassen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren!

Österreich

Dünger 0-0-12 (-24) High-Mg

Mineralischer Kalidünger, 0-0-12, mit Magnesium und Schwefel

12,0% K_2O wasserlösliches Kaliumoxid
39,8% MgO Gesamt-Magnesiumoxid
12,0% S wasserlöslicher Schwefel

Komponenten: Kaliumsulfat, Magnesiumsulfat, Magnesiumoxid

Nettogewicht: 25 kg

Hersteller:
Turf Handels GmbH, Am Hartboden 48, A-8101 Gratkorn

Aufwandmenge: 10-20 g/m² (100-200 kg/ha)

Anwendungsempfehlung: während der Vegetationszeit und im Herbst mit 10-20g/m² auf möglichst trockene Bestände von Golfgreens oder anderen Rasenflächen ausbringen. Sofort nach der Ausbringung mindestens 5 mm Wasser versprühen, damit sich die Partikel in der Wurzelzone verteilen und auflösen. Aufgrund von Schwankungen bzgl. Temperatur und pH-Gehalt des Wassers sollte die Bewässerung zweimal in einem Abstand von 10-15 Minuten stattfinden. Auf diese Weise können sich die Partikel in der Wurzelzone gründlicher verteilen. Die Partikelfarbe kann je nach Produktcharge anders ausfallen. Bei Temperaturen über 25°C nur mit geringer Aufwandmenge streuen und sofort beregnen. Trocken und sauber lagern, Restmengen dicht und trocken verschließen. Nur saubere Streuer benutzen, keine Restmengen im Streuwagen zurücklassen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren!

Eire/EC — EC FERTILISER POTASSIC FERTILISER CONTAINING Mg 0 + 0 + 10 + Mg

10,0% Potassium (K) water soluble

24,0% Magnesium (Mg)
6,0% Magnesium (Mg) water soluble

12,0% Sulphur (S) water soluble

To be used only where there is a recognised need. Do not exceed the appropriate dose rates.

Import in EIRE by: Greentech Sportsturf Ltd.
Block 5 Unit 1 - Bandeath Industrial Estate
Throsk, Stirling
Scotland FK7 7NP

Application rates: 10-20 g/m² (100-200 kg/ha)

Directions for use: Apply product to actively growing turf at 10-20 g/m². Apply to dry foliage. Immediately after application, apply a minimum of 5 mm of water to disperse particles into the root zone. Due to variations in temperature and water pH, best results are achieved by splitting the irrigation into 2 applications at 10-15 minutes apart. This will allow for more thorough particle dispersion into the root zone. Particle color may vary from lot to lot. Apply only at low rates if temperatures exceed 25°C and irrigate immediately after application. Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing. Use only clean, dry spreaders. Do not leave unused product in spreaders.

Italia — FERTILIZZARE CE FERTILIZZANTE POTASSICO CONTENENTE Mg 0 + 0 + 12 + Mg

12,0% Ossido di potassio (K_2O) solubile in acqua

39,8% Ossido di magnesio (MgO)
9,9% Ossido di magnesio (MgO) solubile in acqua

30,0% Anidride solforica (SO_3), solubile in acqua

Da usare solo quando vi è una necessità riconosciuta. Non superare i dosaggi appropriati.

Importato (fabbricante) da: BOTTOS s.r.l.
via Lusevera,1 – 33078 San Vito al Tagliamento (PN)

Distribuito da: EMERALD s.r.l.

Dose: 10-20 g/m² (100-200 kg/ha)

Istruzioni per l'uso: applicare il prodotto sul manto erboso per una crescita attiva a 10-20 g/m². Applicare al fogliame secco. Immediatamente dopo l'applicazione, irrigare con almeno 5 mm di acqua per consentire uno spargimento delle particelle nell'area della radice. A causa delle variazioni della temperatura e del pH dell'acqua, si ottengono i migliori risultati dividendo il processo d'irrigazione in due applicazioni da 10-15 minuti ciascuna. Questo consente un migliore spargimento delle particelle nell'area della radice. Il colore delle particelle può variare da lotto a lotto. Applicare il prodotto solo in piccole quantità se la temperatura supera i 25°C e irrigare immediatamente dopo l'applicazione. Conservare in luogo pulito e asciutto. Richiudere il sacchetto aperto piegando la parte superiore verso il basso e assicurarla. Usare solo spargitori puliti e asciutti. Non lasciare il prodotto non utilizzato nello spargitore.

Norge — EC GJØDNING KALIUMGJØDNING INNEHOLDER Mg 0 + 0 + 10 + Mg

10,0% Kalium (K) oppløselig i vann

24,0% Magnesium (Mg)
6,0% Magnesium (Mg) oppløselig i vann

12,0% Svovel (S) oppløselig i vann

Skal bare brukes når det er fastslått at der er behov for det. Riktige doser må ikke overskrides.

Distributør i Norge: Floratine Norge AS
Gullfunnet 50
1570 Dilling, NORGE

Påføringsrate: 10-20 g/m² (100-200 kg/ha)

Bruksanvisning: Påfør produktet på voksende torv med 10-20 g/m². Påfør på tørt løvverk. Umiddelbart etter påføringen, påføre et minimum av 5 mm vann for å dispergere partikler i rotzonen. På grunn av variasjoner i temperatur og pH-verdi I vann, er de beste resultater oppnådd ved å splitte vanning i 2 applikasjoner ved 10-15 minutters mellomrom. Dette vil gi rom for mer grundig partikkel spredning i rotzonen. Partikkel fargen kan variere fra parti til parti. Påfør kun med lave rater hvis temperaturen overskrider 25°C og vann øyeblikkelig etter påføring. Oppbevar på et rent, tørt sted. Tett igjen den åpnede posen ved å brette ned toppen og forvar den på et sikkert sted. Bruk bare tørre, rene spredere. Ikke la rester av produktet bli liggende i sprederen.

Denmark — EC KUNSTGØDNING KALIUM GØDNING INDEHOLDENDE Mg 0 + 0 + 10 + Mg

10,0% Kalium (K) vandopløseligt

24,0% Magnesium (Mg)
6,0% Magnesium (Mg) vandopløseligt

12,0% Svovl (S) vandopløseligt

Bør kun bruges når det er konstateret, at der er behov for det. De passende dosisrater må ikke overskrides.

Distributør i Danmark: Floratine Norge AS
Gullfunnet 50
1570 DILLING

Applikationsrater: 10-20 g/m² (100-200 kg/ha)

Brugsanvisninger: Kom produktet på aktivt voksende grønsvær ved 10-20 g/m². Påføres på tørre blade. Umiddelbart efter påføringen, påføres mindst 5 mm vand at dispergere partikler i rodzonen. På grund af variationer i temperatur og vand pH, er de bedste resultater opnået ved at opdele kunstvanding i 2 ansøgninger på 10-15 minutter fra hinanden. Dette vil give mulighed for mere grundig dispersion i rodzonen. Partikel farve kan variere fra parti til parti. Nedsæt påføringsmængden, hvis temperaturen overstiger 25 °C og overrisl umiddelbart efter påføring. Opbevares et rent, tørt sted. Forsegl den åbne pose igen ved at folde toppen ned og fastgøre den. Brug kun rene, tørre spredere. Der må ikke efterlades ubrugt produkt i en spreder.

België — EC-KUNSTMEST KALIMESTSTOF MET Mg 0 + 0 + 12 + Mg

12,0% kaliumoxide (K_2O) in water oplosbaar

39,8% mangaanoxide (MgO)
9,9% mangaanoxide (MgO) in water oplosbaar

30,0% zwaveltrioxide (SO_3) in water oplosbaar

Alleen gebruiken waar dit zichtbaar nodig is. Aanbevolen hoeveelheden niet overschrijden.

Importeur voor België: Sports Management bvba
Lorkenlaan 14
2950 Kapellen - België

Aan te brengen hoeveelheden: 10-20 g/m² (100-200 kg/ha)

Gebruiksaanwijzing: Product aanbrengen op groeiend gras. Hoeveelheid: 10-20 g/m². Op droog gras aanbrengen. Onmiddellijk na aanbrengen ten minste 5 mm inwateren om deeltjes in de wortelzone te verspreiden. In verband met variaties in de temperatuur en de pH-waarde van het water kan men de beste resultaten bereiken door de besproeiing in 2 beurten te verrichten, met een tussenpoos van 10 à 15 minuten. Dit maakt betere verspreiding van deeltjes in de wortelzone mogelijk. De kleur van de deeltjes kan van partij tot partij variëren. Bij temperaturen > 25 °C slechts in kleine hoeveelheden aanbrengen; onmiddellijk na aanbrengen bewateren. Op een schone, droge plaats bewaren. Geopende verpakking sluiten door bovenkant omlaag te vouwen en te bevestigen. Uitsluitend schone, droge strooimachines gebruiken. Restanten/niet-gebruikt product volledig uit strooimachines verwijderen.

Sverige — EG-GÖDSELMEDEL KALIGÖDSELMEDEL SOM INNEHÅLLER Mg 0 + 0 + 10 + Mg

10,0% Kalium (K) vattenlöslig

24,0% Magnesium (Mg)
6,0% Magnesium (Mg) vattenlöslig

12,0% Svavel (S) vattenlöslig

Bör kunna användas när det konstateras att det föreligger behov för dess användning. De passande dosraterna får ej överskridas.

Distributör i Sverige: Floratine Scandinavia AB
c/o Floratine Norge AS
Gullfunnet 50
1570 Dilling, NORGE

Dosering: 10-20 g/m² (100-200 kg/ha)

Bruksanvisning: Tillsätt 10-20 g/m² av produkten till aktivt växande torv. Tillsätt produkten till torra löv. Omedelbart efter appliceringen, applicera ett minimum av 5 mm vatten för att dispergera partiklar in i rotzonen. På grund av variationer i temperatur och vattnets pH, uppnås de bästa resultaten genom att dela upp bevattning i 2 applikationer vid 10-15 minuters mellanrum. Detta kommer att möjliggöra mer noggrann partikel dispersionen i rotzonen. Partikel färg kan variera från parti till parti. Tillsätt endast en liten mängd om temperatur överstiger 25°C och vattna omedelbart efter gödsling. Förvara på en ren, torr plats. Förslut öppnad förpackning genom att vika ned och fästa den övre kanten. Använd endast rena, torra gödselspridare. Lämna inte kvar oanvänd produkt i gödselspridarna.

España/CE — ABONO CE Abono Potásico con Mg 0 + 0 + 12 + Mg

12,0% de óxido de potasio (K_2O) soluble en agua

39,8% de óxido de magnesio (MgO)
9,9% de óxido de magnesio (MgO) soluble en agua

30,0% de azufre (SO_3) soluble en agua

Para ser utilizado sólo cuando haya una necesidad reconocida. No sobrepasar las dosis recomendadas.

Importador par Espana:

Tasas de aplicación: 10-20 grs/m² (100-200 Kg/ha)

Instrucciones de uso: Aplicación de productos en crecimiento activo del césped. Aplicar cuando la hoja esté seca. Inmediatamente después de la aplicación, aplique un mínimo de 5 mm de agua para dispersar las partículas en la zona de raíces. Debido a las variaciones en la temperatura y el pH del agua, los mejores resultados se consiguen dividiendo el riego en 2 aplicaciones de 10-15 minutos aparte. Esto permitirá una dispersión más completa de las partículas en la zona de las raíces. El color de las partículas puede variar de un lote a otro. Se aconseja aplicar sólo a dosis bajas si las temperatura es superior a 25°C. Regar inmediatamente después de la aplicación. Conservar el envase en un lugar limpio y seco. Una vez abierto el saco evitar que entre humedad, asegúrese de cerrar la parte superior del saco. Utilice sólo abonadoras limpias y secas. No deje el producto no utilizado en las abonadoras.

Greece - Αριθμ. Κυκλοφορίας: 31

0 + 0 + 12 + Mg

12,0% Διαλυτή Ποτάσα (K_2O) από το και θειικό κάλιο μαγνησίας

24,0% Μαγνήσιο (Mg)
- 18.0% από οξείδιο του μαγνησίου
- 6.0% υδατοδιαλυτές από θειικό κάλιο μαγνησίας

12,0% Ολικό θείο (S) από θειικό άλας

Εισαγωγή στην Ελλάδα από: Geoponikos Oikos
3 Makedonias St., Athens, GREECE

Ρυθμοί εφαρμογής: 10-20 g/m² (100-200 kg/ha)

Οδηγίες χρήσης: Εφαρμόστε το προϊόν σε γκαζόν που αναπτύσσεται ενεργά στα 10-20 g/m². Εφαρμόστε σε ξηρή φυλλωσιά. Αμέσως μετά την εφαρμογή, ποτίστε με τουλάχιστον 5 mm νερού για να διαλύσετε τα σωματίδια στη ζώνη ρίζας. Λόγω των διακυμάνσεων της θερμοκρασίας και του pH του νερού, τα καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται όταν μοιράζετε την άρδευση σε 2 εφαρμογές 10-15 λεπτών. Αυτό θα επιτρέψει την πιο καλή διασπορά σωματιδίων στη ζώνη ρίζας. Το χρώμα των σωματιδίων μπορεί να ποικίλλει από παρτίδα σε παρτίδα. Εφαρμόστε μόνο σε χαμηλούς ρυθμούς αν η θερμοκρασία υπερβαίνει τους 25°C και ποτίστε αμέσως μετά από την εφαρμογή. Αποθηκεύστε σε καθαρό, ξηρό χώρο. Να ξανα σφραγίζετε τις ανοιχτές σακούλες διπλώνοντας το πάνω μέρος προς τα κάτω και ασφαλίζοντάς το. Να χρησιμοποιείτε μόνο καθαρά, στεγνά μηχανήματα σποράς. Μην αφήνετε προϊόν στα μηχανήματα σποράς μετά τη χρήση.

Taiwan (R.O.C.) — 0 + 0 + 12 + Mg

12.0% Soluble Potash (K_2O) from sulfate of potash magnesia

24.0% Magnesium (Mg)
- 18.0% from magnesium oxide
- 6.0% water soluble from sulfate of potash magnesia

12.0% Total Sulfur (S) from sulfate

Application rates: 10-20 g/m² (100-200 kg/ha)

Directions for use: Apply product to actively growing turf at 10-20 g/m². Apply to dry foliage. Immediately after application, apply a minimum of 5 mm of water to disperse particles into the root zone. Due to variations in temperature and water pH, best results are achieved by splitting the irrigation into 2 applications at 10-15 minutes apart. This will allow for more thorough particle dispersion into the root zone. Particle color may vary from lot to lot. Apply only at low rates if temperatures exceed 25°C and irrigate immediately after application. Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing. Use only clean, dry spreaders. Do not leave unused product in spreaders.

WARNING
MAY CAUSE EYE IRRITATION
MAY CAUSE RESPIRATORY IRRITATION

Precautionary Statements
Call a poison center/physician if unwell. If skin irritation occurs, get medical advice. If in eyes, rinse cautiously with water for several minutes, remove contact lenses. If eye irritation persists, get medical advice. Wash hands after handling. Use only outdoors or in well ventilated areas. Avoid breathing dust. If inhaled, remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing. Store container tightly closed. Dispose of contents/container in accordance with national/regional/local regulations.

First Aid
If inhaled: Move victim to fresh air. Seek medical attention if irritation persists.

If on skin: Wash affected areas with soap and water. Seek medical attention if irritation persists. Wash contaminated clothing before re-use.

If in the eyes: Immediately flush with water for at least 20 minutes. Seek medical attention if irritation persists.

If swallowed: If victim is alert and not convulsing, give one glass of water to dilute material, and induce vomiting. Seek immediate medical attention.

Australia — 0 + 0 + 10 + Mg

10.0% Potassium (K) from sulfate of potash magnesia

24.0% Magnesium (Mg)
- 18.0% from magnesium oxide
- 6.0% from sulfate of potash magnesia

12.0% Sulfur (S) from sulfate

Application rates: 1.0 - 2.0 kg/100 m² (100-200 kg/ha)

Directions for use: Apply product to actively growing turf at 1.0 - 2.0 kg/100 m². Apply to dry foliage. Immediately after application, apply a minimum of 5 mm of water to disperse particles into the root zone. Due to variations in temperature and water pH, best results are achieved by splitting the irrigation into 2 applications at 10-15 minutes apart. This will allow for more thorough particle dispersion into the root zone. Particle color may vary from lot to lot. Apply only at low rates if temperatures exceed 25°C and irrigate immediately after application. Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing. Use only clean, dry spreaders. Do not leave unused product in spreaders.

New Zealand — 0 + 0 + 10 + Mg

10.0% Potassium (K) from sulfate of potash magnesia

24.0% Magnesium (Mg)
- 18.0% from magnesium oxide
- 6.0% from sulfate of potash magnesia

12.0% Sulfur (S) from sulfate

Application rates: 10-20 g/m² (100-200 kg/ha)

Directions for use: Apply product to actively growing turf at 10-20 g/m². Apply to dry foliage. Immediately after application, apply a minimum of 5 mm of water to disperse particles into the root zone. Due to variations in temperature and water pH, best results are achieved by splitting the irrigation into 2 applications at 10-15 minutes apart. This will allow for more thorough particle dispersion into the root zone. Particle color may vary from lot to lot. Apply only at low rates if temperatures exceed 25°C and irrigate immediately after application. Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing. Use only clean, dry spreaders. Do not leave unused product in spreaders.

Spreaders	Ground Speed	Width of Coverage	Spreader Settings 10 g/m²	15 g/m²	20 g/m²	
Model 2000 (cone 9); 2000 SR (cone 9) Settings for single pass application = **FULL RATE**	5 km/hr	3.0 m	I	J	K 1/2	
SSD Drop Spreader - Settings for single pass application = **FULL RATE**	5 km/hr	0.9 m	3	3 3/4	4 1/2	

Suggested spreader settings are not intended to replace calibration. Please calibrate your spreader before applying product.

The Andersons®

Manufactured by:
The Andersons, Inc.
P. O. Box 119
Maumee, OH 43537
U.S.A.
AndersonsPro.com

25 kg/net
10005266

The Andersons logo and Nutri DG are registered trademarks of The Andersons, Inc.;
Mag-tec is a trademark of The Andersons, Inc.

J24 CE