

PolySports™

SGN 240

28 + 3 + 10

(28 + 1.3 + 8.3)

50%

NS-54®

<p>USA/INT</p> <p>28 + 3 + 10</p> <p>28.0% Total Nitrogen (N) 0.64% Ammoniacal Nitrogen 27.36% Urea Nitrogen*</p> <p>3.0% Available Phosphate (P₂O₅) from ammonium phosphate</p> <p>10.0% Soluble Potash (K₂O) from potassium chloride</p> <p>1.30% Total Sulfur (S) from sulfur</p> <p>*14.00% slowly available nitrogen from polymer coated sulfur coated urea</p> <p>Application rates: 15-25 g/m² (150-250 kg/ha)</p> <p>Directions for use: Apply product to actively growing turf at 15-25 g/m². Apply to dry foliage. Water in after application with 5 to 6 mm of irrigation. If temperatures exceed 25°C or if application to damp or wet turf is unavoidable, irrigate immediately after application. Apply at low rates if temperatures exceed 25°C. Do not use on putting greens. Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing. Use only clean, dry spreaders. Do not leave unused product in spreaders.</p>	<p>UK/EC</p> <p>EC FERTILISER NK FERTILISER 28 + 0 + 10</p> <p>28.0% Total Nitrogen (N) 0.64% Ammoniacal nitrogen (N) 27.36% Ureic nitrogen (N)</p> <p>10.0% Potassium oxide (K₂O) water soluble</p> <p>Import in U.K. by: Greentech Sportsturf Ltd. Block 5 Unit 1 - Bandeath Industrial Estate Throsk, Stirling Scotland FK7 7NP</p> <p>Application Rates: 15-25 g/m² (150-250 kg/ha)</p> <p>Directions for use: Apply product to actively growing turf at 15-25 g/m². Apply to dry foliage. Water in after application with 5 to 6 mm of irrigation. If temperatures exceed 25°C or if application to damp or wet turf is unavoidable, irrigate immediately after application. Apply at low rates if temperatures exceed 25°C. Do not use on putting greens. Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing. Use only clean, dry spreaders. Do not leave unused product in spreaders.</p>	<p>Eire/EC</p> <p>EC FERTILISER NK FERTILISER 28 + 0 + 8.3</p> <p>28.0% Total nitrogen (N) 0.64% Ammoniacal nitrogen (N) 27.36% Ureic nitrogen (N)</p> <p>8.3% Potassium (K) water soluble</p> <p>Import in EIRE by: Greentech Sportsturf Ltd. Block 5 Unit 1 - Bandeath Industrial Estate Throsk, Stirling Scotland FK7 7NP</p> <p>Application rates: 15-25 g/m² (150-250 kg/ha)</p> <p>Directions for use: Apply product to actively growing turf at 15-25 g/m². Apply to dry foliage. Water in after application with 5 to 6 mm of irrigation. If temperatures exceed 25°C or if application to damp or wet turf is unavoidable, irrigate immediately after application. Apply at low rates if temperatures exceed 25°C. Do not use on putting greens. Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing. Use only clean, dry spreaders. Do not leave unused product in spreaders.</p>	<p>France/EC</p> <p>ENGRAIS EC ENGRAIS NK 28 + 0 + 10</p> <p>28,0% Azote totale (N) 0,64% Azote ammoniacal (N) 27,36% Azote uréique (N)</p> <p>10,0% Oxyde de potassium (K₂O) soluble dans l'eau</p> <p>Importé en France par: LOB GREEN S.A.S. 25 Rue de la Chapelle GOURNAY, 62560 VERCHOCQ - France</p> <p>Taux d'application : 15-25 g/m² (150-250 kg/ha)</p> <p>Mode d'emploi : Appliquer le produit sur le gazon en plaques en état de croissance active à un taux de 15-25 g/m². Appliquer sur le feuillage sec. Arroser après application avec 5 à 6 mm d'irrigation. Dans des températures supérieures à 25°C ou si l'application pour humidifier ou mouiller le gazon est inévitable, irriguer immédiatement après application. Appliquer à de faibles taux si les températures sont supérieures à 25°C. Ne pas utiliser sur les verts de rouler. Entreposer dans un endroit propre et sec. Refermer hermétiquement le sac ouvert en repliant le haut et en sécurisant. Utiliser uniquement des épanduses propres et sèches. Ne pas laisser de produit non utilisé dans les épanduses.</p>
--	--	---	---

<p>Deutschland/Österreich</p> <p>28-3-10 50%</p> <p>Deklaration nach Deutscher Düngemittelverordnung 2012: NK-Dünger mit teilweise umhülltem Stickstoff, 28 - 10</p> <p>28,0 % N Gesamtstickstoff 0,64 % N Ammoniumstickstoff 27,36 % N Carbamidstickstoff</p> <p>10,0 % K₂O wasserlösliches Kaliumoxid</p> <p>Nettomasse: 25 kg Inverkehrbringer: TURF Handels GmbH., Am Hartboden 48, A – 8101 Gratkorn</p> <p>Nebenbestandteile: 5,7 % S wasserlöslicher Schwefel Anwendungshilfsmittel: 50 % des Gesamtstickstoffes sind unter Verwendung von Schwefel umhüllt</p> <p>Hinweise zur sachgerechten Lagerung: In der Originalverpackung trocken, kühl, frostfrei lagern. Restmengen dicht und trocken verschließen. Für Kinder und Haustiere unerschickbar aufbewahren. Anwendung: Während der Hauptvegetationszeit mit 15-25 g/m² auf Fairways oder Sportrasenflächen ausbringen. Anschließend mindestens mit 5-6 mm beregnen, damit die Körner gleichmäßig in die Rasennarbe fallen. Um die Verteilung in der Rasennarbe zu optimieren nach der Düngung gleichmäßig bewässern. Bei Temperaturen über 25°C mit geringer Aufwandmenge arbeiten und anschließend sofort beregnen. - Hinweis: Empfehlungen der amtlichen Beratungen gehen vor.</p> <p>Die Umhüllung hat einen Wirkzeitraum von bis zu 8 Wochen.</p> <p>Für alle Zier- und Sportrasenflächen. Enthält auch: 3,0 % P₂O₅ neutralammonitrat- und wasserlösliches Phosphat.</p>
--

<p>España/CE</p> <p>FERTILIZANTE EC FERTILIZANTE NK 28 + 0 + 10</p> <p>28,0% Nitrógeno total (N) 0,64% Nitrógeno amoniacal (N) 27,36% Nitrógeno ureico (N)</p> <p>10,0% Óxido de potasio (K₂O) soluble en agua</p> <p>Importado en España por: CESSVER VALENCIA,S.L. Plaza Antonio Cortis, 2B, 46013 Valencia - ESPAÑA</p> <p>Dosis de aplicación: 15-25 g/m² (150-250 kg/ha)</p> <p>Instrucciones de uso: Aplique 15-25 g/m² del producto a céspedes que estén creciendo activamente. Aplique sobre el follaje seco. Riegue agua después de la aplicación, alcanzando 5 a 6 mm de irrigación. Aplique dosis más bajas si las temperaturas superan los 25°C y riegue inmediatamente después de la aplicación. Aplique dosis más bajas si las temperaturas superan los 25°C. No use en áreas putting de golf. Almacene en un sitio limpio y seco. Vuelva a cerrar la bolsa abierta, doblando la parte superior hacia abajo y sujetándola. Sólo use esparcidores limpios y secos. No deje producto sin utilizar en los esparcidores.</p>

<p>Italia</p> <p>FERTILIZZANTE EC FERTILIZZANTE NK 28 + 0 + 10</p> <p>28,0% Totale azoto (N) 0,64% Azoto ammoniacale (N) 27,36% Azoto ureico (N)</p> <p>10,0% di ossido di potassio (K₂O), solubile in acqua</p> <p>Importato (fabbricante) da: BOTTOS s.r.l. via Luservera,1 – 33078 San Vito al Tagliamento (PN)</p> <p>Distribuito da: EMERALD s.r.l.</p> <p>Tassi di applicazione: 15-25 g/m² (150-250 kg/ha)</p> <p>Indicazioni per l'uso: Applicare 15-25 g/m² di prodotto su manto erboso in crescita. Applicare su manto asciutto. Irrigare dopo l'applicazione coprendo il manto erboso con 5 mm o 6 mm di acqua. Se la temperatura eccede i 25°C applicare solo dosaggi bassi ed irrigare immediatamente dopo l'applicazione. Applicare il prodotto a basse concentrazioni se la temperatura eccede i 25°C. Non usare su putting greens in campi da golf. Conservare in luogo asciutto e pulito. Risigillare il sacchetto aperto piegando ed assicurando la parte superiore. Usare solo spargitori puliti ed asciutti. Non lasciare prodotto non usato negli spargitori.</p>

<p>Sverige</p> <p>EU GÖDSELMEDEL NK-gödselmedel med 50% låntidsverkande N 28-0-8 (28-3-10)</p> <p>28,0% Kväve (N) 0,64% ammonium-N 27,36% urea-N varav 14% från PCSCU</p> <p>8,3% Kalium (K) 10,0% kaliumoxid (K₂O)</p> <p>Baserat på ammoniumfosfat, urea, polymer- och svaveltäckt urea, liksom kaliumklorid. Bör endast användas vid behov till golf- och fotbollspaner, park- och trädgårdsområden. De rekommenderade mängderna får inte överskridas.</p> <p>Distributör i Sverige: Floratine Scandinavia AB c/o Floratine Norge AS Gullfunnet 50 1570 Dilling NORGE</p> <p>Rekommenderad mängd: 15 – 25 g/m² (150 – 250 kg/ha)</p> <p>Gödsla när gräset är i tillväxt. Vattna 4-5 minuter efter påföring, för att lösa upp gödselkornen. Använd mindre gödselmängder vid höga temperaturer (> 25°C), och vattna omedelbart för att undvika brännskador. I samband med gödsling bör endast torra och rena gödselspridare användas. Låt inte gödselmedel bli liggande kvar i spridaren. Gödslet skal lagras tørt.</p>
--

<p>Norge</p> <p>NPK-gjødsel 28 – 1 – 8 (28-3-10)</p> <p>28,0% Nitrogen (N) 0,64% ammonium-N 27,36% urea-N hvorav 14% fra PCSCU</p> <p>1,3% Fosfor (P) 3,0% fosforpentoksyd (P₂O₅)</p> <p>8,3% Kalium (K) - vannløselig 10,0% kaliumoksyd (K₂O)</p> <p>1,3% Svovel (S) - vannløselig 8,5% Klor (Cl)</p> <p>Basert på ammoniumfosfat, urea, polymer- og svoveldekket urea, samt kaliumklorid. Skal bare benyttes ved påvist behov til golf- og fotballbaner, park- og hagearealer. De anbefalte mengder må ikke overskrides.</p> <p>Distributør i Norge: Floratine Norge AS Gullfunnet 50 1570 Dilling NORGE</p> <p>Reg. nr. (Mattilsynet): 3128 Nettovekt: 25 kg Anbefalte gjødselmengder: 15 – 25 g/m² (150 – 250 kg/ha)</p> <p>En langsomt virkende NPK-gjødsel hvor 50 % av nitrogenet frigjøres langsomt via en svovel- og plastikkdekket kappe. Gjødsla tilføres når graset er i vekst, og på tørt bladverk. Det vannes 5-6 minutter etter at gjødsling er utført, for å få gjødselkornene ned i plantebestandet. Bruk mindre gjødselmengder ved høye temperaturer (> 25°C), og vær oppmerksom på å unngå sviskskader. I forbindelse med gjødsling skal det kun benyttes tørre og rene gjødselspridere. La ikke gjødsel bli liggende igjen i sprideren. Gjødsla skal lagres tørt.</p>

<p>Denmark</p> <p>EC KUNSTGØDNING NK KUNSTGØDNING 28 + 0 + 8.3</p> <p>28,0% Samlet kvælstof (N) 0,64% Ammoniumkvælstof (N) 27,36% Ureakvælstof (N)</p> <p>8,3% Kalium (K) vandopløseligt</p> <p>Importeret i Danmark af: Floratine Norge AS Gullfunnet 50 1570 DILLING</p> <p>Applikationsrater: 15-25 g/m² (150-250 kg/ha)</p> <p>Brugsanvisninger: Kom produktet på aktivt voksende grønsvær ved 15-25 g/m². Kom det på tørre græsså. Vand efter påføringen med 5 to 6 mm kunstvanding. Hvis temperaturen er over 25°C eller hvis man ikke kan undgå at komme det på fugtig eller våd grønsvær, skal man kunstvande øjeblikkeligt efter påføringen. Kom det på langsomt hvis temperaturen er over 25°C. Må ikke kommes på putting greens. Opbevares et rent, tørt sted. Forseglen den åbne pose igen ved at folde toppen ned og låstgøre den. Brug kun rene, tørre spredere. Der må ikke efterlades ubrugt produkt i en spredere.</p>

<p>België</p> <p>EC-KUNSTMEST NK-KUNSTMEST 28 + 0 + 10</p> <p>28,0% totaal stikstof (N) 0,64% ammoniakstikstof (N) 27,36% ureumstikstof (N)</p> <p>10,0% kaliumoxide (K₂O), in water oplosbaar</p> <p>Importeur voor België: Sports Management bvba Lorckenlaan 14 2950 Kapellen – België</p> <p>Aan te brengen hoeveelheden: 15-25 g/m² (150-250 kg/ha)</p> <p>Gebruiksaanwijzing: Product aanbrengen op groeiend gras. Hoeveelheid: 15-25 g/m². Op droog gras aanbrengen. Na aanbrengen gras bewateren (5 à 6 mm). Bij temperaturen > 25°C of als aanbrengen op vochtig of nat gras onvermijdelijk is, onmiddellijk na aanbrengen bewateren. Bij temperaturen > 25°C slechts in kleine hoeveelheden aanbrengen. Niet gebruiken op putting greens. Op een schone, droge plaats bewaren. Geopende verpakking sluiten door bovenkant omhoog te vouwen en te bevestigen. Uitsluitend schone, droge strooimachines gebruiken. Restanten/niet-gebruikt product volledig uit strooimachines verwijderen.</p>
--

<p>Belgique</p> <p>ENGRAIS EC ENGRAIS NK 28 + 0 + 10</p> <p>28,0% Azote totale (N) 0,64% Azote ammoniacal (N) 27,36% Azote uréique (N)</p> <p>10,0% Oxyde de potassium (K₂O) soluble dans l'eau</p> <p>Importation en Belgique par: Sports Management bvba Lorckenlaan 14 2950 Kapellen – Belgique</p> <p>Taux d'application : 15-25 g/m² (150-250 kg/ha)</p> <p>Mode d'emploi : Appliquer le produit sur le gazon en plaques en état de croissance active à un taux de 15-25 g/m². Appliquer sur le feuillage sec. Arroser après application avec 5 à 6 mm d'irrigation. Dans des températures supérieures à 25°C ou si l'application pour humidifier ou mouiller le gazon est inévitable, irriguer immédiatement après application. Appliquer à de faibles taux si les températures sont supérieures à 25°C. Ne pas utiliser sur les verts de rouler. Entreposer dans un endroit propre et sec. Refermer hermétiquement le sac ouvert en repliant le haut et en sécurisant. Utiliser uniquement des épanduses propres et sèches. Ne pas laisser de produit non utilisé dans les épanduses.</p>

<p>Greece</p> <p>28 + 3 + 10</p> <p>28,00% Ολικό Άζωτο (N) 0,64% Αμμωνιακό Άζωτο 27,36% Άζωτο από Ουρία</p> <p>3,00% Διαθέσιμα Φωσφορικά (P₂O₅)</p> <p>10,00% Διαλυτό Κάλιο (K₂O)</p> <p>1,30% Ολικό Θείο (S) 1,30% Ελεύθερο θείο(S)</p> <p>Εισαγωγή στην Ελλάδα από: Γεωρονικός Οίκος 3 Makedonias St., Athens, GREECE</p> <p>Ρυθμοί εφαρμογής: 15-25g/m² (150-250 kg/ha)</p> <p>Οδηγίες χρήσης: Εφαρμόστε το προϊόν σε γκαζόν που αναπτύσσεται ενεργά στα 15-25 g/m². Εφαρμόστε σε ζήρη φυλλωσιά. Ποτίστε μετά από την εφαρμογή με 5 έως 6 mm άρδευσης. Αν η θερμοκρασία υπερβαίνει τους 25°C ή αν είναι αδύνατον να μην κάνετε την εφαρμογή σε υγραμένο ή υγρό γκαζόν, ποτίστε αμέσως μετά την εφαρμογή. Εφαρμόστε μόνο σε χαμηλούς ρυθμούς αν η θερμοκρασία υπερβαίνει τους 25°C. Μη χρησιμοποιείτε σε γκαζόν «putting greens». Αποθηκεύστε σε καθαρό, ξηρό χώρο. Να ανα σφραγίζετε τις ανοιχτές σακούλες διπλώνοντας το πάνω μέρος προς τα κάτω και ασφαλιζοντάς τις. Να χρησιμοποιείτε μόνο καθαρά, στεγνά μηχανήματα σποράς. Μη αφήνετε προϊόν στα μηχανήματα σποράς μετά τη χρήση.</p>

<p>Taiwan (R.O.C.)</p> <p>28 + 3 + 10</p> <p>28.0% Total Nitrogen (N) 0.64% Ammoniacal Nitrogen 27.36% Urea Nitrogen*</p> <p>3.0% Available Phosphate (P₂O₅) from ammonium phosphate</p> <p>10.0% Soluble Potash (K₂O) from potassium chloride</p> <p>1.30% Total Sulfur (S) from sulfur</p> <p>*14.00% slowly available nitrogen from polymer coated sulfur coated urea</p> <p>Application rates: 15-25 g/m² (150-250 kg/ha)</p> <p>Directions for use: Apply product to actively growing turf at 15-25 g/m². Apply to dry foliage. Water in after application with 5 to 6 mm of irrigation. If temperatures exceed 25°C or if application to damp or wet turf is unavoidable, irrigate immediately after application. Apply at low rates if temperatures exceed 25°C. Do not use on putting greens. Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing. Use only clean, dry spreaders. Do not leave unused product in spreaders.</p>
--

<p>Australia</p> <p>28 + 1.3 + 8.3</p> <p>28.0% Total Nitrogen (N) 0.64% Ammoniacal Nitrogen 27.36% Urea Nitrogen</p> <p>1.3% Phosphorus (P) from ammonium phosphate</p> <p>8.3% Potassium (K) from potassium chloride</p> <p>1.3% Sulfur (S) from sulfate</p> <p>*14.00% Slowly available nitrogen from polymer coated sulfur coated urea.</p> <p>Application rates: 1.5-2.5 kg/100 m² (150-250 kg/ha)</p> <p>Directions for use: Apply product to actively growing turf at 1.5-2.5 kg/100 m². Apply to dry foliage. Water in after application with 5 to 6 mm of irrigation. If temperatures exceed 25°C or if application to damp or wet turf is unavoidable, irrigate immediately after application. Apply at low rates if temperatures exceed 25°C. Do not use on putting greens. Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing. Use only clean, dry spreaders. Do not leave unused product in spreaders.</p>
--

<p>New Zealand</p> <p>28 + 1.3 + 8.3</p> <p>28.0% Total Nitrogen (N) 0.64% Ammoniacal Nitrogen 27.36% Urea Nitrogen</p> <p>1.3% Phosphorus (P) from ammonium phosphate</p> <p>8.3% Potassium (K) from potassium chloride</p> <p>1.3% Sulfur (S) from sulfate</p> <p>*14.00% Slowly available nitrogen from polymer coated sulfur coated urea.</p> <p>Application rates: 15-25 g/m² (150-250 kg/ha)</p> <p>Directions for use: Apply product to actively growing turf at 15-25 g/m². Apply to dry foliage. Water in after application with 5 to 6 mm of irrigation. If temperatures exceed 25°C or if application to damp or wet turf is unavoidable, irrigate immediately after application. Apply at low rates if temperatures exceed 25°C. Do not use on putting greens. Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing. Use only clean, dry spreaders. Do not leave unused product in spreaders.</p>
--

 <p>Spreaders</p>	<p>Ground Speed</p>	<p>Width of Coverage</p>	<p>Spreader Settings</p>			
<p>Model 2000 & 2000 SR (cone 4) Settings for single pass application = FULL RATE</p>	<p>5 km/hr</p>	<p>3.6 m</p>	<p>15 g/m²</p>	<p>20 g/m²</p>	<p>25 g/m²</p>	
<p>Lely Models WTR, WFR, HR & 1250 (pattern II-C) Settings for single pass application = FULL RATE</p>	<p>7 km/hr</p>	<p>12.2 m</p>	<p>5 1/2</p>	<p>6</p>	<p>6 1/2</p>	
<p>Vicon (03 Series) Settings for single pass application = FULL RATE</p>	<p>7 km/hr</p>	<p>9.7 m</p>	<p>30</p>	<p>33</p>	<p>36</p>	
<p>Suggested spreader settings are not intended to replace calibration. Please calibrate your spreader before applying product.</p>						

	<p>Manufactured by: The Andersons, Inc. P. O. Box 119 Maumee, OH 43537 U.S.A. AndersonsPro.com</p>	<h1>25 kg/net</h1> <h1>10005517</h1> <p>125 </p>
---	--	---

The Andersons logo and NS-54 are registered trademarks of The Andersons, Inc.; PolySports is a trademark of The Andersons, Inc.