

PolySports™

SGN 240

32 + 3 + 10 + Fe

(32 + 1.3 + 8.3 + Fe)

30%

NS-54®

USA/INT	32 + 3 + 10 + Fe
32.0%	Total Nitrogen (N) 0.64% Ammoniacal Nitrogen 31.36% Urea Nitrogen*
3.0%	Available Phosphate (P ₂ O ₅) from ammonium phosphate
10.0%	Soluble Potash (K ₂ O) from potassium chloride
0.89%	Total Sulfur (S) from sulfur
2.00%	Iron (Fe) from ferric oxide

*9.60% Slowly available nitrogen from polymer coated sulfur coated urea.

Application rates: 15-20 g/m² (150-200 kg/ha)

Directions for use: Apply product to actively growing turf at 15-20 g/m². Apply to dry foliage. Water in after application with 5 to 6 mm of irrigation. If temperatures exceed 25°C or if application to damp or wet turf is unavoidable, irrigate immediately after application. Apply at low rates if temperatures exceed 25°C. Do not use on putting greens. This product contains iron which may stain concrete and other surfaces. Remove particles promptly by sweeping or blowing to avoid staining. DO NOT WASH OFF WITH WATER. Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing. Use only clean, dry spreaders. Do not leave unused product in spreaders.

Deutschland/Österreich	EC-DÜNGER NK DÜNGER 32 + 0 + 10 + Fe
32,0 % N	Gesamtstickstoff 0,6 % N Ammoniumstickstoff 31,4 % N Harnstoffstickstoff
10,0 % K ₂ O	wasserlösliches Kaliumoxid
2,0% Fe	Eisen

Nettogewicht: 20 kg

Hersteller:
Turf Handels GmbH, Am Hartboden 48, A-8101 Gratkorn

Aufwandmenge: 15-20 g/m² (150-200 kg/ha)

Anwendungsempfehlung: Das Produkt mit einer Streueinstellung von 15-20 g/m² auf einem aktiv wachsenden, trockenen Rasen ausstreuen. Nach dem Ausstreuen mit 5 bis 6 mm Wasser bewässern. Bei Temperaturen von über 25 °C nur in geringen Mengen auftragen und sofort nach dem Ausstreuen bewässern. Nicht auf Übungsgrün verwenden. Das Produkt enthält Eisen, das auf gepflasterten Oberflächen im Zusammenhang mit Wasser Flecken verursachen kann. Ein einem sauberen, trockenen Ort lagern. Den geöffneten Beutel durch Umklappen der Oberkante und Sichern verschließen. Nur saubere, trockene Streuer verwenden. Kein unverbrauchtes Produkt im Streuer lassen.

Norge	EC KUNSTGJØDSEL NK KUNSTGJØDSEL 32 + 0 + 8.3 + Fe
32,0%	Samlet nitrogen (N) 0,6% ammoniakalsk nitrogen (N) 31,4% urea-nitrogen (N)
8,3%	Kalium (K) vannoppløselig
2,0%	Jern (Fe)

Skal bare brukes når det er fastslått at der er behov for det. Riktige doser må ikke overskrides.

Distributør i Norge: Floratine Norge AS
Gullfunnet 50
1570 DILLING

Applikasjonsrate: 15-20 g/m² (150-200 kg/ha)

Bruksanvisning: Anvend produktet på aktivt voksende gress i forholdet 15 til 20 g/m². Brukes på tørre gressstrå. Gresset vannes etter påføring - 5 til 6 mm med kunstig vanning. Hvis temperaturen er over 25°C, eller hvis man ikke kan unngå å anvende produktet på fuktig eller vått gress, skal man vanne like etter påføring. Anvend produktet langsomt hvis temperaturen er over 25°C. Må ikke brukes på putting greens. Dette produktet inneholder jern som kan sette flekker på betong og andre overflater. Fjern partikler omgående ved å feie eller blåse for å unngå flekker. MÅ IKKE VASKES AV MED VANN. Oppbevares på et rent, tørt sted. Den åpne posen foreslages igjen ved å folde toppen ned og sikre den. Brug kun rene, tørre spreder. Det må ikke la ubrukt produkt bli liggende igjen i en spreder.

Greece	32 + 3 + 10 + Fe
32,0%	Ολικό άζωτο (N) 0,64% Αμμωνιακό άζωτο 31,36% Άζωτο ουρίας*
3,0%	Διαθέσιμα φωσφορούχα (P ₂ O ₅) από φωσφορικό αμμώνιο
10,0%	Διαλυτή Πότσα (K ₂ O) από χλωριούχο κάλιο
0,89%	Ολικό θείο (S) από θείο
2,0%	Σίδηρος (Fe) από οξείδιο σιδήρου

* 9,60% διαθέσιμο βραδέως άζωτο από πολυμερές επικάλυψη ουρίας επιχρισμένη με θείο

Εισαγωγή στην Ελλάδα από: Georponikos Oikos
3 Makedonias St., Athens, GREECE

Ρυθμοί εφαρμογής 15-20 g/m² (150-200 kg/ha)

Οδηγίες χρήσης: Εφαρμόστε το προϊόν σε γκαζόν που αναπτύσσεται ενεργά στα 15-20 g/m². Εφαρμόστε σε ξηρή φυλλωσιά. Ποτίστε μετά από την εφαρμογή με 5 έως 6 mm άρδευσης. Αν η θερμοκρασία υπερβαίνει τους 25°C ή αν είναι αδύνατον να μην κάνετε την εφαρμογή σε υγραμένο ή υγρό γκαζόν, ποτίστε αμέσως μετά την εφαρμογή. Εφαρμόστε με αργό ρυθμό, εάν οι θερμοκρασίες ξεπερνούν τους 25°C. Μην χρησιμοποιείτε σε γκαζόν «putting greens». Το προϊόν αυτό περιέχει σίδηρο που μπορεί να προκαλέσει λεκέδες σε ταμάντο και άλλες επιφάνειες. Καθαρίστε τα σματτιάδια αμέσως με σκούπισμα ή φύσημα για να αποφύγετε το λεκάσμα. ΜΗΝ ΞΕΠΛΑΝΕΤΕ ΜΕ ΝΕΡΟ. Αποθηκεύστε σε καθαρό, ξηρό χώρο. Να ζανα σφραγίζετε τις ανοιχτές σακούλες διπλώνοντας το πάνω μέρος προς τα κάτω και ασφαλιζόντάς το. Να χρησιμοποιείτε μόνο καθαρά, στεγνά μηχανήματα σποράς. Μην αφήνετε προϊόν στα μηχανήματα σποράς μετά τη χρήση.

Australia	32 + 1.3 + 8.3 + Fe
32.0%	Total Nitrogen (N) 0.6% Ammoniacal Nitrogen 31.4% Urea Nitrogen
1.3%	Phosphorus (P) from ammonium phosphate
8.3%	Potassium (K) from potassium chloride
0.9%	Sulfur (S) from sulfate
2.0%	Iron (Fe) from ferric oxide

*9.60% Slowly available nitrogen from polymer coated sulfur coated urea.

Application rates: 1.5-2.0 kg/100 m² (150-200 kg/ha)

Directions for use: Apply product to actively growing turf at 1.5-2.0 kg/100 m². Apply to dry foliage. Water in after application with 5 to 6 mm of irrigation. If temperatures exceed 25°C or if application to damp or wet turf is unavoidable, irrigate immediately after application. Apply at low rates if temperatures exceed 25°C. Do not use on putting greens. This product contains iron which may stain concrete and other surfaces. Remove particles promptly by sweeping or blowing to avoid staining. DO NOT WASH OFF WITH WATER. Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing. Use only clean, dry spreaders. Do not leave unused product in spreaders.

UK/EC	EC FERTILISER NK FERTILISER 32 + 0 + 10 + Fe
32.0%	Total Nitrogen (N) 0.6% Ammoniacal nitrogen (N) 31.4% Ureic nitrogen (N)
10.0%	Potassium oxide (K ₂ O) water soluble
2.2%	Sulphur trioxide (SO ₃) water soluble
2.0%	Iron (Fe)

To be used only where there is a recognised need. Do not exceed the appropriate dose rates.

Import in U.K. by: Greentech Sportsturf Ltd.
Block 5 Unit 1 - Bandeath Industrial Estate
Throsk, Stirling
Scotland FK7 7NP

Application Rates: 15-20 g/m² (150-200 kg/ha)

Directions for use: Apply product to actively growing turf at 15-20 g/m². Apply to dry foliage. Water in after application with 5 to 6 mm of irrigation. If temperatures exceed 25°C or if application to damp or wet turf is unavoidable, irrigate immediately after application. Apply at low rates if temperatures exceed 25°C. Do not use on putting greens. This product contains iron which may stain concrete and other surfaces. Remove particles promptly by sweeping or blowing to avoid staining. DO NOT WASH OFF WITH WATER. Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing. Use only clean, dry spreaders. Do not leave unused product in spreaders.

España/CE	FERTILIZANTE EC FERTILIZANTE NK 32 + 0 + 10 + Fe
32,0%	Nitrógeno total (N) 0,6% Nitrógeno amoniacal (N) 31,4% Nitrógeno ureico (N)
10,0%	Óxido de potasio (K ₂ O) soluble en agua
2,2%	Trióxido de azufre (SO ₃) soluble en agua
2,0%	Hierro (Fe)

Sólo debe utilizarse cuando hay una necesidad reconocida. No exceder las dosis adecuadas.

Importado en España por :

Dosis de aplicación: 15-20 g/m² (150-200 kg/ha)

Instrucciones de uso: Aplicación de productos en crecimiento activo del césped. Aplicar cuando la hoja está seca. Regar después de la aplicación con 5 a 6 mm de agua de riego. Se aconseja aplicar sólo a dosis bajas si las temperatura es superior a 25°C. Regar inmediatamente después de la aplicación. Este producto contiene hierro que puede manchar zonas aplicadas u otras superficies. Eliminar las partículas sobrantes barriendo o soplando (máquinas sopladoras) para evitar manchas. NO SE LAVA CON AGUA. Conservar el envase en un lugar limpio y seco. Una vez abierto el saco evitar que entre humedad, asegurarse de cerrar la parte superior del saco. Utilice sólo abonadoras limpias y secas. No deje de producto no utilizado en las abonadoras.

Denmark	EC KUNSTGØDNING NK KUNSTGØDNING 32 + 0 + 8.3 + Fe
32,0%	Samlet kvælstof (N) 0,6% ammoniumkvælstof (N) 31,4% Ureakvælstof (N)
8,3%	Kalium (K) vandoploselig
2,0%	Jern (Fe)

Bor kun bruges når det er konstateret, at der er behov for det. De passende dosisrater må ikke overskrides.

Importeres i Danmark af: Floratine Norge AS
Gullfunnet 50
1570 DILLING

Applikationsrater: 15-20 g/m² (150-200 kg/ha)

Bruksanvisninger: Kom produktet på aktivt voksende grønsvær ved 15-20 g/m². Kom det på tørre græsstrå. Vand efter påføringen med 5 to 6 mm kunstvanding. Hvis temperaturen er over 25°C eller hvis man ikke kan undgå at komme det på fugtig eller våd grønsvær, skal man kunstvande øjeblikkeligt efter påføringen. Kom det på langsomt hvis temperaturen er over 25°C. Må ikke kommes på putting greens. Dette produkt indeholder jern, som kan plette beton og andre overflader. Fjern partikler med det samme ved at feje eller blæser for at undgå pletter. MÅ IKKE VASKES AF MED VAND. Opbevares et rent, tørt sted. Forseg den åbne pose igen ved at folde toppen ned og fastgøre den. Brug kun rene, tørre spreder. Der må ikke efterlades ubrukt produkt i en spreder.

Taiwan (R.O.C.)	32 + 3 + 10 + Fe
32.0%	Total Nitrogen (N) 0.64% Ammoniacal Nitrogen 31.36% Urea Nitrogen*
3.0%	Available Phosphate (P ₂ O ₅) from ammonium phosphate
10.0%	Soluble Potash (K ₂ O) from potassium chloride
0.89%	Total Sulfur (S) from sulfur
2.00%	Iron (Fe) from ferric oxide

*9.60% Slowly available nitrogen from polymer coated sulfur coated urea.

Application rates: 15-20 g/m² (150-200 kg/ha)

Directions for use: Apply product to actively growing turf at 15-20 g/m². Apply to dry foliage. Water in after application with 5 to 6 mm of irrigation. If temperatures exceed 25°C or if application to damp or wet turf is unavoidable, irrigate immediately after application. Apply at low rates if temperatures exceed 25°C. Do not use on putting greens. This product contains iron which may stain concrete and other surfaces. Remove particles promptly by sweeping or blowing to avoid staining. DO NOT WASH OFF WITH WATER. Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing. Use only clean, dry spreaders. Do not leave unused product in spreaders.

New Zealand	32 + 1.3 + 8.3 + Fe
32.0%	Total Nitrogen (N) 0.6% Ammoniacal Nitrogen 31.4% Urea Nitrogen
1.3%	Phosphorus (P) from ammonium phosphate
8.3%	Potassium (K) from potassium chloride
0.9%	Sulfur (S) from sulfate
2.0%	Iron (Fe) from ferric oxide

*9.60% Slowly available nitrogen from polymer coated sulfur coated urea.

Application rates: 15-20 g/m² (150-200 kg/ha)

Directions for use: Apply product to actively growing turf at 15-20 g/m². Apply to dry foliage. Water in after application with 5 to 6 mm of irrigation. If temperatures exceed 25°C or if application to damp or wet turf is unavoidable, irrigate immediately after application. Apply at low rates if temperatures exceed 25°C. Do not use on putting greens. This product contains iron which may stain concrete and other surfaces. Remove particles promptly by sweeping or blowing to avoid staining. DO NOT WASH OFF WITH WATER. Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing. Use only clean, dry spreaders. Do not leave unused product in spreaders.

Eire/EC	EC FERTILISER NK FERTILISER 32 + 0 + 8.3 + Fe
32.0%	Total nitrogen (N) 0.6% Ammoniacal nitrogen (N) 31.4% Ureic nitrogen (N)
8.3%	Potassium (K) water soluble
2.0%	Iron (Fe)

To be used only where there is a recognised need. Do not exceed the appropriate dose rates.

Import in EIRE by: Greentech Sportsturf Ltd.
Block 5 Unit 1 - Bandeath Industrial Estate
Throsk, Stirling
Scotland FK7 7NP

Application rates: 15-20 g/m² (150-200 kg/ha)

Directions for use: Apply product to actively growing turf at 15-20 g/m². Apply to dry foliage. Water in after application with 5 to 6 mm of irrigation. If temperatures exceed 25°C or if application to damp or wet turf is unavoidable, irrigate immediately after application. Apply at low rates if temperatures exceed 25°C. Do not use on putting greens. This product contains iron which may stain concrete and other surfaces. Remove particles promptly by sweeping or blowing to avoid staining. DO NOT WASH OFF WITH WATER. Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing. Use only clean, dry spreaders. Do not leave unused product in spreaders.

Italia	FERTILIZZANTE EC FERTILIZZANTE NK 32 + 0 + 10 + Fe
32,0%	Totale azoto (N) 0,6% Azoto ammoniacale (N) 31,4% Azoto ureico (N)
10,0%	Ossido di potassio (K ₂ O), solubile in acqua
2,2%	Triossido di zolfo (SO ₃), solubile in acqua
2,0%	Ferro (Fe)

Da usare solo quando vi è un bisogno riconosciuto. Non superare i dosaggi appropriati.

Importato (fabbricante) da: BOTTOS s.r.l.
via Lusevera,1 – 33078 San Vito al Tagliamento (PN)

Distribuito da: EMERALD s.r.l.

Tassi di applicazione: 15-20 g/m² (150-200 kg/ha)

Istruzioni per l'uso: Applicare 15-20 g/m² di prodotto su manto erboso in crescita. Applicare su anto asciutto. Irrigare dopo l'applicazione coprendo il manto erboso con 5 mm o 6 mm di acqua. Se la temperatura eccede i 25°C applicare solo dosaggi bassi ed irrigare immediatamente dopo l'applicazione. Applicare il prodotto a basse concentrazioni se la temperatura eccede i 25°C. Non usare su putting greens in campi da golf. Il presente prodotto contiene ferro, che potrebbe macchiare superfici in cemento o altri materiali. Per evitare che il prodotto macchi, rimuovere le particelle immediatamente o usando una scopa o un soffiatore. NON PULIRE USANDO ACQUA. Conservare in luogo asciutto e pulito. Risigliare il sacchetto aperto piegando ed assicurando la parte superiore. Usare solo spargitori puliti ed asciutti. Non lasciare prodotto non usato negli spargitori.

België	EC-KUNSTMEST NK-KUNSTMEST 32 + 0 + 10 + Fe
32,0%	totaal stikstof (N) 0,6% ammoniakstikstof (N) 31,4% ureumstikstof (N)
10,0%	kaliumoxide (K ₂ O), in water oplosbaar
2,2%	zwaveltioxide (SO ₃), in water oplosbaar
2,0%	ijzer (Fe)

Alleen gebruiken waar dit zichtbaar nodig is. Aanbevolen hoeveelheden niet overschrijden.

Importeur voor België: Sports Management bvba
Lorkenlaan 14
2950 Kapellen – België

Aan te brengen hoeveelheden: 15-20 g/m² (150-200 kg/ha)

Gebbruksaanwijzing: Product aanbrengen op groeiend gras. Hoeveelheid: 15-20 g/m². Op droog gras aanbrengen. Na aanbrengen gras bewateren (5 à 6 mm). Bij temperaturen > 25 °C of als aanbrengen op vochtig of nat gras onvermijdelijk is, onmiddellijk na aanbrengen bewateren. Bij temperaturen > 25 °C slechts in kleine hoeveelheden aanbrengen. Niet gebruiken op putting greens. Dit product bevat ijzer, wat op beton en andere oppervlakken roestvlekken kan veroorzaken. Gemorst deeltjes onmiddellijk opvegen of wegblazen om vlekken te voorkomen. NIET MET WATER AFSPOLEN. Op een schone, droge plaats bewaren. Geopende verpakking sluiten door bovenkant omlaag te vouwen en te bevestigen. Uitsluitend schone, droge stroommachines gebruiken. Restanten/niet-gebruikt product volledig uit stroommachines verwijderen.

France/EC	ENGRAIS EC ENGRAIS NK 32 + 0 + 10 + Fe
32,0%	Azote totale (N) 0,6% Azote ammoniacal (N) 31,4% Azote uréique (N)
10,0%	Oxyde de potassium (K ₂ O) soluble dans l'eau
2,0%	Trioxyde de soufre (SO ₃) soluble dans l'eau
2,0%	Fer (Fe)

À utiliser uniquement en cas de besoin reconnu. Ne pas excéder les taux de dosage appropriés.

Importé en France par: LOB GREEN S.A.S.
25 Rue de la Chapelle
GOURNAY, 62560 VERCHOCQ - France

Taux d'application : 15-20 g/m² (150-200 kg/ha)

Mode d'emploi : Appliquer le produit sur le gazon en plaques en état de croissance active à un taux de 15-20 g/m². Appliquer sur le feuillage sec. Arroser après application avec 5 à 6 mm d'irrigation. Dans des températures supérieures à 25 °C ou si l'application pour humidifier ou mouiller le gazon est inévitable, irriguer immédiatement après application. Appliquer à de faibles taux si les températures sont supérieures à 25°C. Ne pas utiliser sur les verts de rouler. Ce produit contient du fer, susceptible de tacher le béton et d'autres surfaces. Éliminer rapidement les particules en balayant ou en soufflant pour éviter toute tache. NE PAS LAVER À L'EAU. Entroposer dans un endroit propre et sec. Refermer hermétiquement le sac ouvert en repliant le haut et en sécurisant. Utiliser uniquement des épanduses propres et sèches. Ne pas laisser de produit non utilisé dans les épanduses.

Sverige	EC KONSTGÖDSELMEDEL NK KONSTGÖDSELMEDEL 32 + 0 + 8,3 + Fe
32,0 %	Totalt kväve (N) 0,6 % Ammoniakkväve (N) 31,4 % Ureakväve (N)
8,3 %	Kalium (K) vattenlösligt
2,0 %	Järn (Fe)

Bör kunna användas när det konstaterats att det föreligger behov för dess användning. De passande dosraterna får ej överskridas.

Importeras i Sverige av:

Applikationsrater: 15-20 g/m² (150-200 kg/ha)

Bruksanvisningar: Produkten ska påföras i aktivt växande gräsjord med en dos av 15-20 g/m². Produkten ska påföras torr lösning. Bevattning ska ske med 5-6 mm efter påförandet. Om temperaturen är högre än 25°C eller om det inte går att tillföra produkten på fuktig eller våt mark, ska bevattning ske genast efter tillförandet. Tillsätt i låga doser ifall temperaturen överskrider 25°C. Får ej användas på green avsedd för putting. Denna produkt innehåller järn som kan fläcka ner betong och andra ytor. Avlägsna genast partiklar genom att sopa eller blåsa undan sådant som kan leda till missfärgning. FÅR EJ AVTÄTTAS MED VATTEN. Förvara produkten rent och tørt. Återförslut en öppnad påse genom att vika ned och stänga påsens ovantparti. Använd endast rena och torra spridare. Oanvänd produkt får ej lämnas kvar i spridare.

Belgique	ENGRAIS EC ENGRAIS NK 32 + 0 + 10 + Fe
32,0%	Azote totale (N) 0,6% Azote ammoniacal (N) 31,4% Azote uréique (N)
10,0%	Oxyde de potassium (K ₂ O) soluble dans l'eau
2,0%	Trioxyde de soufre (SO ₃) soluble dans l'eau
2,0%	Fer (Fe)

À utiliser uniquement en cas de besoin reconnu. Ne pas excéder les taux de dosage appropriés.

Importé en Belgique par: Sports Management bvba
Lorkenlaan 14
2950 Kapellen – Belgique

Taux d'application : 15-20 g/m² (150-200 kg/ha)

Mode d'emploi : Appliquer le produit sur le gazon en plaques en état de croissance active à un taux de 15-20 g/m². Appliquer sur le feuillage sec. Arroser après application avec 5 à 6 mm d'irrigation. Dans des températures supérieures à 25°C ou si l'application pour humidifier ou mouiller le gazon est inévitable, irriguer immédiatement après application. Appliquer à de faibles taux si les températures sont supérieures à 25°C. Ne pas utiliser sur les verts de rouler. Ce produit contient du fer, susceptible de tacher le béton et d'autres surfaces. Éliminer rapidement les particules en balayant ou en soufflant pour éviter toute tache. NE PAS LAVER À L'EAU. Entroposer dans un endroit propre et sec. Refermer hermétiquement le sac ouvert en repliant le haut et en sécurisant. Utiliser uniquement des épanduses propres et sèches. Ne pas laisser de produit non utilisé dans les épanduses.

 Spreaders 	Ground Speed	Width of Coverage	Spreader Settings		
			15 g/m²	20 g/m²	
Model 2000 & 2000 SR (cone 4) Settings for single pass application = FULL RATE	5 km/hr	3.7 m	K 1/2	L 1/2	
Lely Models WTR, WFR, HR & 1250 (pattern II-C) Settings for single pass application = FULL RATE	7 km/hr	12.2 m	5 1/2	6	
Vicon (03 Series) Settings for single pass application = FULL RATE	7 km/hr	9.7 m	30	33	
Suggested spreader settings are not intended to replace calibration. Please calibrate your spreader before applying product.					



The Andersons logo and NS-54 are registered trademarks of The Andersons, Inc.; PolySports is a trademark of The Andersons, Inc.

Manufactured by:
The Andersons, Inc.
P. O. Box 119
Maumee, OH 43537
U.S.A.
AndersonsPro.com

25 kg/net

10005524

125 