

PolySports™

SGN 240

18 + 24 + 12

(18 + 10.5 + 10)

48%

NS-54™

USA/INT	18 + 24 + 12
18.0% Total Nitrogen (N) 5.08% Ammoniacal Nitrogen 12.92% Urea Nitrogen	
24.0% Available Phosphate (P ₂ O ₅) from ammonium phosphate	
12.0% Soluble Potash (K ₂ O) from potassium sulfate	
4.88% Total Sulfur (S) from sulfur	
*8.61 slowly available nitrogen from polymer coated sulfur coated urea	
Application rates: 15-30 g/m² (150-300 kg/ha)	
Directions for use: Apply product to actively growing turf at 15-30 g/m ² . Apply to dry foliage. Water in after application with 5 to 6 mm of irrigation. If temperatures exceed 25°C or if application to damp or wet turf is unavoidable, irrigate immediately after application. Apply at low rates if temperatures exceed 25°C. Do not use on putting greens. Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing. Use only clean, dry spreaders. Do not leave unused product in spreaders.	

UK/EC	EC FERTILISER NPK FERTILISER 18 + 24 + 12
18.0% Total Nitrogen (N) 5.08% Ammoniacal nitrogen (N) 12.92% Ureic nitrogen (N)	
24.0% Phosphorous Pentoxide (P ₂ O ₅) water soluble	
12.0% Potassium oxide (K ₂ O) water soluble	
12.2% Sulphur trioxide (SO ₃) water soluble	
Import in U.K. by: Greentech Sportsturf Ltd. Block 5 Unit 1 - Bandeath Industrial Estate Throsk, Stirling Scotland FK7 7NP	
Application Rates: 15-30 g/m² (150-300 kg/ha)	
Directions for use: Apply product to actively growing turf at 15-30 g/m ² . Apply to dry foliage. Water in after application with 5 to 6 mm of irrigation. If temperatures exceed 25°C or if application to damp or wet turf is unavoidable, irrigate immediately after application. Apply at low rates if temperatures exceed 25°C. Do not use on putting greens. Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing. Use only clean, dry spreaders. Do not leave unused product in spreaders.	

Eire/EC	EC FERTILISER NPK FERTILISER 18 + 10.5 + 10
18.0% Total Nitrogen (N) 5.08% Ammoniacal nitrogen (N) 12.92% Ureic nitrogen (N)	
10.5% Phosphorous (P) water soluble	
10.0% Potassium (K) water soluble	
4.9% Sulphur (S) water soluble	
Import in EIRE by: Greentech Sportsturf Ltd. Block 5 Unit 1 - Bandeath Industrial Estate Throsk, Stirling Scotland FK7 7NP	
Application rates: 15-30 g/m² (150-300 kg/ha)	
Directions for use: Apply product to actively growing turf at 15-30 g/m ² . Apply to dry foliage. Water in after application with 5 to 6 mm of irrigation. If temperatures exceed 25°C or if application to damp or wet turf is unavoidable, irrigate immediately after application. Apply at low rates if temperatures exceed 25°C. Do not use on putting greens. Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing. Use only clean, dry spreaders. Do not leave unused product in spreaders.	

France/EC	ENGRAIS EC ENGRAIS NPK 18 + 24 + 12
18,0% Azote totale (N) 5,08% Azote ammoniacal (N) 12,92% Azote uréique (N)	
24,0% Anhydride phosphorique (P ₂ O ₅) soluble dans l'eau	
12,0% Oxyde de potassium (K ₂ O) soluble dans l'eau	
12,2% Trioxyde de soufre (SO ₃) soluble dans l'eau	
Faible teneur en chlorure. À utiliser uniquement en cas de besoin reconnu. Ne pas excéder les taux de dosage appropriés.	
Importé en France par: LOB GREEN S.A.S. 25 Rue de la Chapelle GOURNAY, 62560 VERCHOCQ - France	
Taux d'application : 15-30 g/m² (150-300 kg/ha)	
Mode d'emploi : Appliquer le produit sur le gazon en plaques en état de croissance active à un taux de 15-30 g/m ² . Appliquer sur le feuillage sec. Arroser après application avec 5 à 6 mm d'irrigation. Dans des températures supérieures à 25°C ou si l'application pour humidifier ou mouiller le gazon est inévitable, irriguer immédiatement après application. Appliquer à de faibles taux si les températures sont supérieures à 25°C. Ne pas utiliser sur les verts de rouler. Entreposer dans un endroit propre et sec. Refermer hermétiquement le sac ouvert en repliant le haut et en sécurisant. Utiliser uniquement des épandeuuses propres et sèches. Ne pas laisser de produit non utilisé dans les épandeuuses.	

Deutschland/Österreich	EG-DÜNGEMITTEL NPK-Dünger, 18-24-12 Mischdünger
18,0 % N Gesamtstickstoff 5,08 % N Ammoniumstickstoff 12,92 % N Carbamidstickstoff	
24,0% P ₂ O ₅ neutralammonitrat- und wasserlösliches Phosphat 21,6% P ₂ O ₅ wasserlösliches Phosphat	
12,0 % K ₂ O wasserlösliches Kaliumoxid	
Nettogewicht: 20 kg	
Hersteller: Turf Handels GmbH, Am Hartboden 48, A-8101 Gratkorn	
Aufwandmenge: 15-30 g/m² (150-300 kg/ha)	
Anwendungsempfehlung: Starterdünger für Neuneisaaten und Nachsaaten oder auf P-Mangelstandorten von Fairways oder Sportrasenflächen. Nicht auf Greens einsetzen. Anschließend mindestens mit 5-6 mm beregnen, damit die Körner gleichmäßig in die Rasennarbe fallen. Der Einsatz kann während der gesamten Vegetationsperiode mit 15-30 g/m ² erfolgen. Um die Verteilung in der Rasennarbe zu optimieren nach der Düngung gleichmäßig bewässern. Bei Temperaturen über 25°C mit geringer Aufwandmenge arbeiten und anschließend sofort beregnen. Sauber und trocken lagern. Restmengen dicht und trocken verschließen. Nur saubere Streuer benutzen, keine Restmengen im Streuwagen zurücklassen.	

España/CE	FERTILIZANTE EC FERTILIZANTE NPK 18 + 24 + 12
18,0% Nitrógeno total (N) 5,08% Nitrógeno amoniacal (N) 12,92% Nitrógeno ureico (N)	
24,0% Pentóxido de difósforo (P ₂ O ₅) soluble en agua	
12,0% Óxido de potasio (K ₂ O) soluble en agua	
12,2% Trióxido de azufre (SO ₃) soluble en agua	
Bajo en cloruro. Sólo debe utilizarse cuando hay una necesidad reconocida. No exceder las dosis adecuadas.	
Importado en España por :	
Dosis de aplicación: 15-30 g/m² (150-300 kg/ha)	
Instrucciones de uso: aplique 15-30 g/m ² del producto a céspedes que estén creciendo activamente. Aplique sobre el foliaje seco. Riegue agua después de la aplicación, alcanzando 5 a 6 mm de irrigación. Aplique dosis más bajas si las temperaturas superan los 25°C y riegue inmediatamente después de la aplicación. Aplique dosis más bajas si las temperaturas superan los 25°C. No use en áreas putting de golf. Almacene en un sitio limpio y seco. Vuelva a cerrar la bolsa abierta, doblando la parte superior hacia abajo y sujetándola. Sólo use espaciadores limpios y secos. No deje producto sin utilizar en los espaciadores.	

Italia	FERTILIZZANTE EC FERTILIZZANTE NPK 18 + 24 + 12
18,0% Totale azoto (N) 5,08% Azoto ammoniacale (N) 12,92% Azoto ureico (N)	
24,0% Anidride fosforica (P ₂ O ₅) solubile in citrato ammonico neutro e in acqua	
22,6% Anidride fosforica (P ₂ O ₅) solubile in acqua	
12,0% Ossido di potassio (K ₂ O) solubile in acqua	
12,2% Anidride solforica (SO ₃) solubile in acqua	
Basso livello di cloruro. Da usare solo quando vi è un bisogno riconosciuto. Non superare i dosaggi appropriati.	
Importato (fabbricante) da: BOTTOS s.r.l. via Lusevera,1 – 33078 San Vito al Tagliamento (PN)	
Distribuito da: EMERALD s.r.l.	
Tassi di applicazione: 15-30 g/m² (150-300 kg/ha)	
Istruzioni per l'uso: Applicare 15-30 g/m ² di prodotto su manto erboso in crescita. Applicare su manto asciutto. Irrigare dopo l'applicazione coprendo il manto erboso con 5 mm o 6 mm di acqua. Se la temperatura eccede i 25°C applicare solo dosaggi bassi ed irrigare immediatamente dopo l'applicazione. Applicare il prodotto a basse concentrazioni se la temperatura eccede i 25°C. Non usare su putting greens in campi da golf. Conservare in luogo asciutto e pulito. Risigillare il sacchetto aperto piegando ed assicurando la parte superiore. Usare solo spargitori puliti ed asciutti. Non lasciare prodotto non usato negli spargitori.	

Sverige	EC GÖDNINGSMEDEL NPK GÖDNINGSMEDEL 18 + 10.5 + 10
18,0 % Totalt kväve (N) 5,08 % Ammoniakkväve (N) 12,92 % Ureakväve (N)	
10,5% Fosfor (P) vattenlösligt	
10,0 % Kalium (K) vattenlösligt	
4,9 % Svavel (S) vattenlösligt	
Låg kloridhalt. Bör kunna användas när det konstaterats att det föreligger behov för dess användning. De passande dosraterna får ej överskridas.	
Importerat till Sverige av:	
Applikationsrater: 15-30 g/m² (150-300 kg/ha)	
Bruksanvisning: Produkten ska påföras i aktivt växande gräsjord med en dos av 15-30 g/m ² . Produkten ska påföras torr lövsamling. Bevattning ska ske med 5 – 6 mm efter påförandet. Om temperaturen är högre än 25°C eller om det inte går att tillföra produkten på fuktig eller våt mark, ska bevattning ske genast efter tillförandet. Tillsett i låga doser ifall temperaturen överskrider 25°C. Får ej användas på green avsedd för putting. Förvara produkten rent och torrt. Aterförslut en öppnad påse genom att vika ned och stänga påsens ovanparti. Använd endast rena och torra spridare. Örnvänd produkt får ej lämmas kvar i spridare.	

Norge	EC KUNSTGJØDSEL NPK KUNSTGJØDSEL 18 + 10.5 + 10
18,0% Samlet nitrogen (N) 5,08% ammoniakalsk nitrogen (N) 12,92% urea-nitrogen (N)	
10,5% Fosfor (P), vannoppløselig	
10,0% Kalium (K), vannoppløselig	
4,9% Svovel (S), vannoppløselig	
Lav i klorid. Skal bare brukes når det er fastslått at der er behov for det. Riktige doser må ikke overskrides.	
Distributor i Norge: Floratine Norge AS Gullfunnet 50 1570 DILLING	
Applikasjonsrater: 15-30 g/m² (150-300 kg/ha)	
Bruksanvisning: Anvend produktet på aktivt voksende gress i forholdet 15 til 30 g/m ² . Brukes på tørre gressstrå. Gresset vannes etter påføring - 5 til 6 mm med kunstig vanning. Hvis temperaturen er over 25°C, eller hvis man ikke kan unngå å anvende produktet på fuktig eller vått gress, skal man vanne like etter påføring. Anvend produktet langsomt hvis temperaturen er over 25°C. Må ikke brukes på putting greens. Oppbevares på et rent, tørt sted. Den åpne posen forsegles igjen ved å folde toppen ned og sikre den. Bruk kun rene, tørre spreder. Det må ikke la ubrukt produkt bli liggende igjen i en spreder.	

Denmark	EC KUNSTGØDNING NPK KUNSTGØDNING 18 + 10.5 + 10
18,0% Samlet kvælstof (N) 5,08% Ammoniumkvælstof (N) 12,92% Ureakvælstof (N)	
10,5% Fosfor (P) vandopløseligt	
10,0% Kalium (K) vandopløseligt	
4,8% Svovl (S) vandopløseligt	
Lavt kloridindhold. Bør kun bruges når det er konstateret, at der er behov for det. De passende dosisrater må ikke overskrides.	
Importeres i Danmark af: Floratine Norge AS Gullfunnet 50 1570 DILLING	
Applikationsrater: 15-30 g/m² (150-300 kg/ha)	
Bruksanvisninger: Kom produktet på aktivt voksende grønsvær ved 15-30 g/m ² . Kom det på tørre græsstrå. Vand efter påføringen med 5 to 6 mm kunstvandig. Hvis temperaturen er over 25°C eller hvis man ikke kan undgå at komme det på fuktig eller våd grønsvær, skal man kunstvande øjeblikkeligt efter påføringen. Kom det på langsomt hvis temperaturen er over 25°C. Må ikke kommes på putting greens. Opbevares et rent, tørt sted. Forsegl den åbne pose igen ved at folde toppen ned og fastgøre den. Brug kun rene, tørre spreder. Der må ikke efterlades ubrugt produkt i en spreder.	

België	EC-KUNSTMEST NPK-KUNSTMEST 18 + 24 + 12
18,0% totaal stikstof (N) 5,08% ammoniakstikstof (N) 12,92% ureumstikstof (N)	
24,0% fosforpentoxide (P ₂ O ₅) in water oplosbaar	
12,0% kaliumoxide (K ₂ O), in water oplosbaar	
12,2% zwaveltrioxide (SO ₃) in water oplosbaar	
Laag chloridegehalte. Alleen gebruiken waar dit zichtbaar nodig is. Aanbevolen hoeveelheden niet overschrijden.	
Importeur voor België: Sports Management bvba Lorkenlaan 14 2950 Kapellen – België	
Aan te brengen hoeveelheden: 15-30 g/m² (150-300 kg/ha)	
Gebruiksaanwijzing: Product aanbrengen op groeiend gras. Hoeveelheid: 15-30 g/m ² . Op droog gras aanbrengen. Na aanbrengen gras bewateren (5 à 6 mm). Bij temperaturen > 25°C of als aanbrengen op vochtig of nat gras onvermijdelijk is, onmiddellijk na aanbrengen bewateren. Bij temperaturen > 25°C slechts in kleine hoeveelheden aanbrengen. Niet gebruiken op putting greens. Op een schone, droge plaats bewaren. Geopende verpakking sluiten door bovenkant omlaag te vouwen en te bevestigen. Uitsluitend schone, droge stroomachines gebruiken. Restanten/niet-gebruikt product volledig uit stroomachines verwijderen.	

Belgique	ENGRAIS EC ENGRAIS NPK 18 + 24 + 12
18,0% Azote totale (N) 5,08% Azote ammoniacal (N) 12,92% Azote uréique (N)	
24,0% Anhydride phosphorique (P ₂ O ₅) soluble dans l'eau	
12,0% Oxyde de potassium (K ₂ O) soluble dans l'eau	
12,2% Trioxyde de soufre (SO ₃) soluble dans l'eau	
Faible teneur en chlorure. À utiliser uniquement en cas de besoin reconnu. Ne pas excéder les taux de dosage appropriés.	
Importé en Belgique par: Sports Management bvba Lorkenlaan 14 2950 Kapellen – Belgique	
Taux d'application : 15-30 g/m² (150-300 kg/ha)	
Mode d'emploi : Appliquer le produit sur le gazon en plaques en état de croissance active à un taux de 15-30 g/m ² . Appliquer sur le feuillage sec. Arroser après application avec 5 à 6 mm d'irrigation. Dans des températures supérieures à 25°C ou si l'application pour humidifier ou mouiller le gazon est inévitable, irriguer immédiatement après application. Appliquer à de faibles taux si les températures sont supérieures à 25°C. Ne pas utiliser sur les verts de rouler. Entreposer dans un endroit propre et sec. Refermer hermétiquement le sac ouvert en repliant le haut et en sécurisant. Utiliser uniquement des épandeuuses propres et sèches. Ne pas laisser de produit non utilisé dans les épandeuuses.	

Greece	18 + 24 + 12
18,0% Ολικό άζωτο (N) 5,08% Αμμωνιακό άζωτο 12,92% Άζωτο ουρίας*	
24,0% Διαθέσιμα φωσφορούχα (P2O5) από φωσφορικό αμμώνιο	
12,0% Διαλυτή ποτάσσα (K2O) από θειικό κάλιο	
4,88% Ολικό θείο (S) από θείο	
*8,61 διαθέσιμο βραδέως άζωτο από πολυμερές επικάλυψη ουρίας επιχρισμένη με θείο	
Εισαγωγή στην Ελλάδα από: Georponikos Oikos 3 Makedonias St., Athens, GREECE	
Ρυθμοί εφαρμογής 15-30 g/m² (150-300 kg/ha)	
Οδηγίες χρήσης: Εφαρμόστε το προϊόν σε γκαζόν που αναπτύσσεται ενεργά στα 15-30 g/m ² . Εφαρμόστε σε ήπια φύλλωση. Ποτίστε μετά από την εφαρμογή με 5 έως 6 mm άρδευσης. Αν η θερμοκρασία υπερβαίνει τους 25°C ή αν είναι αδύνατον να μην κάνετε την εφαρμογή σε υγραμένο ή υγρό γκαζόν, ποτίστε αμέσως μετά την εφαρμογή. Εφαρμόστε με αργό ρυθμό, εάν οι θερμοκρασίες ξεπερνούν τους 25°C. Μην χρησιμοποιείτε σε γκαζόν «putting green». Αποθηκεύστε σε καθαρό, ήπιο χώρο. Να φραγείτε τις ανοιχτές σακούλες διπλώνοντας το πάνω μέρος προς τα κάτω και ασφαλιζοντάς το. Να χρησιμοποιείτε μόνο καθαρά, στεγνά μηχανήματα σποράς. Μην αφήνετε προϊόν στα μηχανήματα σποράς μετά τη χρήση.	

Taiwan (R.O.C.)	菁根開 (18-24-12)
肥料登記證字號: 肥進(複)字第 0128011 號	
肥料品目: 複合肥料 (6-01)	
國外廠牌商品名稱: PolySports FERTILIZER 18-24-12 WITH NS-54 NITROGEN	
保證成份: 全氮18.0%、內含銨態氮5.08%、水溶性磷酐24.0 %、水溶性氧化鉀12.0%	
成品性狀: 固態·顆粒狀	
使用方法: 於作物生長季節適量施灑,尤其是以新播種作物補充磷元素為主·	
使用量: 一般用量為每平方公尺使用本產品20公克·	
包裝方式: 袋裝	淨重: 25 kg
有效期限: 5年	批號: 請詳見包裝
製造日期: 請詳見包裝	電話: 04-22135266
總代理: 菁修企業有限公司	
地址: 台中市東區自由路四段210號	
製造地: 美國	
製造廠商: THE ANDERSONS, INC.	
P. O. BOX 119, MAUMEE, OH USA 43537	

Australia	18 + 10.5 + 10
18.0% Total Nitrogen (N) 5.08% Ammoniacal Nitrogen 12.92% Urea Nitrogen*	
10.5% Available Phosphorus (P) from ammonium phosphate	
10.0% Soluble Potassium (K) from potassium sulfate	
4.9% Total Sulfur (S) from sulfate	
*8.6% slowly available nitrogen from polymer coated sulfur coated urea	
Application rates: 1.5-3.0 kg/100 m² (150-300 kg/ha)	
Directions for use: Apply product to actively growing turf at 1.5-3.0 kg/100 m ² . Apply to dry foliage. Water in after application with 5 to 6 mm of irrigation. If temperatures exceed 25°C or if application to damp or wet turf is unavoidable, irrigate immediately after application. Apply at low rates if temperatures exceed 25°C. Do not use on putting greens. Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing. Use only clean, dry spreaders. Do not leave unused product in spreaders.	

New Zealand	18 + 10.5 + 10
18.0% Total Nitrogen (N) 5.08% Ammoniacal Nitrogen 12.92% Urea Nitrogen*	
10.5% Available Phosphorus (P) from ammonium phosphate	
10.0% Soluble Potassium (K) from potassium sulfate	
4.9% Total Sulfur (S) from sulfate	
*8.6% slowly available nitrogen from polymer coated sulfur coated urea	
Application rates: 15-30 g/m² (150-300 kg/ha)	
Directions for use: Apply product to actively growing turf at 15-30 g/m ² . Apply to dry foliage. Water in after application with 5 to 6 mm of irrigation. If temperatures exceed 25°C or if application to damp or wet turf is unavoidable, irrigate immediately after application. Apply at low rates if temperatures exceed 25°C. Do not use on putting greens. Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing. Use only clean, dry spreaders. Do not leave unused product in spreaders.	

 Spreaders	Ground Speed	Width of Coverage	Spreader Settings			
			15 g/m²	20 g/m²	25 g/m²	
Model 2000 (cone 4); 2000 SR (cone 4) Settings for single pass application = FULL RATE	5 km/hr	3.6 m	K 1/2	L 1/2	M 1/2	
Lely Models WTR, WFR, HR & 1250 (pattern II-C) Settings for single pass application = FULL RATE	7 km/hr	12.2 m	5 1/2	6	6 1/2	
Vicon (03 Series) Settings for single pass application = FULL RATE	7 km/hr	9.7 m	30	33	36	
Suggested spreader settings are not intended to replace calibration. Please calibrate your spreader before applying product.						

	Manufactured by: The Andersons, Inc. P. O. Box 119 Maumee, OH 43537 U.S.A. AndersonsPro.com	<h1>25 kg/net</h1> <h1>10005488</h1>
	The Andersons logo is a registered trademark of The Andersons, Inc.; PolySports and NS-54 are trademarks of The Andersons, Inc.	