

# Tee Time®

## SGN 100

# A-TEP

## Mg, Fe, Mn, Zn, Cu

| USA/INT | A-TEP with Mg, Fe, Mn, Zn, Cu |  |
|---------|-------------------------------|--|
| 9.0%    | Sulfur (S) from sulfate       |  |
| 12.0%   | Magnesium (Mg)                |  |
| 6.0%    | Water Soluble Magnesium       |  |
| 8.0%    | Iron (Fe)                     |  |
| 0.01%   | Water Soluble Iron            |  |
| 3.0%    | Manganese (Mn)                |  |
| 2.0%    | Water Soluble Manganese       |  |
| 0.1%    | Zinc (Zn)                     |  |
| 0.1%    | Copper (Cu)                   |  |

**Application rates: 7-11 g/m<sup>2</sup> (70-110 kg/ha)**

**Directions for use:** Apply product to actively growing turf at 7-11 g/m<sup>2</sup>. Apply to dry foliage. Water in after application with 5 to 6 mm of irrigation prior to any traffic to aid particle dispersion and reduce potential for staining. Avoid mowing soon after application. If temperatures exceed 25°C or if application to damp or wet turf is unavoidable, irrigate immediately after application. Apply at low rates if temperatures exceed 25°C. This product contains iron which may stain concrete and other surfaces. Remove particles promptly by sweeping or blowing to avoid staining. DO NOT WASH OFF WITH WATER. Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing. Use only clean, dry spreaders. Do not leave unused product in spreaders.

| UK/EC | EC FERTILISER                                     |  |
|-------|---|--|
|       | FERTILISER WITH Mg, Fe, Mn, Zn, Cu                |  |
| 22.5% | Sulphur trioxide (SO <sub>3</sub> ) water soluble |  |
| 20.0% | Magnesium (MgO)                                   |  |
| 6.0%  | water soluble Magnesium (MgO)                     |  |
| 8.0%  | Iron (Fe)   |  |
| 0.01% | water soluble Iron (Fe)                           |  |
| 3.0%  | Manganese (Mn)                                    |  |
| 2.0%  | water soluble Manganese (Mn)                      |  |
| 0.1%  | Zinc (Zn)   |  |
| 0.1%  | Copper (Cu)                                       |  |

Low in chloride. To be used only where there is a recognised need. Do not exceed the appropriate dose rates.

Import in U.K. by: Greentech Sportsturf Ltd.  
Block 5 Unit 1 - Bandeath Industrial Estate  
Throsk, Stirling, Scotland FK7 7NP

**Application Rates: 7-11 g/m<sup>2</sup> (70-110 kg/ha)**

**Directions for use:** Apply product to actively growing turf at 7-11 g/m<sup>2</sup>. Apply to dry foliage. Water in after application with 5 to 6 mm of irrigation prior to any traffic to aid particle dispersion and reduce potential for staining. Avoid mowing soon after application. If temperatures exceed 25°C or if application to damp or wet turf is unavoidable, irrigate immediately after application. Apply at low rates if temperatures exceed 25°C. This product contains iron which may stain concrete and other surfaces. Remove particles promptly by sweeping or blowing to avoid staining. DO NOT WASH OFF WITH WATER. Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing. Use only clean, dry spreaders. Do not leave unused product in spreaders.

| Eire/EC | EC FERTILISER                      |  |
|---------|------------------------------------|--|
|         | FERTILISER WITH Mg, Fe, Mn, Zn, Cu |  |
| 9.0%    | Sulphur (S) water soluble          |  |
| 12.0%   | Magnesium (Mg)                     |  |
| 6.0%    | water soluble Magnesium (Mg)       |  |
| 8.0%    | Iron (Fe)                          |  |
| 0.01%   | water soluble Iron (Fe)            |  |
| 3.0%    | Manganese (Mn)                     |  |
| 2.0%    | water soluble Manganese (Mn)       |  |
| 0.1%    | Zinc (Zn)                          |  |
| 0.1%    | Copper (Cu)                        |  |

Low in chloride. To be used only where there is a recognised need. Do not exceed the appropriate dose rates.

Import in EIRE by: Greentech Sportsturf Ltd.  
Block 5 Unit 1 - Bandeath Industrial Estate  
Throsk, Stirling, Scotland FK7 7NP

**Application rates: 7-11 g/m<sup>2</sup> (70-110 kg/ha)**

**Directions for use:** Apply product to actively growing turf at 7-11 g/m<sup>2</sup>. Apply to dry foliage. Water in after application with 5 to 6 mm of irrigation prior to any traffic to aid particle dispersion and reduce potential for staining. Avoid mowing soon after application. If temperatures exceed 25°C or if application to damp or wet turf is unavoidable, irrigate immediately after application. Apply at low rates if temperatures exceed 25°C. This product contains iron which may stain concrete and other surfaces. Remove particles promptly by sweeping or blowing to avoid staining. DO NOT WASH OFF WITH WATER. Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing. Use only clean, dry spreaders. Do not leave unused product in spreaders.

| France/EC | ENGRAIS EC   |  |
|-----------|--|--|
|           | ENGRAIS AVEC Mg, Fe, Mn, Zn, Cu                            |  |
| 22,5%     | Anhydride sulfurique (SO <sub>3</sub> ) soluble dans l'eau |  |
| 20,0%     | Magnésium (MgO)  |  |
| 6,0%      | Magnésium (MgO) soluble dans l'eau                         |  |
| 8,0%      | Fer (Fe)   |  |
| 0,01%     | Fer (Fe) soluble dans l'eau                                |  |
| 3,0%      | Manganèse (Mn)   |  |
| 2,0%      | Manganèse (Mn) soluble dans l'eau                          |  |
| 0,1%      | Zinc (Zn)  |  |
| 0,1%      | Cuivre (Cu)  |  |

Faible teneur en chlore. À utiliser uniquement en cas de besoin reconnu. Ne pas dépasser les débits de dose appropriés.

Importé en France par: LOB GREEN S.A.S.  
25 Rue de la Chapelle  
GOURNAY, 62560 VERCHOCQ - France

**Taux d'application : 7-11 g/m<sup>2</sup> (70-110 kg/ha)**

**Mode d'emploi:** Appliquer le produit sur le gazon en plaques en état de croissance active à un taux de 7-11 g/m<sup>2</sup>. Appliquer sur le feuillage sec. Arroser après application avec 5 à 6 mm d'irrigation avant toute circulation pour favoriser la dispersion des particules et réduire le risque de coloration. Évitez de tondre rapidement après l'application. Dans des températures supérieures à 25°C ou si l'application pour humidifier ou mouiller le gazon est inévitable, irriguer immédiatement après application. Appliquer à de faibles taux si les températures sont supérieures à 25°C. Ce produit contient du fer, susceptible de tacher le béton et d'autres surfaces. Éliminer rapidement les particules en balayant ou en soufflant pour éviter toute tache. NE PAS LAVER À L'EAU. Entreposer dans un endroit propre et sec. Refermer hermétiquement le sac ouvert en repliant le haut et en sécurisant. Utiliser uniquement des épanduses propres et sèches. Ne pas laisser de produit non utilisé dans les épanduses.

| Deutschland | Schwefel-Magnesiumdünger (9+20) mit Spurennährstoffen |                               |
|-------------|---|-------------------------------|
| 9 %         | S   | Gesamtschwefel                |
| 20 %        | MgO   | Gesamtmagnesiumoxid           |
| 6,0%        | MgO   | wasserlösliches Magnesiumoxid |
| 8,0 %       | Fe  | Gesamteisen                   |
| 0,01%       | Fe  | wasserlösliches Eisen         |
| 3,0 %       | Mn  | Gesamtmangan                  |
| 2,0%        | Mn  | wasserlösliches Mangan        |
| 0,1 %       | Zn  | Gesamtzink                    |
| 0,1 %       | Cu  | Gesamtkupfer                  |

Nettogewicht: 20kg  
Inverkehrbringer:  
Turf Handels GmbH, Am Hartboden 48, A-8101 Gratkorn

**Aufwandmenge: 7-11 g/m<sup>2</sup> (70-110 kg/ha)**

**Anwendungsempfehlung:** Während der Vegetationszeit mit 7-11g/m<sup>2</sup> auf trockene Bestände ausbringen. Anschließend mindestens mit 5-6mm beregnen, damit die Körner gleichmäßig in die Rasennarbe fallen. Bei Temperaturen über 25°C nur mit geringer Aufwandmenge streuen und sofort beregnen. Das Produkt enthält Eisen, das auf gepflasterten Oberflächen im Zusammenhang mit Wasser Flecken verursachen kann. Sauber und trocken lagern, Restmengen dicht und trocken verschließen. Nur saubere Streuer benutzen, keine Restmengen im Streuwagen zurücklassen. Vor Frost schützen. Für Kinder und Haustiere unerreichbar aufbewahren. Dünger nicht ins Abwasser oder freie Gewässer gelangen lassen. Nicht auf Bodenbelägen (Steinplatten, Holzboden etc.) oder Kleidung bringen, da sonst Flecken entstehen können.

| Österreich | Mineralischer Magnesiumdünger mit Spurennährstoffen |                               |
|------------|---|-------------------------------|
| 9 %        | S   | Gesamtschwefel                |
| 20 %       | MgO   | Gesamtmagnesiumoxid           |
| 6,0%       | MgO   | wasserlösliches Magnesiumoxid |
| 8,0 %      | Fe  | Gesamteisen                   |
| 0,01%      | Fe  | wasserlösliches Eisen         |
| 3,0 %      | Mn  | Gesamtmangan                  |
| 2,0%       | Mn  | wasserlösliches Mangan        |
| 0,1 %      | Zn  | Gesamtzink                    |
| 0,1 %      | Cu  | Gesamtkupfer                  |

Komponenten: Magnesiumsulfat, Magnesiumoxid, Eisensulfat, Eisenoxid, Mangansulfat, Manganoxid, Kupfersulfat, Kupferoxid, Zinksulfat  
Nettogewicht: 20kg  
Hersteller:  
Turf Handels GmbH, Am Hartboden 48, A-8101 Gratkorn

**Aufwandmenge: 7-11 g/m<sup>2</sup> (70-110 kg/ha)**

**Anwendungsempfehlung:** Während der Vegetationszeit mit 7-11g/m<sup>2</sup> auf trockene Bestände ausbringen. Anschließend mindestens mit 5-6mm beregnen, damit die Körner gleichmäßig in die Rasennarbe fallen. Bei Temperaturen über 25°C nur mit geringer Aufwandmenge streuen und sofort beregnen. Das Produkt enthält Eisen, das auf gepflasterten Oberflächen im Zusammenhang mit Wasser Flecken verursachen kann. Trocken und sauber lagern, Restmengen dicht und trocken verschließen. Nur saubere Streuer benutzen, keine Restmengen im Streuwagen zurücklassen. Vor Frost schützen. Für Kinder und Haustiere unerreichbar aufbewahren.

| Italia | A TEP - IRON PLUS   |  |
|--------|---|--|
|        | Miscela di microelementi rame (Cu solfato), ferro (Fe solfato), manganese (Mn solfato) e zinco (Zn solfato) (Mg-S) (12-9) |  |
| 0,5 %  | Rame (Cu) solubile in acqua   |  |
| 8,0 %  | Ferro (Fe) solubile in acqua  |  |
| 3,0 %  | Manganese (Mn) solubile in acqua  |  |
| 0,1 %  | Zinco (Zn) solubile in acqua  |  |
| 20,0 % | Ossido di magnesio (MgO) solubile in acqua  |  |
| 22,5 % | Anidride solforica (SO <sub>3</sub> ) solubile in acqua   |  |

Prodotto e confezionato da: The Andersons, Inc. Maumee - 43537 OH (USA)  
Importato (fabbricante) da: BOTTOS s.r.l.  
via Lusevera,1 - 33078 San Vito al Tagliamento (PN)

Distribuito da: EMERALD s.r.l.

**Dose: 7-11 g/m<sup>2</sup> (70-110 kg/ha)**

**Indicazioni per l'uso:** applicare 7-11 g/m<sup>2</sup> di prodotto su manto erboso in crescita. Applicare su manto asciutto. Irrigare dopo l'applicazione coprendo il manto da 5 mm a 6 mm di acqua prima di calpestare il manto per favorire la dispersione delle particelle e per ridurre la possibilità che si formino macchie. Evitare di tagliare il manto erboso poco dopo l'applicazione del prodotto. Se la temperatura è superiore ai 25°C o se si è forzati ad applicare il prodotto su manti umidi o bagnati, irrigare immediatamente dopo l'applicazione. Applicare il prodotto a basse concentrazioni se la temperatura eccede i 25°C. Il presente prodotto contiene ferro, che potrebbe macchiare superfici in cemento o altri materiali. Per evitare che il prodotto macchi, rimuovere le particelle immediatamente o usando una scopa o un soffiatore. NON PULIRE USANDO ACQUA. Conservare in luogo asciutto e pulito. Risigliare il sacchetto aperto piegando ed assicurando la parte superiore. Usare solo spargitori puliti ed asciutti. Non lasciare prodotto non usato negli spargitori.

| Norge | gjødsel med mikro |  |
|-------|-------------------|--|
| 12,0% | Magnesium (Mg)    |  |
| 6,0%  | vannløselig Mg    |  |
| 9,0%  | Svovel (S)        |  |
| 8,0%  | Jern (Fe)         |  |
| 0,01% | vannløselig Fe    |  |
| 3,0%  | Mangan (Mn)       |  |
| 2,0%  | vannløselig Mn    |  |
| 0,1%  | Sink (Zn)         |  |
| 0,1%  | Kobber (Cu)       |  |

Basert på magnesium-, jern-, mangan-, sink- og kobbersulfat, samt magnesium-, jern-, mangan-, sink- og kobberoksyd.  
Distributør i Norge: Floratine Norge AS  
Gullfunnet 50  
1570 Dilling, NORGE

**Anbefalte gjødselmengder: 7-11 g/m<sup>2</sup> (70-110 kg/ha)**

Gjødsla tilføres når gras er i vekst. Påfør på torr løvverk. Vann inn etter påføring med 5 til 6 mm vanning for noen trafikktil til å hjelpe partikkel spredning og redusere potensial for farging. Unngå å klippe kort etter påføring. Bruk mindre gjødselmengder ved høge temperaturer (> 25°C), og vann øyeblikkelig for å unngå sviskader. Dette produktet inneholder jern som kan misfarge betong og andre overflater. Fjern partikler omgående ved feing eller blåsning. VASK IKKE BORT MED VANN. I forbindelse med gjødsling skal det kun benyttes tørre og reine gjødselspredere. La ikke gjødsel bli liggende igjen i sprederen. Gjødsla skal lagres tørt.

| Taiwan (R.O.C.)  | 菁好牌菁綠寶(A-TEP)   |  |
|--|-----------------|--|
| 肥料登記證字號: 肥進(微)字第 0128057 號   |                 |  |
| 肥料品目: 雜項微量微量要素肥料 (4-41)  |                 |  |
| 國外廠牌商品名稱: ATEP HI MAG TRACE ELEMENT PACKAGE                                |                 |  |
| 保證成份: 水溶性氧化鎂11.4% · 水溶性錳2.32% · 水溶性鐵5.31% · 全銅0.45% · 全鋅0.89%              |                 |  |
| 成品性狀: 固態, 顆粒狀  |                 |  |
| 使用方法: 施用於乾的葉面 · 施用後並在任何通行走澆水5-6mm · 以助顆粒分解 · 並減少作物被染色的可能性 · 施用後澆水10-20分鐘 · |                 |  |
| 使用量: 7-11g/m <sup>2</sup> · 每分地7-11公斤 ·                                    |                 |  |
| 包裝方式: 袋裝   | 淨重: 20 kg       |  |
| 有效期限: 4年   | 批號: 請詳見包裝       |  |
| 製造日期: 請詳見包裝  | 電話: 04-22135266 |  |
| 總代理: 菁修企業有限公司  |                 |  |
| 地址: 台中市東區自由路四段210號   |                 |  |
| 製造地: 美國  |                 |  |
| 製造廠商: THE ANDERSONS, INC.  |                 |  |
| P. O. BOX 119, MAUMEE, OH USA 43537  |                 |  |

| España/CE | ABONO CE                                     |  |
|-----------|--|--|
|           | ABONO CON Mg, Fe, Mn, Zn, Cu                 |  |
| 22,5%     | soluble en agua de azufre (SO <sub>3</sub> ) |  |
| 20,0%     | Magnesio (MgO)                               |  |
| 6,0%      | soluble en agua, magnesio de Hierro (Fe)     |  |
| 0,01%     | de Hierro soluble en agua                    |  |
| 3,0%      | Manganese (Mn)                               |  |
| 2,0%      | soluble en agua de Manganese                 |  |
| 0,1%      | Zinc (Zn)                                    |  |
| 0,1%      | de Cobre (Cu)                                |  |

Bajo en cloruro. Para ser utilizado sólo cuando hay una necesidad reconocida. No sobrepasar las dosis recomendadas.  
Importador para España:  
Dosis de aplicación: 7-11 grs/m<sup>2</sup> (70-110 Kg./ha)  
Instrucciones de uso: Aplicación de productos en crecimiento activo del césped. Dosis recomendada 7-11 gr/m<sup>2</sup>.  
Aplicar cuando la hoja esté seca. Regar después de la aplicación con 5 a 6 mm agua de riego antes de cualquier tráfico (máquinas o personas) para ayudar y facilitar la dispersión de partículas para reducir las posibles manchas. Evite segar pronto el césped después de la aplicación. Si las temperaturas exceden los 25°C y/o el césped está húmedo o mojado, regar inmediatamente después de la aplicación. Aplicar en las bajas dosis si las temperaturas exceden los 25°C. Este producto contiene hierro que puede manchar zonas puntuales u otras superficies. Eliminar las partículas rápidamente mediante barrido o soplado (máquinas sopladoras) para evitar manchas. No se lava con agua. Conservar el envase en un lugar limpio y seco. Una vez abierto el saco evitar que entre humedad, asegúrese de cerrar la parte superior del saco. Utilice sólo abonadoras limpias y secas. No deje de producto no utilizado en las abonadoras.

| Australia | A-TEP with Mg, Fe, Mn, Zn, Cu |  |
|-----------|-------------------------------|--|
| 9.0%      | Total Sulfur (S) from sulfate |  |
| 12.0%     | Magnesium (Mg)                |  |
| 6.0%      | Water Soluble Magnesium       |  |
| 8.0%      | Iron (Fe)                     |  |
| 0.01%     | Water Soluble Iron            |  |
| 3.0%      | Manganese (Mn)                |  |
| 2.0%      | Water Soluble Manganese       |  |
| 0.1%      | Zinc (Zn)                     |  |
| 0.1%      | Copper (Cu)                   |  |

**Application rates: 0.7-1.1 kg/100 m<sup>2</sup> (70-110 kg/ha)**

**Directions for use:** Apply product to actively growing turf at 0.7-1.1 kg/100 m<sup>2</sup>. Apply to dry foliage. Water in after application with 5 to 6 mm of irrigation prior to any traffic to aid particle dispersion and reduce potential for staining. Avoid mowing soon after application. If temperatures exceed 25°C or if application to damp or wet turf is unavoidable, irrigate immediately after application. Apply at low rates if temperatures exceed 25°C. This product contains iron which may stain concrete and other surfaces. Remove particles promptly by sweeping or blowing to avoid staining. DO NOT WASH OFF WITH WATER. Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing. Use only clean, dry spreaders. Do not leave unused product in spreaders.

| New Zealand | A-TEP with Mg, Fe, Mn, Zn, Cu |  |
|-------------|-------------------------------|--|
| 9.0%        | Total Sulfur (S) from sulfate |  |
| 12.0%       | Magnesium (Mg)                |  |
| 6.0%        | Water Soluble Magnesium       |  |
| 8.0%        | Iron (Fe)                     |  |
| 0.01%       | Water Soluble Iron            |  |
| 3.0%        | Manganese (Mn)                |  |
| 2.0%        | Water Soluble Manganese       |  |
| 0.1%        | Zinc                          |  |
| 0.1%        | Copper (Cu)                   |  |

**Application rates: 7-11 g/m<sup>2</sup> (70-110 kg/ha)**

**Directions for use:** Apply product to actively growing turf at 7-11 g/m<sup>2</sup>. Apply to dry foliage. Water in after application with 5 to 6 mm of irrigation prior to any traffic to aid particle dispersion and reduce potential for staining. Avoid mowing soon after application. If temperatures exceed 25°C or if application to damp or wet turf is unavoidable, irrigate immediately after application. Apply at low rates if temperatures exceed 25°C. This product contains iron which may stain concrete and other surfaces. Remove particles promptly by sweeping or blowing to avoid staining. DO NOT WASH OFF WITH WATER. Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing. Use only clean, dry spreaders. Do not leave unused product in spreaders.

| Model 2000 (cone 9); 2000 SR (cone 9)<br>Settings for single pass application = FULL RATE                                    | Ground Speed | Width of Coverage | Spreader Settings  |                     |
|--|--------------|-------------------|--------------------|---------------------|
|  |              |                   | 7 g/m <sup>2</sup> | 11 g/m <sup>2</sup> |
| SSD Drop Spreader<br>Settings for single pass application = FULL RATE  | 5 km/hr      | 2.7 m             | H 1/2              | I 1/4               |
| Suggested spreader settings are not intended to replace calibration. Please calibrate your spreader before applying product. | 5 km/hr      | 0.9 m             | 2 1/2              | 3 1/4               |



The Andersons logo and Tee Time are registered trademark of The Andersons, Inc.

Manufactured by:  
The Andersons, Inc.  
P. O. Box 119  
Maumee, OH 43537  
U.S.A.  
www.andersonsplantnutrient.com

# 20 kg/net

# 10009074

A24