

Nutri DG®

Greens - SGN 75

17 + 0 + 17 + Fe, Mn
(17 + 0 + 14.1 + Fe, Mn)

50%
MUtech™

USA/INT	17 + 0 + 17 + Fe, Mn
17.0%	Total Nitrogen (N) 5.3% Ammoniacal Nitrogen 4.5% Urea Nitrogen 4.2% Other Water Soluble Nitrogen from methylene ureas 3.0% Water Insoluble Nitrogen from methylene ureas
17.0%	Soluble Potash (K ₂ O) from potassium sulfate
11.8%	Total Sulfur (S) from sulfate
0.5%	Iron (Fe) water soluble from iron sulfate
0.25%	Manganese (Mn) water soluble from manganese sulfate

Application rates: 15-30 g/m² (150-300 kg/ha)

Directions for use: Apply product to actively growing turf at 15-30 g/m². Apply to dry foliage. Immediately after application, apply a minimum of 5 mm of water to disperse particles into the root zone. Due to variations in temperature and water pH, best results are achieved by splitting the irrigation into 2 applications at 10-15 minutes apart. This will allow for more thorough particle dispersion into the root zone. Particle color may vary from lot to lot. Apply only at low rates if temperatures exceed 25°C and irrigate immediately after application. This product contains iron which may stain concrete and other surfaces. Remove particles promptly by sweeping or blowing to avoid staining. DO NOT WASH OFF WITH WATER. Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing. Use only clean, dry spreaders. Do not leave unused product in spreaders.

UK/EC	EC FERTILISER NK FERTILISER CONTAINING UREA FORMALDEHYDE WITH Fe, Mn 17 + 0 + 17 + Fe, Mn
17.0%	Total nitrogen (N) 5.3% Ammoniacal nitrogen (N) 4.5% Ureic nitrogen (N) 7.2% Nitrogen (N) from urea formaldehyde with 4.3% Nitrogen (N) from urea formaldehyde only soluble in cold water 1.5% Nitrogen (N) from urea formaldehyde only soluble in hot water
17.0%	Potassium oxide (K ₂ O)
29.5%	Sulphur trioxide (SO ₃)
0.5%	Iron (Fe) water soluble
0.3%	Manganese (Mn) water soluble

Low in chloride. To be used only where there is a recognised need. Do not exceed the appropriate dose rates.

Import in U.K. by:

Greentech Sportsurf Ltd.
Block 5 Unit 1 - Bandeath Industrial Estate
Throsk, Stirling
Scotland FK7 7NP

Application rates: 15-30 g/m² (150-300 kg/ha)

Directions for use: Apply product to actively growing turf at 15-30 g/m². Apply to dry foliage. Immediately after application, apply a minimum of 5 mm of water to disperse particles into the root zone. Due to variations in temperature and water pH, best results are achieved by splitting the irrigation into 2 applications at 10-15 minutes apart. This will allow for more thorough particle dispersion into the root zone. Particle color may vary from lot to lot. Apply only at low rates if temperatures exceed 25°C and irrigate immediately after application. This product contains iron which may stain concrete and other surfaces. Remove particles promptly by sweeping or blowing to avoid staining. DO NOT WASH OFF WITH WATER. Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing. Use only clean, dry spreaders. Do not leave unused product in spreaders.

France/EC	Engrais CE Engrais NK contenant de l'urée formaldéhyde action lente 17-0-17
17.0%	Azote (N) total 5.3% Azote (N) ammoniacal 4.5% Azote (N) uréique 7.2% Azote (N) organique de synthèse de l'urée formaldéhyde dont 4.3% soluble à 20°C dont 1.5% soluble à 100°C mais insoluble à 20°C dont 1.4% insoluble à 100°C
17.0%	Oxyde de potassium (K ₂ O) soluble dans l'eau
29.5%	Anhydride sulfurique (SO ₃) soluble dans l'eau

Importé en France par:

LOB GREEN S.A.S.
21 Rue du Saint Sépulture
62560 Saint Omer
France

Dose d'emploi

Cet engrais est destiné à la fertilisation des gazon et permet de fournir les éléments majeurs nécessaire à un bon développement, d'une manière équilibrée. L'azote organique de synthèse permet une mise à disposition de l'azote étalée dans le temps. Apporter de 150 à 200 kg/ha plusieurs fois pendant la saison de croissance du gazon. L'engrais sera appliqué uniformément sur toute la surface. Humidité présente sur le feuillage ou un léger arrosage permettrons un déilement très rapide des granulés grâce à la technologie NUTRI DG (granulé dispersible).

Attention
H319 Provoque une sévère irritation des yeux
H335 Peut irriter les voies respiratoires
P261 Eviter de respirer les poussières
P264 Se laver soigneusement après manipulation
P270 Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit
P271 Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé
P280 Porter un équipement de protection des yeux et du visage.
P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
P337 + P313 Si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin.
P304 + P340 EN CAS D'INHALATION : transporter la victime à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
P304 + P340 EN CAS D'INHALATION : transporter la victime à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
P501 Eliminer le contenu selon les lois et règlements en vigueur.

Deutschland	17-0-17 NutriDG
Deklaration nach Deutscher Düngemittelverordnung 2012: NK-Dünger, 17-17 mit Spurennährstoffen	
17,0 %	N Gesamtsickstoff 5,3 % N Ammoniumstickstoff 4,5 % N Carbamidstickstoff 7,2 % N Formaldehydharstoff 4,3 % N kalwasserlöslicher Formaldehydharstoff 1,5 % N nur heißwasserlöslicher Formaldehydharstoff
17,0 %	K ₂ O Gesamtkaliumoxid 17,0 % K ₂ O wasserlösliches Kaliumoxid
0,5 %	Fe Eisen
0,3 %	Mn Mangan
Nettomasse: 20 kg	
Inverkehrbringer: TURF Handels GmbH, Am Hartboden 48, A – 8101 Gratkorn	

Nebenbestandteil:	11,8 %
	S wasserlöslicher Schwefel

Hinweise zur sachgerechten Lagerung: In der Originalverpackung trocken, kühl, frostfrei lagern. Restmengen dicht und trocken verschließen. Für Kinder und Haustiere unerreichbar aufbewahren.
Anwendung: Während der Vegetationszeit mit 15-30 g/m² auf möglichst trockene Bestände von Golfgreens oder anderen Rasenflächen ausbringen. Anschließend kurz mit 3-4 mm abregnen. Bei Temperaturen über 30°C nur mit geringer Aufwandmenge streuen und sofort beregnen. - Hinweis: Empfehlungen der amtlichen Beratungen gehen vor. Nur bei tatsächlichem Bedarf und unter Einhaltung der Aufwandmenge anwenden.

Für alle Zier- und Sportrasenflächen.

Österreich	17-0-17 NutriDG
Deklaration nach der Österreichischen Düngemittelverordnung 2004 (zuletzt geändert am 07.06.2022): Mineralischer NK-Dünger mit Spurennährstoffen	
17,0 %	N Gesamtsickstoff 5,3 % N Ammoniumstickstoff 4,5 % N Carbamidstickstoff 7,2 % Formaldehydharstoff 4,3 % N kalwasserlöslicher Formaldehydharstoff 1,5 % N nur heißwasserlöslicher Formaldehydharstoff
17,0 %	K ₂ O Gesamtkaliumoxid 17,0 % K ₂ O wasserlösliches Kaliumoxid
11,8 %	S Schwefel
0,5 %	Fe Eisen
0,3 %	Mn Mangan

Enthält 42 % Langzeitsickstoff.

Hinweise zur sachgerechten Lagerung: In der Originalverpackung trocken, kühl, frostfrei lagern. Restmengen dicht und trocken verschließen. Für Kinder und Haustiere unerreichbar aufbewahren.

Anwendung: Während der Vegetationszeit mit 15-30 g/m² auf möglichst trockene Bestände von Golfgreens oder anderen Rasenflächen ausbringen. Anschließend kurz mit 3-4 mm abregnen. Bei Temperaturen über 30°C nur mit geringer Aufwandmenge streuen und sofort beregnen. - Hinweis: Empfehlungen der amtlichen Beratungen gehen vor. Nur bei tatsächlichem Bedarf und unter Einhaltung der Aufwandmenge anwenden.

Sicherheitshinweis: Nach der Anwendung Hände und eventuell anders berührte Hautstellen gründlich waschen.

Anwendungsbereich: Hobbygarten, GaLa-Bau, Golf- und Sportanlagen

Hersteller: TURF Handels GmbH, Am Hartboden 48, AT-8101 Gratkorn
Gewicht: 20 kg

Norge	NK-gjødsel med Fe og Mn 17 – 0 – 14 (17 – 0 – 17)
17,0%	Nitrogen (N) 5,3 % ammonium-N 4,5 % urea-N 7,2 % metylenurea hvorav 3,0% vannløselig N (WIN)
14,0%	Kalium (K) - vannløselig 17,0% kaliumoksyd (K ₂ O)
11,8%	Sovell (S) - vannløselig
0,5%	Jern (Fe) - vannløselig
0,3%	Mangan (Mn) - vannløselig

Basert på ammoniumsulfat, urea, metylenurea, kaliumsulfat, samt jern- og mangansulfat. Tilsett HAP.

Skal bare benyttes ved påvist behov. De anbefalte mengder må ikke overskrides.

Distributør i Norge: Floratine Norge AS
Gullfunnet 50
1570 Dilling, NORGE

Reg. nr. (Mattilsynet): 8401

Nettovekt: 20 kg

Anbefalte gjødselmengder: 15 – 30 g/m² (150 – 300 kg/ha)

En meget fingranulert gjødsel med et balansert NK-forhold (1:0,8), og hvor 50 % av nitrogenet frigjøres langsomt via mikrobiell nedbryting. Gjødsla tilføres når grasen er i vekst, og på tørt bladverk. Det vannes 3-4 minutter etter at gjødsling er utført. Bruk mindre gjødselmengder ved høye temperaturer (> 25°C), og vann øyeblikkelig for å unngå sving. Dette produktet inneholder jern som kan mislange betong og andre overflater. Fjern partikler omgående ved feiling eller blødding. VASK IKKE BORT MED VANN. I forbindelse med gjødsling skal det kun benyttes tørre og rene gjødsel-spredere. La ikke gjødsel bli liggende igjen i sprederen. Gjødsla skal lagres tørt.

Denmark	EC KUNSTGØDNING NK KUNSTGØDNING INDEHOLDENDE FRA UREA FORMALDEHYD MED Fe, Mn 17 + 0 + 14,1 + Fe, Mn
17,0%	Kvælstof (N) 5,3% Ammoniumkvælstof (N) 4,5% Ureakvælstof (N) 7,2% Kvælstof (N) fra ureaformaldehyd med 4,3% kvælstof (N) fra ureaformaldehyd kun opløseligt i koldt vand 1,5% kvælstof (N) fra ureaformaldehyd kun opløseligt i varmt vand
14,1%	Kalium (K)
11,8%	Sovt (S)
0,5%	Jern (Fe)
0,3%	Mangan (Mn)

Lavt kloridindhold. Bør kun bruges når det er konstateret, at der er behov for det. De passende doserstrer må ikke overskrides.

Importører i Danmark af: Floratine Norge AS
Gullfunnet 50
1570 DILLING
NORGE

Applikationsrater: 15-30 g/m² (150-300 kg/ha)

Brugsanvisninger: Kom produktet på aktivt voksende græs over 15-30 g/m². Påføres på tørre blade. Umiddelbart efter påføringen, påføres mindst 5 mm vand at dispergere partikler i rodzonen. På grund af variationer i temperatur og vand pH, er de bedste resultater opnået ved at opdele kunstvanding i 2 ansøgninger på 10-15 minutter fra hinanden. Dette vil give mulighed for mere grundig dispersion i rodzonen. Partikel farve kan variere fra parti til parti. Nedsæt påførgsmængden, hvis temperaturen overstiger 25 °C og overside umiddelbart efter påføring. Dette produkt indeholder jern, som kan plette beton og andre overflader. Fjern partikler med det samme ved at lege eller blæse for at undgå pletter. VASK IKKE VASKES AF MED VAND. Opbevares i tørt, rent sted. Forsøg den åbne pose igen ved at folde toppen ned og fastgøre den. Brug kun rene, tørre spredere. Der må ikke efterlades ubrugt produkt i en spredere.

España/CE	ABONO CE ABONO COMPLEJO Abono NK abono contenido urea formaldehido con Fe, Mn 17 + 0 + 17 + Fe, Mn
17,0%	Nitrógeno total (N) 5,3% Nitrógeno amoniacal(N) 4,5% de nitrógeno ureico (N) 7,2% Nitrógeno (N)de la urea con el formaldehído 4,3% Nitrógeno (N) sólo de la urea formaldehído soluble en agua fría 1,5% Nitrógeno (N) de la urea formaldehído soluble únicamente en agua caliente
17,0%	de óxido de potasio (K ₂ O)
29,5%	de azufre (SO ₃)
0,5%	Hierro (Fe)
0,3%	Manganeso (Mn)

Bajo en cloruro. Para ser utilizado sólo cuando haya una necesidad reconocida. No sobrepasar las dosis recomendadas.

Importador para España:

Dosis de aplicación: 15-30 grs/m² (150-300 kg/ha)

Instrucciones de uso: Aplicación de productos en crecimiento activo del césped. Instrucciones de uso: Dosis recomendada 15-30 gr/m². Aplicar cuando la hoja esté seca. Inmediatamente después de la aplicación, aplique un mínimo de 5 mm de agua para dispersar las partículas en la zona de raíces. Debido a las variaciones en la temperatura y el pH del agua, los mejores resultados se consiguen dividiendo el riego en 2 aplicaciones de 10-15 minutos aparte. Esto permitirá una dispersión más completa de las partículas en la zona de las raíces. El color de las partículas puede variar de un lote a otro. Se aconseja aplicar sólo a dosis bajas si las temperatura es superior a 25°C. Regar inmediatamente después de la aplicación. Conservar el envase en un lugar limpio y seco. Una vez abierto el saco evitar que entre humedad, asegúrese de cerrar la parte superior del saco. Utilice sólo abonadoras limpias y secas. No deje el producto no utilizado en las abonadoras.

Eire/EC	EC FERTILISER NK FERTILISER CONTAINING UREA FORMALDEHYDE WITH Fe, Mn 17 + 0 + 14,1 + Fe, Mn
17.0%	Total nitrogen (N) 5.3% Ammoniacal nitrogen (N) 4.5% Ureic nitrogen (N) 7.2% Nitrogen (N) from urea formaldehyde with 4.3% Nitrogen (N) from urea formaldehyde only soluble in cold water 1.5% Nitrogen (N) from urea formaldehyde only soluble in hot water
14.1%	Potassium (K) water soluble
11.8%	Sulphur (S) water soluble
0.5%	Iron (Fe) water soluble
0.3%	Manganese (Mn) water soluble

Low in chloride. To be used only where there is a recognised need. Do not exceed the appropriate dose rates.

Import in EIRE by:

Greentech Sportsurf Ltd.
Block 5 Unit 1 - Bandeath Industrial Estate
Throsk, Stirling
Scotland FK7 7NP

Application rates: 15-30 g/m² (150-300 kg/ha)

Directions for use: Apply product to actively growing turf at 15-30 g/m². Apply to dry foliage. Immediately after application, apply a minimum of 5 mm of water to disperse particles into the root zone. Due to variations in temperature and water pH, best results are achieved by splitting the irrigation into 2 applications at 10-15 minutes apart. This will allow for more thorough particle dispersion into the root zone. Particle color may vary from lot to lot. Apply only at low rates if temperatures exceed 25°C and irrigate immediately after application. This product contains iron which may stain concrete and other surfaces. Remove particles promptly by sweeping or blowing to avoid staining. DO NOT WASH OFF WITH WATER. Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing. Use only clean, dry spreaders. Do not leave unused product in spreaders.

Australia	17 + 0 + 14.1 + Fe, Mn
17.0%	Total Nitrogen (N) 5.3% Ammoniacal Nitrogen 4.5% Urea Nitrogen 4.2% Other Water Soluble Nitrogen from methylene ureas 3.0% Water Insoluble Nitrogen from methylene ureas
14.1%	Potassium (K) from potassium sulfate
11.8%	Sulfur (S) from sulfate
0.5%	Iron (Fe) water soluble from iron sulfate
0.3%	Manganese (Mn) water soluble from manganese sulfate

Application rates: 1.5 - 3.0 kg/100 m² (150-300 kg/ha)

Directions for use: Apply product to actively growing turf at 1.5 - 3.0 kg/100 m². Apply to dry foliage. Immediately after application, apply a minimum of 5 mm of water to disperse particles into the root zone. Due to variations in temperature and water pH, best results are achieved by splitting the irrigation into 2 applications at 10-15 minutes apart. This will allow for more thorough particle dispersion into the root zone. Particle color may vary from lot to lot. Apply only at low rates if temperatures exceed 25°C and irrigate immediately after application. This product contains iron which may stain concrete and other surfaces. Remove particles promptly by sweeping or blowing to avoid staining. DO NOT WASH OFF WITH WATER. Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing. Use only clean, dry spreaders. Do not leave unused product in spreaders.

New Zealand	17 + 0 + 14.1 + Fe, Mn
17.0%	Total Nitrogen (N) 5.3% Ammoniacal Nitrogen 4.5% Urea Nitrogen 4.2% Other Water Soluble Nitrogen from methylene ureas 3.0% Water Insoluble Nitrogen from methylene ureas
14.1%	Potassium (K) from potassium sulfate
11.8%	Sulfur (S) from sulfate
0.5%	Iron (Fe) water soluble from iron sulfate
0.3%	Manganese (Mn) water soluble from manganese sulfate

Application rates: 15-30 g/m² (150-300 kg/ha)

Directions for use: Apply product to actively growing turf at 15-30 g/m². Apply to dry foliage. Immediately after application, apply a minimum of 5 mm of water to disperse particles into the root zone. Due to variations in temperature and water pH, best results are achieved by splitting the irrigation into 2 applications at 10-15 minutes apart. This will allow for more thorough particle dispersion into the root zone. Particle color may vary from lot to lot. Apply only at low rates if temperatures exceed 25°C and irrigate immediately after application. This product contains iron which may stain concrete and other surfaces. Remove particles promptly by sweeping or blowing to avoid staining. DO NOT WASH OFF WITH WATER. Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing. Use only clean, dry spreaders. Do not leave unused product in spreaders.

Italia	CONCIME CE Concime NK (S) 17-17 (29.5) contenente urea formaldeide a basso tenore di cloro ottenuto per miscelazione con il ferro e manganese (Fe, Mn)
17%	Azoto (N) totale
5,3%	Azoto (N) ammoniacale
4,5%	Azoto (N) ureico
7,2%	Azoto (N) dell'urea formaldeide
4,3%	Azoto (N) dell'urea formaldeide solubile in acqua fredda
1,5%	Azoto (N) dell'urea formaldeide solubile unicamente in acqua calda
17%	Ossido di potassio (K ₂ O), solubile in acqua
29,5%	Anidride solforica (SO ₃), solubile in acqua
0,5%	di ferro (Fe), solubile in acqua
0,3%	Manganese (Mn), solubile in acqua

Basso contenuto di cloro. Da usare solo quando vi è un bisogno riconosciuto. Non superare i dosaggi appropriati.

Importato (fabbricante) da: BOTTOS s.r.l.

via Lusevera,1 – 33078 San Vito al Tagliamento (PN)

Distribuito da: EMERALD s.r.l.

Dose: 15-30 g/m² (150-300 kg/ha)

Indicazioni per l'uso: applicare 15-30 g/m² di prodotto su manto erboso in crescita. Applicare su manto asciutto. Immediatamente dopo l'applicazione, irrigare con almeno 5 mm di acqua per consentire uno spargimento delle particelle nell'area della radice. A causa delle variazioni della temperatura e del pH dell'acqua, si ottengono i migliori risultati dividendo il processo d'irrigazione in due applicazioni da 10-15 minuti ciascuna. Questo consente un migliore spargimento delle particelle nell'area della radice. Il colore delle particelle può variare da lotto a lotto. Se la temperatura eccede i 25°C applicare solo dosaggi bassi ed irrigare immediatamente dopo l'applicazione. Il presente prodotto contiene ferro, che potrebbe macchiare superfici in cemento o altri materiali. Per evitare che il prodotto macchi, rimuovere le particelle immediatamente e usando una scopa applicata o un soffiatore. NON PULIRE USANDO ACQUA. Conservare in luogo asciutto e pulito. Riaprire il sacchetto aperto piegando ed assicurando la parte superiore. Usare solo spargitori puliti ed asciutti. Non lasciare prodotto non usato negli spargitori.

Canada	17 + 0 + 17 + Fe, Mn	Registration Number XXXXXXXX Fertilizers Act
GUARANTEED MINIMUM ANALYSIS	Lot# xxxxxxxx	
17.00%	Total Nitrogen (N) 5.31% Ammoniacal Nitrogen 4.46% Urea Nitrogen 2.98% Water Insoluble Nitrogen 4.25% Other Water Soluble Nitrogen*	
17.00%	Soluble Potash (K ₂ O)	
11.80%	Sulfur (S)	
0.50%	Iron (Fe) (actual)	
0.25%	Manganese (Mn) (actual)	
0.25%	Ammonium Lignosulphonate	

*4.25% Slowly available nitrogen from methylene ureas.

Application rates: 1.44 - 2.87 kg/100 m² (2.94 - 5.88 lbs/1,000 sq. ft.)

Directions for use: This product must be used on the basis of a soil or tissue analysis. Seek advice from the county agricultural representative or a professional agricultural consultant. Use Andersons Nutri DG® Dispersing Granule Technology 17-0-17 for greens and tees where a nitrogen and potassium application is desired or when iron and manganese are needed to help correct or prevent deficiencies during the growing season. Watering in this product will disperse each granule into thousands of particles. This will facilitate the movement of the nutrients into the soil. This particle dispersion will greatly reduce ball, shoe and mower pickup - minimizing nutrient loss. Application to wet, close-cut golf turf may result in foliar staining, which will discolor the turf to a brown/black appearance. This will occur even if immediate irrigation or rainfall occurs. Be sure to apply this product to dry turf only. This product may not provide all nutrients required and should be used as part of a complete fertilization program, based on soil testing.

Personal Protective Equipment

RESPIRATORY PROTECTION: NIOSH approved particulate respirator, if required. EYE PROTECTION: Safety glasses with side shields, goggles, or face shield recommended. SKIN PROTECTION: Long sleeves, chemical-resistant gloves recommended. VENTILATION: Local exhaust ventilation recommended.

Caution: this fertilizer contains iron and manganese and should be used only as recommended. It may prove harmful when misused. **Storage and Use:** Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing. Use only clean, dry spreaders. Do not leave unused product in spreaders.

Taiwan (R.O.C.)	菁好新世代常綠肥 (DG 17-0-17)
肥料登記證字號：肥進(複)字第 0128074 號	
肥料品目：複合肥料 (6-01)	
國外廠牌商品名稱：The Andersons Nutri DG Dispersing Granule Technology 17+0+17	
保證成份：全氮17.0%、水溶性氧化鉀 17.0%	
成品性狀：固態、顆粒狀	
使用方法：成長中的草皮施用15-30公克/ 平方公尺。 施用在乾的葉面。	
施肥後澆水10-20分鐘。	
使用量：15-30公克/ 平方公尺 (每分地15-30 kg)。	
包裝方式：袋裝	淨重：20 kg
有效期限：4年	批號：請詳見包裝
製造日期：請詳見包裝	電話：04-22135266
總代理：菁修企業有限公司	
地址：台中市東區自由路四段210號	
製造地：美國	
製造廠商：THE ANDERSONS, INC.	
P. O. BOX 119, MAUMEE, OH USA 43537	

 Spreaders 	Ground Speed	Width of Coverage	Spreader Settings			
			15 g/m ²	20 g/m ²	25 g/m ²	30 g/m ²
Model 2000 (cone 9); 2000 SR (cone 9) Settings for single pass application = FULL RATE	5 km/hr	3.0 m	1 3/4	J 3/4	K 3/4	L 1/2
SSD Drop Spreader - Settings for single pass application = FULL RATE	5 km/hr	0.9 m	3 1/4	4	4 1/2	5 1/4
Suggested spreader settings are not intended to replace calibration. Please calibrate your spreader before applying product.						



Manufactured by (Fabriqué par):
The Andersons, Inc.
P. O. Box 119
Maumee, OH 43537
U.S.A.
AndersonsPro.com

The Andersons logo and Nutri DG are registered trademarks of The Andersons, Inc.; MUtech is a trademark of The Andersons, Inc.

20 kg/net
10005477

125

