

Tee Time®

SGN 125

25 + 5 + 15 + Fe, Mn, Zn, Cu

(25 + 2.2 + 12.5 +Fe, Mn, Zn, Cu)

50% MUtech™

USA/INT	25 + 5 + 15 + Fe, Mn, Zn, Cu
25.0%	Total Nitrogen (N) 1.1% Ammoniacal Nitrogen 13.3% Urea Nitrogen 6.2% Other Water Soluble Nitrogen from methylene ureas 4.4% Water Insoluble Nitrogen from methylene ureas
5.0%	Available Phosphate (P ₂ O ₅) from ammonium phosphate
15.0%	Soluble Potash (K ₂ O) from potassium sulfate
5.1%	Total Sulfur (S) from sulfate
0.1%	Copper (Cu) from cupric oxide
1.0%	Iron (Fe) from ferric oxide
0.1%	Manganese (Mn) from manganous oxide
0.1%	Zinc (Zn) from zinc oxide
Application rates: 15–25 g/m² (150–250 kg/ha)	
Directions for use: Apply product to actively growing turf at 15–25 g/m ² . Apply to dry foliage. Water in after application with 5 to 6 mm of irrigation. If temperatures exceed 25°C or if application to damp or wet turf is unavoidable, irrigate immediately after application. Apply at low rates if temperatures exceed 25°C. This product contains iron which may stain concrete and other surfaces. Remove particles promptly by sweeping or blowing to avoid staining. DO NOT WASH OFF WITH WATER. Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing. Use only clean, dry spreaders. Do not leave unused product in spreaders.	

Deutschland/Österreich	EG-DÜNGEMITTEL
NPK(S)-Dünger mit Formaldehydharstoff, Schwefel und Spurennährstoffen – Mischdünger -, 25-5-15 (-5)	
"Zur Düngung von Grünland"	
25 %	N Gesamtstickstoff davon: 1,1 % N Ammoniumstickstoff 13,3 % N Carbamidstickstoff 10,6 % N Formaldehydharstoff davon: 6,2 % N kaltwasserlöslicher Formaldehydharstoff 4,4 % N heißwasserlöslicher Formaldehydharstoff
5 %	P ₂ O ₅ neutral-ammonitratlösliches und wasserlösliches Phosphat davon 4,7% P ₂ O ₅ wasserlöslich
15 %	K ₂ O wasserlösliches Kaliumoxid
5,1 %	S Schwefel
0,1 %	Cu Kupfer
1,0 %	Fe Eisen
0,1 %	Mn Mangan
0,1 %	Zn Zink
Nettogewicht: 20 kg	
Hersteller: Turf Handels GmbH, Am Harbuden 48, A-8101 Gratkorn	

Aufwandmenge: 15–25g/m ² (150–250kg/ha)
Anwendungsempfehlung: Während der Hauptvegetationszeit mit 15–25g/m ² auf Tees oder anderen Rasenflächen ausbringen. Um die Verteilung in der Rasennarbe zu optimieren anschließend mit mindestens 5-6 mm beregnen. Bei Temperaturen über 25°C mit geringer Aufwandmenge arbeiten und anschließend sofort beregnen. Sauber und trocken lagern. Restmengen dicht und trocken verschließen. Nur saubere Streuer benutzen, keine Restmengen im Streuwagen zurücklassen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren!

Norge	NPK-gjødsel med mikronæring
25,0%	Nitrogen (N) 1,1% ammonium-N 13,3% urea-N 10,6% metylenurea hvorav 4,4% vannløselig N (WIN)
2,2%	Fosfor (P) – vannløselig (2,0 %) 5,0% fosforpentoksyd (P ₂ O ₅)
12,5%	Kalium (K) - vannløselig 15,0% kaliumoksyd (K ₂ O)
5,1%	Svovel (S) - vannløselig
1,0%	Jern (Fe)
0,1%	Kobber (Cu)
0,1%	Mangan (Mn)
0,1%	Sink (Zn)
Basert på ammoniumfosfat, urea, metylenurea, kaliumsulfat, jern-, kobber-, mangan- og sinkoksyd, samt jern-, kobber-, mangan- og sinkulfat.	
Skal bare benyttes ved påvist behov til golf- og fotballbaner, park- og hagearealer. De anbefalte mengder må ikke overskrides.	
Distributør i Norge: Floratine Norge AS Gullfurnet 50 1570 DILLING - NORGE Reg. nr. (Mattilsynet): 3274 Nettovekt: 20 kg	
Anbefalte gjødselmengder: 15 – 25 g/m² (150 – 250 kg/ha)	
En meget allsidig gjødsel hvor 50 % av nitrogenet frigjøres langsomt via mikrobiell nedbryting. Gjødsla tilføres når graset er i vekst, og på tørt bladverk. Det finnes 5-6 minutter etter at gjødsling er utført, for å lå gjødselkornene ned i planetebestand. Bruk mindre gjødselmengder ved høye temperaturer (> 25°C), og vann øyeblikkelig for å unngå svikskader. Dette produktet inneholder jern som kan misfarge betong og andre overflater. Fjern partikler omgående ved leing eller blåsning. VASK IKKE BORT MED VANN. I forbindelse med gjødsling skal det kun benyttes tørre og rene gjødselspredere. La ikke gjødsel bli liggende igjen i spredere. Gjødsla skal lagres tørt.	

Greece - Αριθμ. Κυκλοφορίας: 31	25 + 5 + 15 + Fe, Mn, Zn, Cu
25,0%	Ολικό Άζωτο (N) 1,1% Αμμωνιακό άζωτο 4,4% Άζωτο ουρίας 6,2% Άλλο υδατοδιαλυτό Άζωτο από ουρίες μεθυλενίου 13,3% Αδιάλυτο στο νερό Άζωτο από ουρίες μεθυλενίου
5,0%	Διαθέσιμο φωσφορικό (P ₂ O ₅) από φωσφορικό αμμώνιο
15,0%	Διαλυτή ποτάσσα (K ₂ O) από θειικό κάλιο
5,1%	Ολικό θείο (S)
0,1%	Ολικός Χαλκός (Cu)
1,0%	Σίδηρος (Fe)
0,1%	Ολικό Μαγγάνιο (Mn)
0,1%	Ολικός Ψευδάργυρος (Zn)
Εισαγωγή στην Ελλάδα από: Γεωπονικός Οίκος 3 Makedonias St., Athens, GREECE	

Рυθμοί εφαρμογής: 15–25 g/m ² (150–250 kg/ha)
Οδηγίες χρήσης: Εφαρμόστε το προϊόν σε καζόν που αναπτύσσεται ενεργά στα 15–25 g/m ² . Εφαρμόστε σε ζήρι φυλλωσιά. Πότισε μετά από την εφαρμογή με 5 έως 6 mm άρδευσης. Αν η θερμοκρασία υπερβαίνει τους 25°C ή αν είναι αδύνατον να μην κάνετε την εφαρμογή σε υγραμένο ή υγρό καζόν, ποτίστε αμέσως μετά την εφαρμογή. Εφαρμόστε μόνο σε χαμηλούς ρυθμούς αν η θερμοκρασία υπερβαίνει τους 25°C. Το προϊόν αυτό περιέχει σίδηρο που μπορεί να προκαλέσει λεκέδες σε τοιχότο και άλλες επιφάνειες. Καθαρίστε τα σχαρήματα αμέσως με σκούπισμα ή φύσημα για να αποφευχete το λεκίσιαμα. ΜΗΝ ΞΕΠΛΑΝΕΤΕ ΜΕ ΝΕΡΟ. Αποθηκεύστε σε καθαρό, ξηρό χώρο. Να γίνει φραγείτε τις ανοιχτές σκοουλές δειπλώνοντας το πάνω μέρος προς τα κάτω και ασφαλιζόντας το. Να χρησιμοποιείτε μόνο καθαρά, στεγνά μηχανήματα σποράς. Μην αφήνετε προϊόν στα μηχανήματα σποράς μετά τη χρήση.

Australia	25 + 2.2 + 12.5 + Fe, Mn, Zn, Cu
25.0%	Total Nitrogen (N) 1.1% Ammoniacal Nitrogen 13.3% Urea Nitrogen 6.2% Other Water Soluble Nitrogen from methylene ureas 4.4% Water Insoluble Nitrogen from methylene ureas
2.2%	Phosphorus (P) from ammonium phosphate
12.5%	Potassium (K) from potassium sulfate
5.1%	Total Sulfur (S) from sulfate
0.1%	Copper (Cu) from cupric oxide
1.0%	Iron (Fe) from ferric oxide
0.1%	Manganese (Mn) from manganous oxide
0.1%	Zinc (Zn) from zinc oxide
Application rates: 1.5–2.5 g/m² (150–250 kg/ha)	
Directions for use: Apply product to actively growing turf at 1.5–2.5 g/m ² . Apply to dry foliage. Water in after application with 5 to 6 mm of irrigation. If temperatures exceed 25°C or if application to damp or wet turf is unavoidable, irrigate immediately after application. Apply at low rates if temperatures exceed 25°C. This product contains iron which may stain concrete and other surfaces. Remove particles promptly by sweeping or blowing to avoid staining. DO NOT WASH OFF WITH WATER. Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing. Use only clean, dry spreaders. Do not leave unused product in spreaders.	

New Zealand	25 + 2.2 + 12.5 + Fe, Mn, Zn, Cu
25.0%	Total Nitrogen (N) 1.1% Ammoniacal Nitrogen 13.3% Urea Nitrogen 6.2% Other Water Soluble Nitrogen from methylene ureas 4.4% Water Insoluble Nitrogen from methylene ureas
2.2%	Phosphorus (P) from ammonium phosphate
12.5%	Potassium (K) from potassium sulfate
5.1%	Total Sulfur (S) from sulfate
0.1%	Copper (Cu) from cupric oxide
1.0%	Iron (Fe) from ferric oxide
0.1%	Manganese (Mn) from manganous oxide
0.1%	Zinc (Zn) from zinc oxide
Application rates: 15–25 g/m² (150–250 kg/ha)	
Directions for use: Apply product to actively growing turf at 15–25 g/m ² . Apply to dry foliage. Water in after application with 5 to 6 mm of irrigation. If temperatures exceed 25°C or if application to damp or wet turf is unavoidable, irrigate immediately after application. Apply at low rates if temperatures exceed 25°C. This product contains iron which may stain concrete and other surfaces. Remove particles promptly by sweeping or blowing to avoid staining. DO NOT WASH OFF WITH WATER. Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing. Use only clean, dry spreaders. Do not leave unused product in spreaders.	

UK/EC	EC FERTILISER
NPK FERTILISER CONTAINING UREA FORMALDEHYDE WITH Fe, Mn, Zn, Cu	
25 + 5 + 15 + Fe, Mn, Zn, Cu	
25.0%	Total nitrogen (N) 1.1% Ammoniacal Nitrogen (N) 13.3% Ureic nitrogen (N) 10.6% Nitrogen (N) from urea formaldehyde with 6.3% Nitrogen (N) from urea formaldehyde only soluble in cold water 2.3% Nitrogen (N) from urea formaldehyde only soluble in hot water
5.0%	Phosphorus pentoxide (P ₂ O ₅) soluble in neutral ammonium citrate and water with 4.7% water soluble P ₂ O ₅
15.0%	Potassium oxide (K ₂ O) water soluble
12.75%	Sulphur Trioxide (SO ₃) water soluble
0.1%	Copper (Cu)
1.0%	Iron (Fe)
0.1%	Manganese (Mn)
0.1%	Zinc (Zn)
Low in chloride. To be used only where there is a recognised need. Do not exceed the appropriate dose rates.	
Import in U.K. by: Greentech Sportsturf Ltd. Block 5 Unit 1 - Banded Industrial Estate Throsk, Stirling, Scotland FK7 7NP	
Application rates: 15–25 g/m² (150–250 kg/ha)	
Directions for use: Apply product to actively growing turf at 15–25 g/m ² . Apply to dry foliage. Water in after application with 5 to 6 mm of irrigation. If temperatures exceed 25°C or if application to damp or wet turf is unavoidable, irrigate immediately after application. Apply at low rates if temperatures exceed 25°C. This product contains iron which may stain concrete and other surfaces. Remove particles promptly by sweeping or blowing to avoid staining. DO NOT WASH OFF WITH WATER. Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing. Use only clean, dry spreaders. Do not leave unused product in spreaders.	

España/CE	ABONO CE
ABONO NPK FORMALDEHIDO DE UREA CON Fe, Mn, Zn, Cu	
25 + 5 + 15 + Fe, Mn, Zn, Cu	
25,0%	Nitrógeno total (N) 1,1% Nitrogeno amoniacal (N) 13,3% Nitrogeno ureico (N) 10,6% Nitrogeno (N) de formaldehido de urea, con 6,3% Nitrogeno (N) de formaldehido de urea, sólo soluble en agua fría 2,3% Nitrogeno (N) de formaldehido de urea, sólo soluble en agua caliente
5,0%	Pentóxido de fósforo (P ₂ O ₅) soluble en citrato de amonio neutro y agua, con 4,7% P ₂ O ₅ soluble en agua
15,0%	Óxido de potasio (K ₂ O) soluble en agua
12,75%	Trióxido de azufre (SO ₃) soluble en agua
0,1%	Cobre (Cu)
1,0%	Hierro (Fe)
0,1%	Manganeso (Mn)
0,1%	Zinc (Zn)
Bajo en cloro. Se debe usar sólo se reconozca que es necesario. No exceda las dosis recomendadas.	
Importada a España por:	
Dosis de aplicación: 15–25 g/m² (150–250 kg/ha)	
Instrucciones de uso: Aplique 15–25 g/m ² del producto a céspedes que están creciendo activamente. Aplique sobre el follaje seco. Riegue agua después de la aplicación, alcanzando 5 a 6 mm de irrigación. Si la temperatura supera los 25°C o si es inevitable aplicar sobre céspedes húmedos o mojados, riegue inmediatamente después de la aplicación. Aplique dosis más bajas si las temperaturas superan los 25°C. Este producto contiene hierro, el cual puede manchar el concreto y otras superficies. Para evitar manchas, elimine prontamente las partículas del producto mediante barrido o soplado. NO ELIMINAR CON AGUA. Almacene en un sitio limpio y seco. Vuelva a cerrar la bolsa abierta, doblando la parte superior hacia abajo y sujetándola. Solo use esparcidores limpios y secos. No deje producto sin utilizar en los esparcidores.	

Italia	CONCIME CE
Concime NPK (S) 25-5-15 (12.5) contenente urea formaldeide con Fe, Mn, Zn, Cu	
ottenuto per miscelazione - MUtech 25 + 5 + 15 + Fe, Mn, Zn, Cu	
25,0%	Totale azoto (N) 1,1% Azoto ammoniacato (N) 13,3% Azoto ureico (N) 10,6% Azoto (N) da urea formaldeide con 6,3% Azoto (N) da urea formaldeide solubile solo in acqua fredda 2,3% Azoto (N) da urea formaldeide solubile solo in acqua calda
5,0%	di pentossido di fosforo (P ₂ O ₅) solubile in citrato di ammonio neutro e acqua con 4,7% di P ₂ O ₅ solubile in acqua
15,0%	di ossido di potassio (K ₂ O) solubile in acqua
12,75%	di triossido di zolfo (SO ₃) solubile in acqua
0,1%	di rame (Cu)
1,0%	di ferro (Fe)
0,1%	di manganese (Mn)
0,1%	di zinco (Zn)
Basso contenuto di cloro. Da usare solo quando vi è un bisogno riconosciuto. Non superare i dosaggi appropriati.	
Prodotto e confezionato da: The Andersons, Inc., Maumee - 43537, OH (USA)	
Importato (fabbricante) da: BOTTOS s.r.l. via Lusevera,1 – 33078 San Vito al Tagliamento (PN)	
Distribuito da: EMERALD s.r.l.	
Dose: 15–25 g/m² (150–250 kg/ha)	
Istruzioni per l'uso: applicare 15–25 g/m ² di prodotto su manto erboso in crescita. Applicare su manto asciutto. Irrigare dopo l'applicazione coprendo il manto erboso con 5 mm o 6 mm di acqua. Se la temperatura eccede 125°C applicare solo dosaggi bassi ed irrigare immediatamente dopo l'applicazione. Applicare il prodotto a basse concentrazioni se la temperatura eccede i 25°C. Il presente prodotto contiene ferro, che potrebbe macchiare superfici in cemento o altri materiali. Per evitare che il prodotto macchi, rimuovere le particelle immediatamente o usando una scopa applicatore o un soffiatore. NON PULIRE USANDO ACQUA. Conservare in luogo asciutto e pulito. Risigillare il sacchetto aperto piegando ed assicurando la parte superiore. Usare solo spargitori puliti ed asciutti. Non lasciare prodotto non usato negli spargitori.	

België	EC-KUNSTMEST
NPK-KUNSTMEST MET UREUMFORMALDEHYDE: BEVAT Fe, Mn, Zn, Cu	
25 + 5 + 15 + Fe, Mn, Zn, Cu	
25,0%	totale stikstof (N) 1,1% ammoniumstikstof (N) 13,3% ureumstikstof (N) 10,6% stikstof (N) uit ureumformaldehyde, waarvan: 6,3% stikstof (N) uit ureumformaldehyde alleen oplosbaar in koud water 2,3% stikstof (N) uit ureumformaldehyde alleen oplosbaar in heet water
5,0%	Fosforpentoxide (P ₂ O ₅), oplosbaar in neutraal ammoniumcitraat en water, met 4,7% in water oplosbaar P ₂ O ₅
15,0%	kaliumoxide (K ₂ O), in water oplosbaar
12,75%	zweveltrioxide (SO ₃), in water oplosbaar
0,1%	koper (Cu)
1,0%	ijzer (Fe)
0,1%	mangaan (Mn)
0,1%	zink (Zn)
Laag chloridegehalte. Alleen gebruiken waar dit zichtbaar nodig is. Aanbevolen hoeveelheden niet overschrijden.	
Importeur voor België: Sports Management bvba Lorkenlaan 14 2950 Kapellen - België	
Aan te brengen hoeveelheden: 15–25 g/m² (150–250 kg/ha)	
Gebruiksaanwijzing: product aanbrengen op groeiend gras. Hoeveelheid: 15–30 g/m ² . Op droog gras aanbrengen. Na aanbrengen gras bewateren (5 à 6 mm). Bij temperaturen > 25°C slechts in kleine hoeveelheden aanbrengen en onmiddellijk na aanbrengen bewateren. Dit product bevat ijzer, wat op beton en andere oppervlakken roestvlekken kan veroorzaken. Gemorstte deeltjes onmiddellijk opvegen of wegblazen om vlekken te voorkomen. NIET MET WATER AFSPOELEN. Op een schone, droge plaats bewaren. Geopende verpakking sluiten door bovenkant omlaag te vouwen en te bevestigen. Uitsluitend schone, droge stroommachines gebruiken. Restanten/niet-gebruikt product volledig uit stroommachines verwijderen.	

Denmark	NPK-gødning med 50% langsomt virkende N
25 – 2 – 13 (25 – 5 – 15)	
25,0%	Kvælstof (N) 1,1% ammonium-N 13,3% urea-N 10,6% methylenurinstof 10,6% methylenurinstof hvoraf 4,4% vandopløseligt N (WIN)
2,2%	Fosfor (P) 5,0% Fosforpentoxid (P ₂ O ₅)
12,5%	Kalium (K) 15,0% kaliumoksyd (K ₂ O)
5,1%	Svovl (S)
1,0%	Jern (Fe)
0,1%	Mangan (Mn)
0,1%	Zink (Zn)
0,1%	Kobber (Cu)
Baseret på ammoniumfosfat, urinstof, metylenurinstof, kaliumsulfat, jern-, kobber-, mangan-, og zinkoxid, med jern-, kobber-, mangan- og zinkulfat.	
Må kun bruges til dokumenterede behov for golf- og fodboldbaner, park og haveområder. De anbefalede mængder må ikke overskrides.	
Distributør i Danmark: Floratine Norge AS Gullfurnet 50 1570 DILLING, NORGE	
Anbefalede gødningsmængder: 15–25 g/m² (150–250 kg/ha)	
Gødning tilsættes, når græsset vokser. Det vandes 4-5 minutter, efter at befrugtningen er gennemført for at bringe gødningsgraden ind i planteopplantningen. Brug mindre gødning ved høje temperaturer (> 25 ° C), og vand straks for at undgå ved. Dette produkt indeholder jern, der kan misfarve beton og andre overflader. Fjern partikler straks ved at fejle eller blæse. VASK IKKE MED VAND. Til gødningsbrug kun tør og ren gødningspredere. Lad ikke gødning forblive i spredere. Gødning skal opbevares tørt.	

Taiwan (R.O.C.)	25 + 5 + 15 + Fe, Mn, Zn, Cu
25.0%	Total Nitrogen (N) 1.1% Ammoniacal Nitrogen 13.3% Urea Nitrogen 6.2% Other Water Soluble Nitrogen from methylene ureas 4.4% Water Insoluble Nitrogen from methylene ureas
5.0%	Available Phosphate (P ₂ O ₅) from ammonium phosphate
15.0%	Soluble Potash (K ₂ O) from potassium sulfate
5.1%	Total Sulfur (S) from sulfate
0.1%	Copper (Cu) from cupric oxide
1.0%	Iron (Fe) from ferric oxide
0.1%	Manganese (Mn) from manganous oxide
0.1%	Zinc (Zn) from zinc oxide
Application rates: 15–25 g/m² (150–250 kg/ha)	
Directions for use: Apply product to actively growing turf at 15–25 g/m ² . Apply to dry foliage. Water in after application with 5 to 6 mm of irrigation. If temperatures exceed 25°C or if application to damp or wet turf is unavoidable, irrigate immediately after application. Apply at low rates if temperatures exceed 25°C. This product contains iron which may stain concrete and other surfaces. Remove particles promptly by sweeping or blowing to avoid staining. DO NOT WASH OFF WITH WATER. Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing. Use only clean, dry spreaders. Do not leave unused product in spreaders.	

Eire/EC	EC FERTILISER
NPK FERTILISER CONTAINING UREA FORMALDEHYDE WITH Fe, Mn, Zn, Cu	
25 + 2.2 + 12.5 + Fe, Mn, Zn, Cu	
25.0%	Total nitrogen (N) 1.1% Ammoniacal Nitrogen 13.3% Ureic Nitrogen 10.6% Nitrogen (N) from urea formaldehyde with 6.3% Nitrogen (N) from urea formaldehyde only soluble in cold water 2.3% Nitrogen (N) from urea formaldehyde only soluble in hot water
2.2%	Phosphorus (P) soluble in neutral ammonium citrate and water with 2.0% water soluble P
12.5%	Potassium (K) water soluble
5.1%	Sulphur (S) water soluble
0.1%	Copper (Cu)
1.0%	Iron (Fe)
0.1%	Manganese (Mn)
0.1%	Zinc (Zn)
Low in chloride. To be used only where there is a recognised need. Do not exceed the appropriate dose rates.	
Import in EIRE by: Greentech Sportsturf Ltd. Block 5 Unit 1 - Banded Industrial Estate Throsk, Stirling, Scotland FK7 7NP	
Application rates: 15–25 g/m² (150–250 kg/ha)	
Directions for use: Apply product to actively growing turf at 15–25 g/m ² . Apply to dry foliage. Water in after application with 5 to 6 mm of irrigation. If temperatures exceed 25°C or if application to damp or wet turf is unavoidable, irrigate immediately after application. Apply at low rates if temperatures exceed 25°C. This product contains iron which may stain concrete and other surfaces. Remove particles promptly by sweeping or blowing to avoid staining. DO NOT WASH OFF WITH WATER. Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing. Use only clean, dry spreaders. Do not leave unused product in spreaders.	

France/EC	ENGRAIS EC
ENGRAIS NPK CONTENANT DE L'URÉE-FORMALDÉHYDE AVEC Fe, Mn, Zn, Cu	
25 + 5 + 15 + Fe, Mn, Zn, Cu	
25,0%	Azote totale (N) 1,1% Azote ammoniacal (N) 13,3% Azote uréique (N) 10,6% Azote (N) de l'urée-formaldéhyde avec 6,3% Azote (N) de l'urée-formaldéhyde soluble uniquement dans l'eau froide 2,3% Azote (N) de l'urée-formaldéhyde soluble uniquement dans l'eau chaude
5,0%	Anhydride phosphorique (P ₂ O ₅) soluble dans le citrate d'ammonium neutre et dans l'eau et 4,7% P ₂ O ₅ soluble dans l'eau
15,0%	Oxyde de potassium (K ₂ O) soluble dans l'eau
12,75%	Anhydride sulfurique (SO ₃) soluble dans l'eau
0,1%	Cuivre (Cu)
1,0%	Fer (Fe)
0,1%	Manganèse (Mn)
0,1%	Zinc (Zn)
Faible teneur en chlorure. A utiliser uniquement en cas de besoin reconnu. Ne pas dépasser les débits de dose appropriés.	
Importé en France par: LOB GREEN S.A.S. 25 Rue de la Chapelle GOURNAY, 62560 VERCHOCQ - France	
Taux d'application: 15–25 g/m² (150–250 kg/ha)	
Mode d'emploi: Appliquer le produit sur le gazon en plaques en état de croissance active à un taux de 15–25 g/m ² . Appliquer sur le feuillage sec. Arroser après application avec 5 à 6 mm d'irrigation. Dans des températures supérieures à 25°C ou si l'application pour humidifier ou mouiller le gazon est inévitable, irriguer immédiatement après application. Appliquer à de faibles taux si les températures sont supérieures à 25°C. Ce produit contient du fer, susceptible de tacher le béton et d'autres surfaces. Éliminer rapidement les particules en balayant ou en soufflant pour éviter toute tache. NE PAS L'AVER A L'EAU. Entrepôser dans un endroit propre et sec. Refermer hermétiquement le sac ouvert en repliant le haut et en sécurisant. Utiliser uniquement des épanduses propres et sèches. Ne pas laisser de produit non utilisé dans les épanduses.	

Sverige	EU GÖDSELMEDEL
NPK-gödselmedel med 50 % långtidsverkande N	
25 – 2 – 13 (25 – 5 – 15)	
25,0 %	Kväve (N) 1,1% ammonium-N 13,3% urea-N 10,6% metylenurea varav 4,4% vattenlösigt N (WIN)
2,2%	Fosfor (P) 5,0% Isotroperoxid (P ₂ O ₅)
12,5 %	Kalium (K) 15,0% kaliumoxid (K ₂ O)
5,1 %	Svavel (S)
1,0 %	Järn (Fe)
0,1 %	Mangan (Mn)
0,1 %	Zink (Zn)
0,1 %	Koppar (Cu)
Baserat på ammoniumfosfat, urea, metylenurea, kaliumsulfat, järn-, koppar-, mangan- och zinkoxid, samt järn-, koppar-, mangan- och zinkulfat.	
Bör endast användas vid behov till golf- och fotbollsplaner, park- och trädgårdsområden. De rekommenderade mängderna får inte överskridas	
Distributör i Sverige: Floratine Scandinavia AB C/O Floratine Norge AS Gullfurnet 50 1570 Dilling, NORGE	
Rekommenderad mängd: 15–25 g/m² (150–250 kg/ha)	