

# PolySports™

## SGN 240

# 26 + 0 + 10 + Fe

## (26 + 0 + 8.3 + Fe)

# 75% Extend™

USA/INT	26 + 0 + 10 + Fe
26.0%	Total Nitrogen (N) 26.0% Urea Nitrogen*
10.0%	Soluble Potash (K <sub>2</sub> O) from potassium sulfate
3.4%	Total Sulfur (S) from sulfate
3.0%	Iron (Fe) from iron oxide

\*19.5% Slowly available nitrogen from polymer coated urea.

**Application rates: 20-30 g/m<sup>2</sup> (200-300 kg/ha)**

**Directions for use:** Apply product to actively growing turf at 20-30 g/m<sup>2</sup>. Apply to dry foliage. Water in after application with 5 to 6 mm of irrigation. If temperatures exceed 25°C or if application to damp or wet turf is unavoidable, irrigate immediately after application. Apply at low rates if temperatures exceed 25°C. Do not use on putting greens. This product contains iron which may stain concrete and other surfaces. Remove particles promptly by sweeping or blowing to avoid staining. DO NOT WASH OFF WITH WATER. Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing. Use only clean, dry spreaders. Do not leave unused product in spreaders.

UK/EC	EC FERTILISER NK FERTILISER WITH Fe 26 + 0 + 10 + Fe
26.0%	Total Nitrogen (N) 26.0% Ureic nitrogen (N)
10.0%	Potassium oxide (K <sub>2</sub> O) water soluble
8.5%	Sulphur trioxide (SO <sub>3</sub> ) water soluble
3.0%	Iron (Fe)

Low in chloride. To be used only where there is a recognised need. Do not exceed the appropriate dose rates.

Import in U.K. by: Greentech Sportsturf Ltd.  
Block 5 Unit 1 - Bandearth Industrial Estate  
Throsk, Stirling  
Scotland FK7 7NP

**Application Rates: 20-30 g/m<sup>2</sup> (200-300 kg/ha)**

**Directions for use:** Apply product to actively growing turf at 20-30 g/m<sup>2</sup>. Apply to dry foliage. Water in after application with 5 to 6 mm of irrigation. If temperatures exceed 25°C or if application to damp or wet turf is unavoidable, irrigate immediately after application. Apply at low rates if temperatures exceed 25°C. Do not use on putting greens. This product contains iron which may stain concrete and other surfaces. Remove particles promptly by sweeping or blowing to avoid staining. DO NOT WASH OFF WITH WATER. Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing. Use only clean, dry spreaders. Do not leave unused product in spreaders.

Eire/EC	EC FERTILISER NK FERTILISER WITH Fe 26 + 0 + 8.3 + Fe
26.0%	Total nitrogen (N) 26.0% Ureic nitrogen (N)
8.3%	Potassium (K) water soluble
3.4%	Sulphur (S) water soluble
3.0%	Iron (Fe)

Low in chloride. To be used only where there is a recognised need. Do not exceed the appropriate dose rates.

Import in EIRE by: Spraychem  
Unit 14 - Stadium Business Park  
Ballycolin Road  
Dublin 11 - Ireland

**Application rates: 20-30 g/m<sup>2</sup> (200-300 kg/ha)**

**Directions for use:** Apply product to actively growing turf at 20-30 g/m<sup>2</sup>. Apply to dry foliage. Water in after application with 5 to 6 mm of irrigation. If temperatures exceed 25°C or if application to damp or wet turf is unavoidable, irrigate immediately after application. Apply at low rates if temperatures exceed 25°C. Do not use on putting greens. This product contains iron which may stain concrete and other surfaces. Remove particles promptly by sweeping or blowing to avoid staining. DO NOT WASH OFF WITH WATER. Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing. Use only clean, dry spreaders. Do not leave unused product in spreaders.

France/EC	ENGRAIS EC ENGRAIS NK AVEC Fe 26 + 0 + 10 + Fe
26,0%	Azote totale (N) 26,0% Azote uréique (N)
10,0%	Oxyde de potassium (K <sub>2</sub> O) soluble dans l'eau
8,5%	Trioxyde de soufre (SO <sub>3</sub> ) soluble dans l'eau
3,0%	Fer (Fe)

Faible teneur en chlorure. À utiliser uniquement en cas de besoin reconnu. Ne pas excéder les taux de dosage appropriés.

Importé en France par: LOB GREEN S.A.S.  
25 Rue de la Chapelle  
GOURNAY, 62560 VERCHOCQ - France

**Taux d'application : 20-30 g/m<sup>2</sup> (200-300 kg/ha)**

**Mode d'emploi :** Appliquer le produit sur le gazon en plaques en état de croissance active à un taux de 20-30 g/m<sup>2</sup>. Appliquer sur le feuillage sec. Arroser après application avec 5 à 6 mm d'irrigation. Dans des températures supérieures à 25°C ou si l'application pour humidifier ou mouiller le gazon est inévitable, irriguer immédiatement après application. Appliquer à de faibles taux si les températures sont supérieures à 25°C. Ne pas utiliser sur les verts de rouler. Ce produit contient du fer, susceptible de tacher le béton et d'autres surfaces. Éliminer rapidement les particules en balayant ou en soufflant pour éviter toute tache. NE PAS LAYER À L'EAU. Entreposer dans un endroit propre et sec. Refermer hermétiquement le sac ouvert en repliant le haut et en sécurisant. Utiliser uniquement des épanduses propres et sèches. Ne pas laisser de produit non utilisé dans les épanduses.

Deutschland	26-0-10
<b>Deklaration nach Deutscher Düngemittelverordnung 2012:</b> NK-Dünger mit teilweise umhülltem Stickstoff und Eisen, 26 - 20	
26,0 %	N Gesamtstickstoff 7,5% N Ammoniumstickstoff 18,5% N Carbamidstickstoff
20,0 %	K <sub>2</sub> O wasserlösliches Kaliumoxid
3,0 %	Fe Eisen

**Nettomasse:** 25 kg  
**Inverkehrbringer:** TURF Handels GmbH., Am Hartboden 48, A – 8101 Gratkorn

Anwendungshilfsmittel: 75 % des Gesamtstickstoffes sind unter Verwendung einer Polymerhülle umhüllt

**Hinweise zur sachgerechten Lagerung:** In der Originalverpackung trocken, kühl, frostfrei lagern. Restmengen dicht und trocken verschließen. Für Kinder und Haustiere unerreikbaar aufbewahren.  
**Anwendung:** Während der Hauptvegetationszeit mit 20-30 g/m<sup>2</sup> auf Fairways oder Sportrasenflächen ausbringen. Um die Verteilung in der Rasennarbe zu optimieren nach der Düngung gleichmäßig bewässern. Bei Temperaturen über 30°C nur mit geringer Aufwindmenge streuen und sofort beregnen. - Hinweis: Empfehlungen der amtlichen Beratungen gehen vor.  
Das Produkt enthält Eisen, das auf gepflasterten Oberflächen im Zusammenhang mit Wasser Flecken verursachen kann.  
Die Umhüllung hat einen Wirkzeitraum von 4-5 Monaten.

Für alle Zier- und Sportrasenflächen.

España/CE	ABONO CE NK ABONO CON FE 26 + 0 + 10 + Fe
26,0%	Nitrógeno total (N) 26,0% de nitrógeno ureico (N)
10,0%	de óxido de potasio (K <sub>2</sub> O) soluble en agua
8,50%	de azufre (SO <sub>3</sub> ) soluble en agua
3,0%	Hierro (Fe)

Bajo en cloruro. Sólo debe utilizarse cuando hay una necesidad reconocida. No exceder las dosis adecuadas.

Importador para España:

**Dosis de aplicación: 20-30 grs/m<sup>2</sup> (200-300 Kg/ha)**

**Instrucciones de uso:** Aplicación de productos en crecimiento activo del césped. Aplicar cuando la hoja esté seca. Regar después de la aplicación con 5 a 6 mm de agua de riego. Se aconseja aplicar sólo a dosis bajas si la temperatura es superior a 25°C. Regar inmediatamente después de la aplicación. Este producto contiene hierro que puede manchar zonas aplicadas u otras superficies. Eliminar las partículas sobrantes barriendo o soplando (máquinas sopladoras) para evitar manchas. NO SE LAVA CON AGUA. Conservar el envase en un lugar limpio y seco. Una vez abierto el saco evitar que entre humedad, asegúrese de cerrar la parte superior del saco. Utilice sólo abonadoras limpias y secas. No deje de producto no utilizado en las abonadoras.

Italia	FERTILIZZANTE EC FERTILIZZANTE NK CON Fe 26 + 0 + 10 + Fe
26,0%	Totale azoto (N) 26,0% Azoto ureico (N)
10,0%	Ossido di potassio (K <sub>2</sub> O), solubile in acqua
8,5%	Anidride solforica (SO <sub>3</sub> ) solubile in acqua
3,0%	Ferro (Fe) solubile in acqua

Basso livello di cloruro. Da usare solo quando vi è un bisogno riconosciuto. Non superare i dosaggi appropriati.

Importato (fabbricante) da: BOTTOS s.r.l.  
via Lusevera,1 – 33078 San Vito al Tagliamento (PN)

Distribuito da: EMERALD s.r.l.

**Tassi di applicazione: 20-30 g/m<sup>2</sup> (200-300 kg/ha)**

**Istruzioni per l'uso:** Applicare 20-30 g/m<sup>2</sup> di prodotto su manto erboso in crescita. Applicare su manto asciutto. Irrigare dopo l'applicazione coprendo il manto erboso con 5 mm o 6 mm di acqua. Se la temperatura eccede i 25°C applicare solo dosaggi bassi ed irrigare immediatamente dopo l'applicazione. Applicare il prodotto a basse concentrazioni se la temperatura eccede i 25°C. Non usare su putting greens in campi da golf. Il presente prodotto contiene ferro, che potrebbe macchiare superfici in cemento o altri materiali. Per evitare che il prodotto macchi, rimuovere le particelle immediatamente o usando una scopa o un soffiatore. NON PULIRE USANDO ACQUA. Conservare in luogo asciutto e pulito. Risigillare il sacchetto aperto piegando ed assicurando la parte superiore. Usare solo spargitori puliti ed asciutti. Non lasciare prodotto non usato negli spargitori.

Sverige	EC KONSTGÖDSELMEDEL NK KONSTGÖDSELMEDEL MED Fe 26 + 0 + 8,3 + Fe
26,0 %	Totalt kväve (N) 26,0% Ureäkväve (N)
8,3 %	Kalium (K) vattenlösligt
3,4%	Svavel (S) vattenlösligt
3,0 %	Järn (Fe)

Låg kloridhalt. Bör kunna användas när det konstaterats att det föreligger behov för dess användning. De passande dosraterna får ej överskridas.

Importeras i Sverige av:

**Applikationsrater: 20-30 g/m<sup>2</sup> (200-300 kg/ha)**

**Bruksanvisningar:** Produkten ska påföras i aktivt växande gräsjord med en dos av 20-30 g/m<sup>2</sup>. Produkten ska påföras torr lövsamling. Bevattning ska ske med 5-6 mm efter påförandet. Om temperaturen är högre än 25°C eller om det inte går att tillföra produkten på fuktig eller våt mark, ska bevattning ske genast efter tillförandet. Tillstånd i låga doser ifall temperaturen överskrider 25°C. Får ej användas på green avsedd för putting. Denna produkt innehåller järn som kan fläcka ner betong och andra ytor. Avlägsna genast partiklar genom att sopa eller blåsa undan sådant som kan leda till missfärgning. FÅR EJ AVTVÄTTAS MED VATTEN. Förvara produkten rent och torr. Återförslut en öppnad påse genom att vika ned och stänga påsens ovanparti. Använd endast rena och torra spridare. Oanvänd produkt får ej lämnas kvar i spridare.

Norge	EC KUNSTGJØDSEL NK KUNSTGJØDSEL MED Fe 26 + 0 + 8,3 + Fe
26,0%	Samlet nitrogen (N) 26,0% urea-nitrogen (N)
8,3%	Kalium (K), vannoppløselig
3,4%	Svovl (S), vannoppløselig
3,0%	Jern (Fe)

Lav i klorid. Skal bare brukes når det er fastslått at der er behov for det. Riktige doser må ikke overskrides.

Distributør i Norge: Floratine Norge AS  
Gullfunnet 50  
1570 DILLING

**Applikasjonsrater: 20-30 g/m<sup>2</sup> (200-300 kg/ha)**

**Bruksanvisning:** Anvend produktet på aktivt voksende gress i forholdet 20 til 30 g/m<sup>2</sup>. Brukes på tørre gressstrå. Gresset vannes etter påføring - 5 til 6 mm med kunstig vannning. Hvis temperaturen er over 25°C, eller hvis man ikke kan unngå å anvende produktet på fuktig eller vått gress, skal man vanne like etter påføring. Anvend produktet langsomt hvis temperaturen er over 25°C. Må ikke brukes på putting greens. Dette produktet inneholder jern som kan sette flekker på betong og andre overflater. Fjern partikler omgående ved å feie eller blåse for å unngå flekker. MÅ IKKE VASKES AV MED VANN. Oppbevares på et rent, tørt sted. Den åpne posen forsegles igjen ved å folde toppen ned og sikre den. Bruk kun rene, tørre spreder. Det må ikke la ubrukt produkt bli liggende igjen i en spreder.

Denmark	EC KUNSTGØDNING NK KUNSTGØDNING MED Fe 26 + 0 + 8,3 + Fe
26,0%	Samlet kvælstof (N) 26,0% ureumkvælstof (N)
8,3%	Kalium (K) vandopløseligt
3,4%	Svovl (S) vandopløseligt
3,0%	Jern (Fe)

Lavt kloridindhold. Bør kun bruges når det er konstateret, at der er behov for det. De passende dosisrater må ikke overskrides.

Importeres i Danmark af: Floratine Norge AS  
Gullfunnet 50  
1570 DILLING

**Applikationsrater: 20-30 g/m<sup>2</sup> (200-300 kg/ha)**

**Brugsanvisninger:** Kom produktet på aktivt voksende grønsvær ved 20-30 g/m<sup>2</sup>. Kom det på tørre græsstrå. Vand efter påføringen med 5 to 6 mm kunstvanding. Hvis temperaturen er over 25°C eller hvis man ikke kan undgå at komme det på fuktig eller våd grønsvær, skal man kunstvande øjeblikkeligt efter påføringen. Kom det på langsomt hvis temperaturen er over 25°C. Må ikke kommes på putting greens. Dette produkt indeholder jern, som kan plette beton og andre overflader. Fjern partikler med det samme ved at feje eller blæser for at undgå pletter. MÅ IKKE VASKES AF MED VAND. Opbevares et rent, tørt sted. Forsej den åbne pose igen ved at folde toppen ned og fastgøre den. Brug kun rene, tørre spreder. Der må ikke efterlades ubrugt produkt i en spreder.

België	EC-KUNSTMEST NK KUNSTMEST MET Fe 26 + 0 + 10 + Fe
26,0%	totaal stikstof (N) 26,0% ureumstikstof (N)
10,0%	kaliumoxide (K <sub>2</sub> O), in water oplosbaar
8,5%	zwaveltrioxide (SO <sub>3</sub> ) in water oplosbaar
3,0%	ijzer (Fe)

Laag chloridegehalte. Alleen gebruiken waar dit zichtbaar nodig is. Aanbevolen hoeveelheden niet overschrijden.

Importeur voor België: Sports Management bvba  
Lorkenlaan 14  
2950 Kapellen – België

**Aan te brengen hoeveelheden: 20-30 g/m<sup>2</sup> (200-300 kg/ha)**

**Gebruiksaanwijzing:** Product aanbrengen op groeiend gras. Hoeveelheid: 20-30 g/m<sup>2</sup>. Op droog gras aanbrengen. Na aanbrengen gras bewateren (5 à 6 mm). Bij temperaturen > 25 °C of als aanbrengen op vochtig of nat gras onmiddellijk is, onmiddellijk na aanbrengen bewateren. Bij temperaturen > 25 °C slechts in kleine hoeveelheden aanbrengen. Niet gebruiken op putting greens. Dit product bevat ijzer, wat op beton en andere oppervlakken roestvlekken kan veroorzaken. Gemorst deeltjes onmiddellijk opvegen of wegblazen om vlekken te voorkomen. NIET MET WATER AFSPOELEN. Op een schone, droge plaats bewaren. Geopende verpakking sluiten door bovenkant omhoog te vouwen en te bevestigen. Uitsluitend schone, droge strooimachines gebruiken. Restanten/niet-gebruikt product volledig uit strooimachines verwijderen.

Belgique	ENGRAIS EC ENGRAIS NK AVEC Fe 26 + 0 + 10 + Fe
26,0%	Azote totale (N) 26,0% Azote uréique (N)
10,0%	Oxyde de potassium (K <sub>2</sub> O) soluble dans l'eau
8,5%	Trioxyde de soufre (SO <sub>3</sub> ) soluble dans l'eau
3,0%	Fer (Fe)

Faible teneur en chlorure. À utiliser uniquement en cas de besoin reconnu. Ne pas excéder les taux de dosage appropriés.

Importé en Belgique par: Sports Management bvba  
Lorkenlaan 14  
2950 Kapellen – Belgique

**Taux d'application : 20-30 g/m<sup>2</sup> (200-300 kg/ha)**

**Mode d'emploi :** Appliquer le produit sur le gazon en plaques en état de croissance active à un taux de 20-30 g/m<sup>2</sup>. Appliquer sur le feuillage sec. Arroser après application avec 5 à 6 mm d'irrigation. Dans des températures supérieures à 25°C ou si l'application pour humidifier ou mouiller le gazon est inévitable, irriguer immédiatement après application. Appliquer à de faibles taux si les températures sont supérieures à 25°C. Ne pas utiliser sur les verts de rouler. Ce produit contient du fer, susceptible de tacher le béton et d'autres surfaces. Éliminer rapidement les particules en balayant ou en soufflant pour éviter toute tache. NE PAS LAYER À L'EAU. Entreposer dans un endroit propre et sec. Refermer hermétiquement le sac ouvert en repliant le haut et en sécurisant. Utiliser uniquement des épanduses propres et sèches. Ne pas laisser de produit non utilisé dans les épanduses.

Greece - Αρθή. Κυκλοφορίας: 31	26 + 0 + 10 + Fe
26,0%	Ολικό άζωτο (N) 26,0% Άζωτο ουρίας*
10,0%	Διαλυτή ποτάσσα (K <sub>2</sub> O) από θειικό κάλιο
3,4%	Ολικό θείο (S) από θείο
3,0%	Σίδηρος (Fe) από οξειδίο σιδήρου

\*19,5% διαθέσιμο βραδέως άζωτο από πολυμερές επικάλυψη ουρίας επιχρισμένη με θείο

Εισαγωγή στην Ελλάδα από: Georponikos Oikos  
3 Makedonias St., Athens, GREECE

**Ρυθμοί εφαρμογής 20-30 g/m<sup>2</sup> (200-300 kg/ha)**

**Οδηγίες χρήσης:** Εφαρμόστε το προϊόν σε γκαζόν που αναπτύσσεται ενεργά στα 20-30 g/m<sup>2</sup>. Εφαρμόστε σε ζήρη φυλλωσιά. Ποτίστε μετά από την εφαρμογή με 5 έως 6 mm άρδευσης. Αν η θερμοκρασία υπερβαίνει τους 25°C ή αν είναι αδύνατον να μην κάνετε την εφαρμογή σε υγραμένο ή υγρό γκαζόν, ποτίστε αμέσως μετά την εφαρμογή. Εφαρμόστε με αργό ρυθμό, εάν οι θερμοκρασίες ξεπερνούν τους 25°C. Μη χρησιμοποιείτε σε γκαζόν «putting green». Το προϊόν αυτό περιέχει σίδηρο που μπορεί να προκαλέσει λεκέδες σε ταϊμέντο και άλλες επιφάνειες. Καθαρίστε τα σωματίδια αμέσως με σκούπισμα ή φύσημα για να αποφευχθεί το λέκιασμα. ΜΗΝ ΞΕΠΛΑΝΕΤΕ ΜΕ ΝΕΡΟ. Αποθηκεύστε σε καθαρό, ξηρό χώρο. Να είναι σφραγιστεί τις ανοιχτές σακούλες διπλώνοντας το πάνω μέρος προς τα κάτω και ασφαλιζόντας το. Να χρησιμοποιείτε μόνο καθαρά, στεγνά μηχανήματα σποράς. Μην αφήσετε προϊόν στα υπανήματα σποράς μετά τη χρήση.

Taiwan (R.O.C.)	26 + 0 + 10 + Fe
26.0%	Total Nitrogen (N) 26.0% Urea Nitrogen*
10.0%	Soluble Potash (K <sub>2</sub> O) from potassium sulfate
3.4%	Total Sulfur (S) from sulfate
3.0%	Iron (Fe) from iron oxide

\*19.5% Slowly available nitrogen from polymer coated urea.

**Application rates: 20-30 g/m<sup>2</sup> (200-300 kg/ha)**

**Directions for use:** Apply product to actively growing turf at 20-30 g/m<sup>2</sup>. Apply to dry foliage. Water in after application with 5 to 6 mm of irrigation. If temperatures exceed 25°C or if application to damp or wet turf is unavoidable, irrigate immediately after application. Apply at low rates if temperatures exceed 25°C. Do not use on putting greens. This product contains iron which may stain concrete and other surfaces. Remove particles promptly by sweeping or blowing to avoid staining. DO NOT WASH OFF WITH WATER. Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing. Use only clean, dry spreaders. Do not leave unused product in spreaders.

Australia	26 + 0 + 8.3 + Fe
26.0%	Total Nitrogen (N) 26.0% Urea Nitrogen
8.3%	Potassium (K) from potassium sulfate
3.4%	Sulfur (S) from sulfate
3.0%	Iron (Fe) from ferric oxide

\*19.5% Slowly available nitrogen from polymer coated urea.

**Application rates: 2.0-3.0 kg/100 m<sup>2</sup> (200-300 kg/ha)**



**Directions for use:** Apply product to actively growing turf at 2.0-3.0 kg/100 m<sup>2</sup>. Apply to dry foliage. Water in after application with 5 to 6 mm of irrigation. If temperatures exceed 25°C or if application to damp or wet turf is unavoidable, irrigate immediately after application. Apply at low rates if temperatures exceed 25°C. Do not use on putting greens. This product contains iron which may stain concrete and other surfaces. Remove particles promptly by sweeping or blowing to avoid staining. DO NOT WASH OFF WITH WATER. Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing. Use only clean, dry spreaders. Do not leave unused product in spreaders.

New Zealand	26 + 0 + 8.3 + Fe
26.0%	Total Nitrogen (N) 26.0% Urea Nitrogen
8.3%	Potassium (K) from potassium sulfate
3.4%	Sulfur (S) from sulfate
3.0%	Iron (Fe) from ferric oxide

\*19.5% Slowly available nitrogen from polymer coated urea.

**Application rates: 20-30 g/m<sup>2</sup> (200-300 kg/ha)**

**Directions for use:** Apply product to actively growing turf at 20-30 g/m<sup>2</sup>. Apply to dry foliage. Water in after application with 5 to 6 mm of irrigation. If temperatures exceed 25°C or if application to damp or wet turf is unavoidable, irrigate immediately after application. Apply at low rates if temperatures exceed 25°C. Do not use on putting greens. This product contains iron which may stain concrete and other surfaces. Remove particles promptly by sweeping or blowing to avoid staining. DO NOT WASH OFF WITH WATER. Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing. Use only clean, dry spreaders. Do not leave unused product in spreaders.

	Ground Speed	Width of Coverage	Spreader Settings		
			20 g/m <sup>2</sup>	25 g/m <sup>2</sup>	30 g/m <sup>2</sup>
	5 km/hr	3.6 m	L 1/2	M 1/2	N 1/2
	7 km/hr	12.1 m	6	6 1/2	7
	7 km/hr	9.7 m	33	36	39

Suggested spreader settings are not intended to replace calibration. Please calibrate your spreader before applying product.



The Andersons logo is a registered trademark of The Andersons, Inc.; PolySports and Extend are trademarks of The Andersons, Inc.

Manufactured by:  
The Andersons, Inc.  
P. O. Box 119  
Maumee, OH 43537  
U.S.A.  
AndersonsPro.com

# 25 kg/net

# 10005515

J24

