

Andersons Golf Products Turf Fertilizer

SGN 100

0 + 0 + 50

(0 + 0 + 41.5)

USA/INT 0 + 0 + 50 50.0% Soluble Potash (K₂O) from potassium sulfate 17.0% Total Sulfur (S) from sulfate Application rates: 10–20 g/m² (100–200 kg/ha) Directions for use: Apply product to actively growing turf at 10–20 g/m². Apply to dry foliage. Water in after application with 5 to 6 mm of irrigation. If temperatures exceed 25°C or if application to damp or wet turf is unavoidable, irrigate immediately after application. Apply at low rates if temperatures exceed 25°C. This product contains iron which may stain concrete and other surfaces. Remove particles promptly by sweeping or blowing to avoid staining. DO NOT WASH OFF WITH WATER. Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing. Use only clean, dry spreaders. Do not leave unused product in spreaders.	UK/EC EC FERTILISER 0 + 0 + 50 50.0% Potassium oxide (K₂O) water soluble 42.5% Sulphur Trioxide (SO₃) water soluble Low in chloride. To be used only where there is a recognised need. Do not exceed the appropriate dose rates. Import in U.K. by: Greentech Sportsturf Ltd. Block 5 Unit 1 - Bandeath Industrial Estate Throsk, Stirling - Scotland FK7 7NP Application rates: 10–20 g/m² (100–200 kg/ha) Directions for use: Apply product to actively growing turf at 10–20 g/m². Apply to dry foliage. Water in after application with 5 to 6 mm of irrigation. If temperatures exceed 25°C or if application to damp or wet turf is unavoidable, irrigate immediately after application. Apply at low rates if temperatures exceed 25°C. This product contains iron which may stain concrete and other surfaces. Remove particles promptly by sweeping or blowing to avoid staining. DO NOT WASH OFF WITH WATER. Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing. Use only clean, dry spreaders. Do not leave unused product in spreaders.	Eire/EC EC FERTILISER 0 + 0 + 50 41.5% Potassium (K) water soluble 17.0% Sulphur (S) water soluble Low in chloride. To be used only where there is a recognised need. Do not exceed the appropriate dose rates. Import in EIRE by: Greentech Sportsturf Ltd. Block 5 Unit 1 - Bandeath Industrial Estate Throsk, Stirling, Scotland FK7 7NP Application rates: 10–20 g/m² (100–200 kg/ha) Directions for use: Apply product to actively growing turf at 10–20 g/m². Apply to dry foliage. Water in after application with 5 to 6 mm of irrigation. If temperatures exceed 25°C or if application to damp or wet turf is unavoidable, irrigate immediately after application. Apply at low rates if temperatures exceed 25°C. This product contains iron which may stain concrete and other surfaces. Remove particles promptly by sweeping or blowing to avoid staining. DO NOT WASH OFF WITH WATER. Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing. Use only clean, dry spreaders. Do not leave unused product in spreaders.	France/EC ENGRAIS EC ENGRAIS POTASSIQUE 0 + 0 + 50 50,0% Oxyde de potassium (K₂O) soluble dans l'eau 42,5% Anhydride sulfurique (SO₃) soluble dans l'eau Faible teneur en chlorure. À utiliser uniquement en cas de besoin reconnu. Ne pas dépasser les débits de dose appropriés. Importé en France par: LOB GREEN S.A.S. 25 Rue de la Chapelle GOURNAY, 62560 VERCHOCQ - France Taux d'application: 10–20 g/m² (100–200 kg/ha) Mode d'emploi: Appliquer le produit sur le gazon en plaques en état de croissance active à un taux de 10–20 g/m². Appliquer sur le feuillage sec. Arroser après application avec 5 à 6 mm d'irrigation. Dans des températures supérieures à 25°C ou si l'application pour humidifier ou mouiller le gazon est inévitable, irriguer immédiatement après application. Appliquer à de faibles taux si les températures sont supérieures à 25°C. Ce produit contient du fer, susceptible de tacher le béton et d'autres surfaces. Éliminer rapidement les particules en balayant ou en soufflant pour éviter toute tache. NE PAS LAVER À L'EAU. Entreposer dans un endroit propre et sec. Refermer hermétiquement le sac ouvert en repliant le haut et en sécurisant. Utiliser uniquement des épandeurs propres et sèches. Ne pas laisser de produit non utilisé dans les épandeurs.
Deutschland K-Dünger 50, mit Schwefel und Spurennährstoffen zur Düngung von Rasen Für Kinder unzugänglich aufbewahren! 50,0 % K₂O wasserlösliches Kaliumoxid 17,0 % S wasserlöslicher Schwefel Mit gebrochenem Kalkstein als Ausbringhamilfe. Nettogewicht: 22.68 kg Inverkehrbringer: Turf Handels GmbH, Am Hartboden 48, A-8101 Gratkorn Aufwandmenge: 10–20 g/m² (100–200 kg/ha) Anwendungsempfehlung: Während der Vegetationszeit mit 10–20 g/m² auf trockene Bestände ausbringen. Anschließend mindestens mit 5-6 mm beregnen, damit die Körner gleichmäßig in die Rasennarbe fallen. Bei Temperaturen über 25°C nur mit geringer Aufwandmenge streuen und sofort beregnen. Das Produkt enthält Eisen, das auf gepflasterten Oberflächen im Zusammenhang mit Wasser Flecken verursachen kann. Sollte Dünger auf derartige Oberflächen gelangen, nicht mit Wasser entfernen, sondern sofort abkehren. Trocken und sauber lagern, Restmengen dicht und trocken verschließen. Nur saubere Streuer benutzen, keine Restmengen im Streuwagen zurücklassen. Um Aufnahme des Düngers zu vermeiden, den ersten Schnitt ohne Fangkörbe durchführen.	Österreich Mineralischer Kalidünger, mit Spurennährstoffen 0-0-50 Für Kinder unzugänglich aufbewahren! 50,0 % K₂O wasserlösliches Kaliumoxid 17,0 % S wasserlöslicher Schwefel Komponenten: Kaliumsulfat. Nettogewicht: 22.68 kg Hersteller: Turf Handels GmbH, Am Hartboden 48, A-8101 Gratkorn Aufwandmenge: 10–20 g/m² (100–200 kg/ha) Anwendungsempfehlung: Während der Vegetationszeit mit 10–20 g/m² auf trockene Bestände ausbringen. Anschließend mindestens mit 5-6 mm beregnen, damit die Körner gleichmäßig in die Rasennarbe fallen. Bei Temperaturen über 25°C nur mit geringer Aufwandmenge streuen und sofort beregnen. Das Produkt enthält Eisen, das mit Wasser Flecken auf Pflastern und Platten hinterlassen kann. Wenn Düngerpartikel auf andere Oberflächen gelangen, unmittelbar nach dem Streuen durch Kehren oder Absaugen entfernen. Auf keinen Fall Abregnen, da es im Kombination mit Wasser zu Flecken kommt. Trocken und sauber lagern, Restmengen dicht und trocken verschließen. Nur saubere Streuer benutzen, keine Restmengen im Streuwagen zurücklassen. Um Aufnahme des Düngers zu vermeiden, den ersten Schnitt ohne Fangkörbe durchführen.	Italia CONCIME CE 0 + 0 + 50 50,0% Ossido di potassio (K₂O) solubile in acqua Basso contenuto di cloro. Da usare solo quando vi è un bisogno riconosciuto. Non superare i dosaggi appropriati. Prodotta e confezionata da: The Andersons, Inc., Maumee - 43537, OH (USA) Importato (fabbricante) da: BOTTOS s.r.l. via Lusevera,1 – 33078 San Vito al Tagliamento (PN) Distribuito da: EMERALD s.r.l. Dose: 10–20 g/m² (100–200 kg/ha) Indicazioni per l'uso: applicare 10–20 g/m² di prodotto su manto erboso in crescita. Applicare su manto asciutto. Irrigare dopo l'applicazione coprendo il manto erboso con 5 mm o 6 mm di acqua. Se la temperatura è superiore ai 25°C o se si è forzati ad applicare il prodotto su manti umidi o bagnati, irrigare immediatamente dopo l'applicazione. Applicare il prodotto a basse concentrazioni se la temperatura eccede i 25°C. Il presente prodotto contiene ferro, che potrebbe macchiare superfici in cemento o altri materiali. Per evitare che il prodotto macchi, rimuovere le particelle immediatamente o usando una scopa o un soffiatore. NON PULIRE USANDO ACQUA. Conservare in luogo asciutto e pulito. Risigillare il sacchetto aperto piegando ed assicurando la parte superiore. Usare solo spargitori puliti ed asciutti. Non lasciare prodotto non usato negli spargitori.	Norge K-gjødsel 0 – 0 – 42 (0 – 0 – 50) 41,5% Kalium (K) 50,0% kaliumoksyd (K₂O) 17,0% Svovel (S) Basert på kalium. Skal bare benyttes ved påvist behov til golf- og fotballbaner, park- og hagearealer. De anbefalte mengder må ikke overskrides. Distributør i Norge: Floratine Norge AS Gullfunnet 50 1570 Dilling, NORGE Anbefalte gjødselmengder: 10–20 g/m² (100–200 kg/ha) Gjødsla tilføres når graset er i vekst. Det vannes 4-5 minutter etter at gjødsling er utført, for å få gjødselkornene ned i plantebestandet. Bruk mindre gjødselmengder ved høge temperaturer (> 25°C), og vann øyeblikkelig for å unngå sviskader. Dette produktet inneholder jern som kan mislange betong og andre overflater. Fjern partikler omgående ved feiling eller blåsning. VASK IKKE BORT MED VANN. I forbindelse med gjødsling skal det kun benyttes tørre og reine gjødselspredere. La ikke gjødsel bli liggende igjen i sprederen. Gjødsla skal lagres tørt.
	España/CE ABONO CE Potásico 0 + 0 + 50 50,0% de óxido de potasio (K₂O) soluble en agua 42,5% de azufre (SO₃) soluble en agua Bajo en cloruro. Para ser utilizado sólo cuando haya una necesidad reconocida. No sobrepasar las dosis recomendadas. Importador para España: Dosis de aplicación: 10–20 grs./m² (100–200 Kg. / ha) Instrucciones de uso: Aplicación de productos en crecimiento activo del césped. Aplicar cuando la hoja esté seca. Regar después de la aplicación con 5 a 6 mm de agua de riego. Se aconseja aplicar sólo a dosis bajas si las temperatura es superior a 25°C. Regar inmediatamente después de la aplicación. Este producto contiene hierro que puede manchar zonas aplicadas u otras superficies. Eliminar las partículas sobrantes barriendo o soplando (máquinas sopladoras) para evitar manchas. NO SE LAVA CON AGUA. Conservar el envase en un lugar limpio y seco. Una vez abierto el saco evitar que entre humedad, asegúrese de cerrar la parte superior del saco. Utilice sólo abonadoras limpias y secas. No deje de producto no utilizado en las abonadoras.	Australia 0 + 0 + 41.5 41.5% Potassium (K) from potassium sulfate 17.0% Total Sulfur (S) from sulfate Application rates: 1.0–2.0 kg/100 m² (100–200 kg/ha) Directions for use: Apply product to actively growing turf at 1.0–2.0 kg/100 m². Apply to dry foliage. Water in after application with 5 to 6 mm of irrigation. If temperatures exceed 25°C or if application to damp or wet turf is unavoidable, irrigate immediately after application. Apply at low rates if temperatures exceed 25°C. This product contains iron which may stain concrete and other surfaces. Remove particles promptly by sweeping or blowing to avoid staining. DO NOT WASH OFF WITH WATER. Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing. Use only clean, dry spreaders. Do not leave unused product in spreaders.	New Zealand 0 + 0 + 41.5 41.5% Potassium (K) from potassium sulfate 17.0% Total Sulfur (S) from sulfate Application rates: 10–20 g/m² (100–200 kg/ha) Directions for use: Apply product to actively growing turf at 10–20 g/m². Apply to dry foliage. Water in after application with 5 to 6 mm of irrigation. If temperatures exceed 25°C or if application to damp or wet turf is unavoidable, irrigate immediately after application. Apply at low rates if temperatures exceed 25°C. This product contains iron which may stain concrete and other surfaces. Remove particles promptly by sweeping or blowing to avoid staining. DO NOT WASH OFF WITH WATER. Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing. Use only clean, dry spreaders. Do not leave unused product in spreaders.



Model 2000 (cone 9); 2000 SR (cone 9)



SSD Drop Spreader

Settings for single pass application = FULL RATE

Settings for single pass application = FULL RATE

Suggested spreader settings are not intended to replace calibration. Please calibrate your spreader before applying product.

Ground Speed	Width of Coverage	Spreader Settings		
		10 g/m ²	15 g/m ²	20 g/m ²
5 km/hr	2.4 m	I	J	K 1/4
5 km/hr	overlap wheels	3	3 1/2	4



Manufactured by:
The Andersons, Inc.
P. O. Box 119
Maumee, OH 43537
U.S.A.
AndersonsPro.com

22.68 kg/net

10004961

J24

CE

The Andersons logo is a registered trademark of The Andersons, Inc.