# Nutri DG®
## Greens - SGN 75

# 12 + 24 + 8 + Fe, Mn
## (12 + 10.5 + 6.6 + Fe, Mn)

## 50% MUtech®

### USA/INT
**12 + 24 + 8 + Fe, Mn**

12.0% Total Nitrogen (N)
- 6.0% Ammoniacal Nitrogen
- 0.9% Urea Nitrogen
- 3.0% Other Water Soluble Nitrogen from methylene ureas
- 2.1% Water Insoluble Nitrogen from methylene ureas

24.0% Available Phosphate ($P_2O_5$) from ammonium phosphate

8.0% Soluble Potash ($K_2O$) from potassium sulfate

4.1% Total Sulfur (S) from sulfate

0.3% Iron (Fe) water soluble from iron sulfate

0.5% Manganese (Mn) water soluble from manganese sulfate

**Application rates: 15-30 g/m$^2$ (150-300 kg/ha)**

**Directions for use:** Apply product to actively growing turf at 15-30 g/m$^2$. Apply to dry foliage. Immediately after application, apply a minimum of 5 mm of water to disperse particles into the root zone. Due to variations in temperature and water pH, best results are achieved by splitting the irrigation into 2 applications at 10-15 minutes apart. This will allow for more thorough particle dispersion into the root zone. Particle color may vary from lot to lot. Apply only at low rates if temperatures exceed 25°C and irrigate immediately after application. This product contains iron which may stain concrete and other surfaces. Remove particles promptly by sweeping or blowing to avoid staining. DO NOT WASH OFF WITH WATER. Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing. Use only clean, dry spreaders. Do not leave unused product in spreaders.

### UK/EC
**EC FERTILISER**
**NPK FERTILISER CONTAINING UREA FORMALDEHYDE WITH Mn**
**12 + 24 + 8 + Mn**

12.0% Total nitrogen (N)
- 6.0% Ammoniacal nitrogen (N)
- 0.9% Ureic nitrogen (N)
- 5.1% Nitrogen (N) from urea formaldehyde with
  - 3.0% Nitrogen (N) from urea formaldehyde only soluble in cold water
  - 1.1% Nitrogen (N) from urea formaldehyde only soluble in hot water

24.0% Phosphorous pentoxide ($P_2O_5$) soluble in neutral ammonium citrate and water with 22.6% water soluble $P_2O_5$

8% Potassium oxide ($K_2O$) water soluble

10.25% Sulphur Trioxide ($SO_3$) water soluble

0.5% Manganese (Mn) water soluble

Low in chloride. To be used only where there is a recognised need. Do not exceed the appropriate dose rates.

Import in U.K. by: Greentech Sportsturf Ltd.
Block 5 Unit 1 - Bandeath Industrial Estate
Throsk, Stirling - Scotland FK7 7NP

**Application rates: 15-30 g/m$^2$ (150-300 kg/ha)**

**Directions for use:** Apply product to actively growing turf at 15-30 g/m$^2$. Apply to dry foliage. Immediately after application, apply a minimum of 5 mm of water to disperse particles into the root zone. Due to variations in temperature and water pH, best results are achieved by splitting the irrigation into 2 applications at 10-15 minutes apart. This will allow for more thorough particle dispersion into the root zone. Particle color may vary from lot to lot. Apply only at low rates if temperatures exceed 25°C and irrigate immediately after application. This product contains iron which may stain concrete and other surfaces. Remove particles promptly by sweeping or blowing to avoid staining. DO NOT WASH OFF WITH WATER. Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing. Use only clean, dry spreaders. Do not leave unused product in spreaders.

### Eire/EC
**EC FERTILISER**
**NPK FERTILISER CONTAINING UREA FORMALDEHYDE WITH Mn**
**12 + 10.5 + 6.6 + Mn**

12.0% Total nitrogen (N)
- 6.0% Ammoniacal Nitrogen
- 0.9% Ureic Nitrogen
- 5.1% Nitrogen (N) from urea formaldehyde with
  - 3.0% Nitrogen (N) from urea formaldehyde only soluble in cold water
  - 1.1% Nitrogen (N) from urea formaldehyde only soluble in hot water

10.5% Phosphorus (P) soluble in neutral ammonium citrate and water with 9.8% water soluble P

6.6% Potassium (K) water soluble

4.1% Sulphur (S) water soluble

0.5% Manganese (Mn) water soluble

Low in chloride. To be used only where there is a recognised need. Do not exceed the appropriate dose rates.

Import in EIRE by: Greentech Sportsturf Ltd.
Block 5 Unit 1 - Bandeath Industrial Estate
Throsk, Stirling - Scotland FK7 7NP

**Application rates: 15-30 g/m$^2$ (150-300 kg/ha)**

**Directions for use:** Apply product to actively growing turf at 15-30 g/m$^2$. Apply to dry foliage. Immediately after application, apply a minimum of 5 mm of water to disperse particles into the root zone. Due to variations in temperature and water pH, best results are achieved by splitting the irrigation into 2 applications at 10-15 minutes apart. This will allow for more thorough particle dispersion into the root zone. Particle color may vary from lot to lot. Apply only at low rates if temperatures exceed 25°C and irrigate immediately after application. This product contains iron which may stain concrete and other surfaces. Remove particles promptly by sweeping or blowing to avoid staining. DO NOT WASH OFF WITH WATER. Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing. Use only clean, dry spreaders. Do not leave unused product in spreaders.

### France/EC
**ENGRAIS CE**
**ENGRAIS NPK CONTENANT DE L'UREE FORMALDEHYDE AVEC DU Mn**
**12 + 24 + 8 + Mn**

12.0% Azote (N) total
- 6.0% Azote (N) ammoniacal
- 0.9% Azote (N) uréique
- 5.1% Azote (N) de l'urée formaldehyde dont
  - 3.0% Azote (N) de l'urée formaldehyde uniquement soluble dans l'eau froide
  - 1.1% Azote (N) de l'urée formaldehyde uniquement soluble dans l'eau chaude

24.0% Anhydride phosphorique ($P_2O_5$) soluble dans le citrate d'ammonium neutre et dans l'eau et 22.6% $P_2O_5$ soluble dans l'eau

8.0% Oxyde de Potassium ($K_2O$) soluble dans l'eau

10.25% Anhydride sulfurique ($SO_3$) soluble dans l'eau

0.5% Manganèse (Mn) soluble dans l'eau

Pauvre en chlore. A n'utiliser qu'en cas de besoin reconnu. Ne pas dépasser les doses adéquates.

Importé en France par: LOB GREEN S.A.S.
25 Rue de la Chapelle
GOURNAY
62560 VERCHOCQ - France

**Taux d'application : 15 à 30 g/m$^2$ (150 à 300 kg/ha)**

**Mode d'emploi :** Appliquer le produit à la dose de 15 à 30 grammes par m$^2$ pour obtenir une croissance optimale du gazon. Appliquer par temps sec et sur un feuillage sec. Immédiatement après l'application, appliquer un minimum de 5 mm d'eau pour disperser les particules dans la zone de racines. En raison des variations de température et du pH de l'eau, les meilleurs résultats sont obtenus en divisant l'irrigation en 2 applications à 10-15 minutes d'écart. Ceci permettra une plus grande dispersion des particules dans la zone des racines. La couleur des particules peut varier d'un lot à un autre. En cas de chaleur supérieure à 25°C, minorer la dose et arroser immédiatement après application. Ce produit contient du fer qui peut tacher le béton et les autres surfaces dures ou poreuses. En cas d'application accidentelle sur ces surfaces, nettoyer en brossant ou soufflant afin d'éviter les taches. NE PAS NETTOYER AVEC DE L'EAU. Conserver le produit dans un endroit propre et sec. Refermer soigneusement le sac en repliant la partie supérieure et en l'attachant. Appliquer avec un épandeur propre et sec. Ne pas laisser de produit inutilisé dans les épandeurs.

### Deutschland
**Deklaration nach Deutscher Düngemittelverordnung 2012:**
**NPK-Dünger, 12-24-8 mit Spurennährstoffen**

12,0 % N Gesamtstickstoff davon:
- 6,0 % N Ammoniumstickstoff
- 0,8 % N Carbamidstickstoff
- 5,2 % N Formaldehydharnstoff
  - 3,0 % N kaltwasserlöslicher Formadehydharnstoff
  - 2,2 % N nur heißwasserlöslicher Formaldehydharnstoff

24,0% $P_2O_5$ neutralammoncitrat- und wasserlösliches Phosphat
22,3 % $P_2O_5$ wasserlösliches Phosphat

8,0 % $K_2O$ wasserlösliches Kaliumoxid

0,3 % Fe Eisen

0,5 % Mn Mangan

**Nettogewicht: 20 kg**

**Inverkehrbringer:** Turf Handels GmbH, Am Hartboden 48, A-8101 Gratkorn

**Hinweise zur sachgerechten Lagerung:** In der Originalverpackung trocken, kühl, frostfrei lagern. Restmengen dicht und trocken verschließen. Für Kinder und Haustiere unerreichbar aufbewahren.
**Anwendung:** Starterdünger für Neueinsaaten und Nachsaaten oder auf P-Mangelstandorten von Tiefschnittrasen. Während der Vegetationszeit mit 15-30 g/m² auf möglichst trockene Bestände von Golfgreens oder anderen Rasenflächen ausbringen. Anschließend kurz mit 3-4 mm abregnen. Das Produkt enthält Eisen, das auf gepflasterten Oberflächen im Zusammenhang mit Wasser Flecken verursachen kann. Sollte Dünger auf derartige Oberflächen gelangen, nicht mit Wasser entfernen, sondern sofort abkehren. Bei Temperaturen über 30°C nur mit geringer Aufwandmenge streuen und sofort beregnen.
- Hinweis: Empfehlungen der amtlichen Beratungen gehen vor. Nur bei tatsächlichem Bedarf und unter Einhaltung der Aufwandmenge anwenden.

Für alle Zier- und Sportrasenflächen.

### Österreich
**12-24-8 NutriDG**
**Deklaration nach der Österreichischen Düngemittelverordnung 2004 (zuletzt geändert am 07.06.2022):**
**Mineralischer NPK-Dünger mit Spurennährstoffen**

12,0 % N Gesamtstickstoff
- 6,0 % N Ammoniumstickstoff
- 0,8 % N Carbamidstickstoff
- 5,2 % N Formaldehydharnstoff
  - 3,0 % N kaltwasserlöslicher Formaldehydharnstoff
  - 2,2 % N nur heißwasserlöslicher Formaldehydharnstoff

24,0 % $P_2O_5$ neutralammoncitrat- und wasserlösliches Phosphat
22,3% $P_2O_5$ wasserlösliches Phosphat

8,0 % K2O wasserlösliches Kaliumoxid

0,3 % Fe Eisen

0,5 % Mn Mangan

Enthält 43 % Langzeitstickstoff

**Hinweise zur sachgerechten Lagerung:** In der Originalverpackung trocken, kühl, frostfrei lagern. Restmengen dicht und trocken verschließen. Für Kinder und Haustiere unerreichbar aufbewahren.
**Anwendung:** Starterdünger für Neueinsaaten und Nachsaaten oder auf P-Mangelstandorten von Tiefschnittrasen. Während der Vegetationszeit mit 15-30 g/m² auf möglichst trockene Bestände von Golfgreens oder anderen Rasenflächen ausbringen. Anschließend kurz mit 3-4 mm abregnen. Das Produkt enthält Eisen, das auf gepflasterten Oberflächen im Zusammenhang mit Wasser Flecken verursachen kann. Sollte Dünger auf derartige Oberflächen gelangen, nicht mit Wasser entfernen, sondern sofort abkehren. Bei Temperaturen über 30°C nur mit geringer Aufwandmenge streuen und sofort beregnen.
- Hinweis: Empfehlungen der amtlichen Beratungen gehen vor. Nur bei tatsächlichem Bedarf und unter Einhaltung der Aufwandmenge anwenden.
**Sicherheitshinweis:** Nach der Anwendung Hände und eventuell anders berührte Hautstellen gründlich waschen.
**Anwendungsbereich:** Hobbygarten, GaLa-Bau, Golf- und Sportanlagen
**Hersteller:** TURF Handels GmbH, Am Hartboden 48, AT-8101 Gratkorn
**Gewicht: 20 kg**

### Italia
**FERTILIZZANTE EC**
**FERTILIZZANTE NPK CONTENENTE UREA FORMALDEIDE CON Mn**
**12 + 24 + 8 + Mn**

12,0% Totale azoto (N)
- 6,0% Azoto ammoniacato (N)
- 0,9% Azoto ureico (N)
- 5,1% Azoto (N) da urea formaldeide con
  - 3,0% Azoto (N) da urea formaldeide solubile solo in acqua fredda
  - 1,1% Azoto (N) da urea formaldeide solubile solo in acqua calda

24,0% di pentossido di fosforo ($P_2O_5$) solubile in citrato di ammonio neutro e acqua con 22,6% di $P_2O_5$ solubile in acqua

8% di ossido di potassio ($K_2O$) solubile in acqua

10,25% di triossido di zolfo ($SO_3$) solubile in acqua

0,5% di manganese (Mn) solubile in acqua

Basso contenuto di cloro. Da usare solo quando vi è un bisogno riconosciuto. Non superare i dosaggi appropriati.

Importato (fabbricante) da: BOTTOS s.r.l.
via Lusevera,1 – 33078 San Vito al Tagliamento (PN)

Distribuito da: EMERALD s.r.l.

**Tassi di applicazione:** 15-30 g/m$^2$ (150-300 kg/ha)

**Istruzioni per l'uso:** applicare 15-30 g/m$^2$ di prodotto su manto erboso in crescita. Applicare su manto asciutto. Immediatamente dopo l'applicazione, irrigare con almeno 5 mm di acqua per consentire uno spargimento delle particelle nell'area della radice. A causa delle variazioni della temperatura e del pH dell'acqua, si ottengono i migliori risultati dividendo il processo d'irrigazione in due applicazioni da 10-15 minuti ciascuna. Questo consente un migliore spargimento delle particelle nell'area della radice. Il colore delle particelle può variare da lotto a lotto. Se la temperatura eccede i 25°C applicare solo dosaggi bassi ed irrigare immediatamente dopo l'applicazione. Il presente prodotto contiene ferro, che potrebbe macchiare superfici in cemento o altri materiali. Per evitare che il prodotto macchi, rimuovere le particelle immediatamente o usando una scopa applicare o un soffiatore. NON PULIRE USANDO ACQUA. Conservare in luogo asciutto e pulito. Risigillare il sacchetto aperto piegando ed assicurando la parte superiore. Usare solo spargitori puliti ed asciutti. Non lasciare prodotto non usato negli spargitori.

### Sverige
**EG-GÖDSELMEDEL**
**NPK-GÖDSELMEDEL SOM INNEHÅLLER UREA FORMALDEHYD MED Mn**
**12 + 10,5 + 6,6 + Mn**

12,0% Total andel kväve (N)
- 6,0% Ammoniakkväve (N)
- 0,9% Kväve (N) som urea
- 5,1% Urea Formaldehyd
  - 3,0% kväve (N) från urea-formaldehyd endast lösligt i kallt vatten
  - 1,1% kväve (N) från urea-formaldehyd endast lösligt i varm vatten

10,5% Fosfor (P) löslig i neutralt ammoniumcitrat och vatten med 9,8% P vattenlöslig

6,6% Kalium (K) vattenlöslig

4,1% Svavel (S) vattenlöslig

0,5% Mangan (Mn) vattenlöslig

Låg kloridhalt. Bör kunna användas när det konstateras att det föreligger behov för dess användning. De passande dosraterna får ej överskridas.

Distributör i Sverige: Floratine Scandinavia AB
c/o Floratine Norge AS
Gullfunnet 50
1570 Dilling, NORGE

**Dosering: 15-30 g/m$^2$ (150-300 kg/ha)**

**Bruksanvisning:** Tillsätt 15-30 g/m$^2$ av produkten till aktivt växande torv. Tillsätt produkten till torra löv. Omedelbart efter appliceringen, applicera ett minimum av 5 mm vatten för att dispergera partiklar in i rotzonen. På grund av variationer i temperatur och vattnets pH, uppnås de bästa resultaten genom att dela upp bevattning i 2 applikationer vid 10-15 minuters mellanrum. Detta kommer att möjliggöra mer noggrann partikel dispersionen i rotzonen. Partikel färg kan variera från parti till parti. Tillsätt endast en liten mängd om temperatur överstiger 25°C och vattna omedelbart efter gödsling. Den här produkten innehåller järn vilket kan orsaka fläckar på betong och andra ytor. Ta bort partiklar omgående genom att borsta eller blåsa för att undvika fläckar. TVÄTTA INTE BORT MED VATTEN. Förvara på en ren, torr plats. Förslut öppnad förpackning genom att vika ned och fästa den övre kanten. Använd endast rena, torra gödselspridare. Lämna inte kvar oanvänd produkt i gödselspridarna.

### Norge
**EC GJØDNING**
**NPK GJØDNING INNEHOLDER UREAFORMALDEHYD MED Mn**
**12 + 10,5 + 6,6 + Mn**

12,0% Samlet Nitrogen (N)
- 6,0% Ammoniakknitrogen (N)
- 0,9% Ureanitrogen (N)
- 5,1% Ureaformaldehyd
  - 3,0% Nitrogen (N) fra ureaformaldehyd er bare oppløselig i kaldt vann
  - 1,1% Nitrogen (N) fra ureaformaldehyd er bare oppløselig i varmt vann

10,5% Fosfor (P) oppløselig i nøytralt ammoniumcitrat og vann med 9,8% P oppløselig i vann

6,6% Kalium (K) oppløselig i vann

4,1% Svovel (S) oppløselig i vann

0,5% Mangan (Mn) oppløselig i vann

Lav i klorid. Skal bare brukes når det er fastslått at der er behov for det. Riktige doser må ikke overskrides.

Import in NORGE by: Floratine Norge AS
Gullfunnet 50, 1570
Dilling, NORWAY

**Påføringsrate: 15-30 g/m$^2$ (150-300 kg/ha)**

**Bruksanvisning:** Påfør produktet på voksende torv med 15-30 g/m$^2$. Påfør på tørt løvverk. Umiddelbart etter påføringen, påføre et minimum av 5 mm vann for å dispergere partikler i rotzonen. På grunn av variasjoner i temperatur og pH-verdi I vann, er de beste resultater oppnådd ved å splitte vanning i 2 applikasjoner ved 10-15 minutters mellomrom. Dette vil gi rom for mer grundig partikkel spredning i rotzonen. Partikkel fargen kan variere fra parti til parti. Påfør kun med lave rater hvis temperaturen overskrider 25°C og vann øyeblikkelig etter påføring. Dette produktet inneholder jern som kan misfarge betong og andre overflater. Fjern partikler omgående ved å feie eller blåse før å unngå misfarging. VASK IKKE BORT MED VANN. Lagre produktet på et tørt, rent sted. Tett igjen den åpnede posen etter bruk ved å brette ned toppen og forvar den på et sikkert sted. Bruk bare rene, tørre spredere. Ikke la rester av produktet bli liggende i spredereren.

### Denmark
**EC KUNSTGØDNING**
**NPK KUNSTGØDNING INDEHOLDENDE FRA UREAFORMALDEHYD MED Mn**
**12 + 10,5 + 6,6 + Mn**

12,0% Samlet kvælstof (N)
- 6,0% Ammoniumkvælstof
- 0,9% Ureakvælstof
- 5,1% Kvælstof (N) fra ureaformaldehyd med
  - 3,0% kvælstof (N) fra ureaformaldehyd kun opløseligt i koldt vand
  - 1,1% kvælstof (N) fra ureaformaldehyd kun opløseligt i varmt vand

10,5% Fosfor (P) opløseligt i neutral ammoniumcitrat og vand med 9,8% vandopløseligt P

6,6% Kalium (K) vandopløseligt

4,1% Svovl (S) vandopløseligt

0,5% Mangan (Mn) vandopløseligt

Lavt kloridindhold. Bør kun bruges når det er konstateret, at der er behov for det. De passende dosisrater må ikke overskrides.

Importeres i Danmark af: Floratine Norge AS
Gullfunnet 50
1570 DILLING

**Applikationsrater:** 15-30 g/m$^2$ (150-300 kg/ha)

**Brugsanvisninger:** Kom produktet på aktivt voksende grønsvær ved 15-30 g/m$^2$. Påføres på tørre blade. Umiddelbart efter påføringen, påføres mindst 5 mm vand at dispergere partikler i rodzonen. På grund af variationer i temperatur og vand pH, er de bedste resultater opnået ved at opdele kunstvanding i 2 ansøgninger på 10-15 minutter fra hinanden. Dette vil give mulighed for mere grundig dispersion i rodzonen. Partikel farve kan variere fra parti til parti. Nedsæt påføringsmængden, hvis temperaturen overstiger 25 °C og overrisl umiddelbart efter påføring. Dette produkt indeholder jern, som kan plette beton og andre overflader. Fjern partikler med det samme ved at feje eller blæser for at undgå pletter. MÅ IKKE VASKES AF MED VAND. Opbevares et rent, tørt sted. Forsegl den åbne pose igen ved at folde toppen ned og fastgøre den. Brug kun rene, tørre spredere. Der må ikke efterlades ubrugt produkt i en spreder.

### Canada
**12 + 24 + 8 + Fe, Mn**

Registration Number XXXXXXXXXM Fertilizers Act
Lot# xxxxxxx
50% of Nitrogen from MUtech®

**GUARANTEED MINIMUM ANALYSIS**

12.0% Total Nitrogen (N)
- 6.0% Ammoniacal Nitrogen
- 0.9% Urea Nitrogen
- 2.1% Water Insoluble Nitrogen
- 3.0% Other Water Soluble Nitrogen*

24.0% Available Phosphate ($P_2O_5$)

8.0% Soluble Potash ($K_2O$)

4.1% Sulfur (S)

0.82% Iron (Fe) (actual)
- 0.82% Water Soluble Iron (Fe)

0.5% Manganese (Mn) (actual)
- 0.5% Water Soluble Manganese (Mn)

11.3% Ammonium Lignosulphonate

*3.00% Slowly available nitrogen from methylene ureas

**Application rates: 1.53 - 3.05 kg/100 m2 (3.13 - 6.25 lbs/1,000 sq. ft.)**

**Directions for use:** This product must be used on the basis of a soil or tissue analysis. Seek advice from the county agricultural representative or a professional agricultural consultant . Use Andersons Nutri DG® Dispersing Granule Technology 12-24-8 for greens and tees where a nitrogen, phosphate and potassium application is desired or when micronutrients are needed to help correct or prevent deficiencies during the growing season. Watering in this product will disperse each granule into thousands of particles. This will facilitate the movement of the nutrients into the soil. This particle dispersion will greatly reduce ball, shoe and mower pickup - minimizing nutrient loss.Application to wet, close-cut golf turf may result in foliar staining, which will discolor the turf to a brown/black appearance. This will occur even if immediate irrigation or rainfall occurs. Be sure to apply this product to dry turf only.
**Storage and use:** Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing. Use only clean, dry spreaders or applicators. Do not leave unused product in spreaders.
**Caution:** this fertilizer contains iron and manganese and should be used only as recommended. It may prove harmful when misused.
**PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT / PROTECTION MEASURES / CONTROLS:** RESPIRATORY PROTECTION: NIOSH approved respirator, if required. EYE PROTECTION: Safety glasses with side shields, goggles, or face shield. SKIN PROTECTION: Appropriate for the task. Impervious and compatible with material. VENTILATION: Use with adequate ventilation.

**ANALYSE MINIMALE GARANTIE**

Numéro d'enregistrement xxxxxxxM Loi sur les engrais
No de lot: xxxxxx
50% de l'azote de MUtech®

12,0% Azote (N) total
- 6,0% Azote Ammoniacal
- 0,9% Azote Uréique
- 3,0% Azote insoluble dans l'eau
- 2,1% Autre azote soluble dans l'eau*

24,0% Phosphate assimilable ($P_2O_5$)

8,0% Potasse soluble ($K_2O$)

4,1% Soufre (S)

0,82% Fer (Fe) (réel)
- 0,82% Fer soluble dans l'eau (Fe)

0,5% Manganèse (Mn) (réel)
- 0,5% Manganèse soluble dans l'eau (Mn)

0,5% Manganèse (Mn)

11,3% Lignosulfonate d'ammonium

*3,00% azote lentement assimilable des urées de méthylène

**Taux d'application: 1,53 – 3,05 kg/100 m² (3,13 – 6,25 lbs/1 000 pi²)**

**Mode d'emploi:** Ce produit doit être utilisé sur la base d'une analyse du sol ou des tissus. Demandez conseil au représentant agricole du comté ou à un consultant agricole professionnel.Utiliser la Technologie de dispersion de granules Andersons Nutri DG® 12-24-8 pour les verts et les départs où une application d'azote, de phosphate et de potassium est désirée ou lorsque des oligo-éléments sont nécessaires pour permettre de rectifier ou de prévenir des déficiences durant la saison de croissance. L'application de ce produit par arrosage dispersera chaque granule dans des milliers de particules. Ceci facilitera le mouvement des substances nutritives dans le sol. Cette dispersion de particules diminuera considérablement l'adhésion aux balles, chaussures et tondeuse – minimisant ainsi la perte de substances nutritives. Une application sur un gazon de golf mouillé et coupé de près risque d'entraîner une coloration foliaire, qui va décolorer le gazon en lui donnant un aspect marron/noir. Ceci se produira même si une irrigation ou une chute de pluie immédiate se produit. S'assurer d'appliquer ce produit sur du gazon sec uniquement.
**Entreposage et utilisation:** Entreposer dans un endroit propre et sec. Refermer hermétiquement le sac ouvert en repliant le haut et en sécurisant. Utiliser uniquement des épandeuses propres et sèches. Ne pas laisser de produit non utilisé dans les épandeuses.
**Attention:** cet engrais contient du fer et du manganèse et ne doit être utilisé que selon les recommandations. Il peut s'avérer nocif lorsqu'il est mal utilisé.
**ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE / MESURES DE PROTECTION / CONTRÔLES:** PROTECTION RESPIRATOIRE: Respirateur approuvé par le NIOSH, au besoin. PROTECTION DES YEUX: Lunettes de sécurité avec écrans latéraux, lunettes ou écran facial. PROTECTION DE LA PEAU: Approprié pour la tâche. Imperméable et compatible avec le matériau VENTILATION: Utiliser avec une ventilation adéquate.

### España/CE
**ABONO CE**
**ABONO COMPLEJO**
**ABONO NPK contenido urea formaldehído con Mn**
**12 + 24 + 8 + Mn**

12,0% Nitrógeno total (N)
- 6,0% Nitrógeno amoniacal (N)
- 0,9% de nitrógeno ureico (N)
- 5,1% Nitrógeno (N) de la urea con el formaldehído
  - 3,0% Nitrógeno (N) sólo de la urea formaldehído soluble en agua fría
  - 1,1% Nitrógeno (N) de la urea formaldehído soluble únicamente en agua caliente

24,0% Pentóxido de fósforo ($P_2O_5$) soluble en citrato amónico neutro y agua con 22,6% soluble en agua $P_2O_5$

8,0% de óxido de potasio ($K_2O$) soluble en agua

10,25% de azufre ($SO_3$) soluble en agua

0,5% Manganeso (Mn) soluble en agua

Bajo en cloruro. Para ser utilizado sólo cuando haya una necesidad reconocida. No sobrepasar las dosis recomendadas.

Importador para España:

**Dosis de aplicación: 15-30 grs./m$^2$ (150-300 kg / ha)**

**Instrucciones de uso:** Aplicación de productos en crecimiento activo del césped. Aplicar cuando la hoja esté seca. Inmediatamente después de la aplicación, aplique un mínimo de 5 mm de agua para dispersar las partículas en la zona de raíces. Debido a las variaciones en la temperatura y el pH del agua, los mejores resultados se consiguen dividiendo el riego en 2 aplicaciones de 10-15 minutos aparte. Esto permitirá una dispersión más completa de las partículas en la zona de las raíces. El color de las partículas puede variar de un lote a otro. Se aconseja aplicar sólo a dosis bajas si las temperatura es superior a 25°C. Regar inmediatamente después de la aplicación. Este producto contiene hierro que puede manchar zonas aplicadas u otras superficies. Eliminar las partículas sobrantes barriendo o soplando (máquinas sopladoras) para evitar manchas. NO SE LAVA CON AGUA. Conservar el envase en un lugar limpio y seco. Una vez abierto el saco evitar que entre humedad, asegúrese de cerrar la parte superior del saco. Utilice sólo abonadoras limpias y secas. No deje el producto no utilizado en las abonadoras.

### Greece - Αριθμ. Κυκλοφορίας: 31
**12 + 24 + 8 + Fe, Mn**

12,0% Ολικό άζωτο (N)
- 6,0% Αμμωνιακό άζωτο
- 0,9% Άζωτο ουρίας
- 3,0% Άλλο υδατοδιαλυτό Άζωτο από ουρίες μεθυλενίου
- 2,1% Αδιάλυτο στο νερό Άζωτο από ουρίες μεθυλενίου

24,0% Διαθέσιμο φωσφορικό ($P_2O_5$) από το όξινο φωσφορικό αμμώνιο

8,0% Διαλυτή Ποτάσσα ($K_2O$) από θειικό κάλιο

4,1% Ολικό θείο (S) από θειικό άλας

0,3% Σίδηρος (Fe) υδατοδιαλυτός από θειικό σίδηρο

0,5% Μαγγάνιο (Mn) υδατοδιαλυτό από θειικό μαγγάνιο

Εισαγωγή στην Ελλάδα από: Geoponikos Oikos
3 Makedonias St., Athens, GREECE

**Ρυθμοί εφαρμογής: 15-30 g/m$^2$ (150-300 kg/ha)**

**Οδηγίες χρήσης:** Εφαρμόστε το προϊόν σε γκαζόν που αναπτύσσεται ενεργά στα 15-30 g/m$^2$. Εφαρμόστε σε ξηρή φυλλωσιά. Αμέσως μετά την εφαρμογή, ποτίστε με τουλάχιστον 5 mm νερού για να διαλύσετε τα σωματίδια στη ζώνη ρίζας. Λόγω των διακυμάνσεων της θερμοκρασίας και του pH του νερού, τα καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται όταν μοιράζετε την άρδευση σε 2 εφαρμογές 10-15 λεπτών. Αυτό θα επιτρέψει την πιο καλή διασπορά σωματιδίων στη ζώνη ρίζας. Το χρώμα των σωματιδίων μπορεί να ποικίλλει από παρτίδα σε παρτίδα. Εφαρμόστε μόνο σε χαμηλούς ρυθμούς αν η θερμοκρασία υπερβαίνει τους 25°C και ποτίστε αμέσως μετά από την εφαρμογή. Το προϊόν αυτό περιέχει σίδηρο που μπορεί να προκαλέσει λεκέδες σε τσιμέντο και άλλες επιφάνειες. Καθαρίστε τα σωματίδια αμέσως με σκούπισμα ή φύσημα για να αποφύγετε το λέκιασμα. ΜΗΝ ΞΕΠΛΈΝΕΤΕ ΜΕ ΝΕΡΟ. Αποθηκεύστε σε καθαρό, ξηρό χώρο. Να ξανα σφραγίζετε τις ανοιχτές σακούλες διπλώνοντας το πάνω μέρος προς τα κάτω και ασφαλίζοντάς το. Να χρησιμοποιείτε μόνο καθαρά, στεγνά μηχανήματα σποράς. Μην αφήνετε προϊόν στα μηχανήματα σποράς μετά τη χρήση.

### Taiwan (R.O.C.)
**12 + 24 + 8 + Fe, Mn**

12.0% Total Nitrogen (N)
- 6.0% Ammoniacal Nitrogen
- 0.9% Urea Nitrogen
- 3.0% Other Water Soluble Nitrogen from methylene ureas
- 2.1% Water Insoluble Nitrogen from methylene ureas

24.0% Available Phosphate ($P_2O_5$) from ammonium phosphate

8.0% Soluble Potash ($K_2O$) from potassium sulfate

4.1% Total Sulfur (S) from sulfate

0.3% Iron (Fe) water soluble from iron sulfate

0.5% Manganese (Mn) water soluble from manganese sulfate

**Application rates: 15-30 g/m$^2$ (150-300 kg/ha)**

**Directions for use:** Apply product to actively growing turf at 15-30 g/m$^2$. Apply to dry foliage. Immediately after application, apply a minimum of 5 mm of water to disperse particles into the root zone. Due to variations in temperature and water pH, best results are achieved by splitting the irrigation into 2 applications at 10-15 minutes apart. This will allow for more thorough particle dispersion into the root zone. Particle color may vary from lot to lot. Apply only at low rates if temperatures exceed 25°C and irrigate immediately after application. This product contains iron which may stain concrete and other surfaces. Remove particles promptly by sweeping or blowing to avoid staining. DO NOT WASH OFF WITH WATER. Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing. Use only clean, dry spreaders. Do not leave unused product in spreaders.

**Warning**
MAY CAUSE EYE IRRITATION
MAY CAUSE RESPIRATORY IRRITATION

**Precautionary Statements**
Keep out of reach of children. Read label before use. If medical advice is needed, have product container or label on hand. Call a poison center/physician if unwell. If on skin, wash with plenty of soap and water. If skin irritation occurs, get medical advice. If in eyes, rinse cautiously with water for several minutes, remove contact lenses. If eye irritation persists, get medical advice. Wash hands after handling. Use only outdoors or in well ventilated areas. Avoid breathing dust. If inhaled, remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing. Store container tightly closed. Dispose of contents/container in accordance with national/regional/local regulations.
**First Aid**
If swallowed: If victim is alert and not convulsing, give one glass of water to dilute material, but DO NOT induce vomiting. Seek immediate medical attention. If on skin: Wash affected areas with soap and water. Seek medical attention if irritation persists. Wash contaminated clothing before reuse. If in eyes: Immediately flush with water for at least 20 minutes. Seek medical attention if irritation persists. If inhaled: Move victim to fresh air. Seek medical attention if irritation persists.

**Avertissement**
PEUT CAUSER UNE IRRITATION DES YEUX
PEUT CAUSER UNE IRRITATION RESPIRATOIRE

**Mises en garde**
Tenir hors de la portée des enfants. Lire l'étiquette avant utilisation. Si un avis médical est nécessaire, ayez un contenant ou une étiquette de produit à portée de main. Appelez un centre antipoison / médecin si malade. Si vous êtes sur la peau, lavez-vous avec beaucoup de savon et d'eau. En cas d'irritation de la peau, consultez un médecin. Si dans les yeux, rincer prudemment à l'eau pendant plusieurs minutes, enlever les lentilles de contact. Si l'irritation des yeux persiste, consultez un médecin. Lavez-vous les mains après la manipulation. Utiliser uniquement à l'extérieur ou dans des endroits bien ventilés. Evitez de respirer de la poussière. En cas d'inhalation, retirer à l'air frais et garder au repos dans une position confortable pour respirer. Entreposer le contenant hermétiquement fermé. Éliminer le contenu ou le contenant conformément aux réglementations nationales, régionales et locales.
**Premiers soins**
En cas d'ingestion : Si la victime est alerte et ne convulse pas, donnez un verre d'eau pour diluer le matériel, mais NE PAS provoquer de vomissements. Consulter immédiatement un médecin. Si sur la peau : Lavez les zones touchées avec de l'eau et du savon. Consulter un médecin si l'irritation persiste. Lavez les vêtements contaminés avant de les réutiliser. Si dans les yeux : Rincer immédiatement à l'eau pendant au moins 20 minutes. Consulter un médecin si l'irritation persiste. En cas d'inhalation : Déplacez la victime à l'air frais. Consulter un médecin si l'irritation persiste.

### Australia
**12 + 10.5 + 6.6 + Fe, Mn**

12.0% Total Nitrogen (N)
- 6.0% Ammoniacal Nitrogen
- 0.9% Urea Nitrogen
- 3.0% Other Water Soluble Nitrogen from methylene ureas
- 2.1% Water Insoluble Nitrogen from methylene ureas

10.5% Phosphorus (P) from ammonium phosphate

6.6% Potassium (K) from potassium sulfate

4.1% Sulfur (S) from sulfate

0.3% Iron (Fe) water soluble from ferrous sulfate

0.5% Manganese (Mn) water soluble from manganese sulfate

**Application rates: 1.5 - 3.0 kg/100 m$^2$ (150-300 kg/ha)**

**Directions for use:** Apply product to actively growing turf at 1.5 - 30 kg/100 m$^2$. Apply to dry foliage. Immediately after application, apply a minimum of 5 mm of water to disperse particles into the root zone. Due to variations in temperature and water pH, best results are achieved by splitting the irrigation into 2 applications at 10-15 minutes apart. This will allow for more thorough particle dispersion into the root zone. Particle color may vary from lot to lot. Apply only at low rates if temperatures exceed 25°C and irrigate immediately after application. This product contains iron which may stain concrete and other surfaces. Remove particles promptly by sweeping or blowing to avoid staining. DO NOT WASH OFF WITH WATER. Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing. Use only clean, dry spreaders. Do not leave unused product in spreaders.

### New Zealand
**12 + 10.5 + 6.6 + Fe, Mn**

12.0% Total Nitrogen (N)
- 6.0% Ammoniacal Nitrogen
- 0.9% Urea Nitrogen
- 3.0% Other Water Soluble Nitrogen from methylene ureas
- 2.1% Water Insoluble Nitrogen from methylene ureas

10.5% Phosphorus (P) from ammonium phosphate

6.6% Potassium (K) from potassium sulfate

4.1% Sulfur (S) from sulfate

0.3% Iron (Fe) water soluble from ferrous sulfate

0.5% Manganese (Mn) water soluble from manganese sulfate

**Application rates: 15-30 g/m$^2$ (150-300 kg/ha)**

**Directions for use:** Apply product to actively growing turf at 15-30 g/m$^2$. Apply to dry foliage. Immediately after application, apply a minimum of 5 mm of water to disperse particles into the root zone. Due to variations in temperature and water pH, best results are achieved by splitting the irrigation into 2 applications at 10-15 minutes apart. This will allow for more thorough particle dispersion into the root zone. Particle color may vary from lot to lot.